



# Болотные птицы



- 
- **Болотных птиц** можно встретить повсюду на побережьях водоемов — устьев рек, на болотах. Благодаря длинным ногам они могут бродить по мелководью, а с помощью удлинённого клюва они собирают мелких беспозвоночных, извлекая их даже из ила и песка и с помощью длинной шеи они могут следить за убегающими животными.

A white stork with a long red beak and legs, standing on a green lawn. The bird is facing left, and its wings are partially spread. The background is a blurred green lawn.


Белый аист — самый известный из аистов. Это белая птица с чёрными концами крыльев, длинной шеей, длинным, тонким, красным клювом и длинными красноватыми ногами.

Когда крылья у аиста сложены, создаётся впечатление, что вся задняя часть тела аиста чёрная. Отсюда его украинское название — *черногуз*. Самки по окрасу неотличимы от самцов, но несколько меньше. Рост белого аиста составляет 100—125 см, размах крыльев 155—200 см. Масса взрослой птицы достигает 4 кг.


Продолжительность жизни белого аиста в среднем составляет 20 лет. Внешне на белого аиста похож дальневосточный аист, но в последнее время он считается отдельным видом. Белый аист — один из символов Белоруссии.

# цапли

Цапли — это довольно крупные птицы с длинной шеей и длинными ногами и пальцами. Благодаря такому строению тела цапли легко пробираются через водную растительность и могут вскарабкаться на деревья. Они питаются животной пищей, чаще всего рыбой, которую ловят кинжалоподобным



# пеликан



Пеликан – самая большая болотная птица, которая ныряет . У нее длинная шея и короткие ноги, но самое удивительное в ней – длинный клюв и горловой карман. Пеликан использует этот мешок на шее в качестве сети для ловли рыбы. Схватив свою добычу, он опускает голову к груди, чтобы выпустить воду и проглотить рыбу. В сумке он также переносит еду для своих птенцов.

A photograph of a Tuurukhtan bird, a species of quail, standing in a lush green field. The bird is dark-colored with a prominent white patch on its neck. The background is a soft-focus landscape with green grass and a blue sky.

# турухтан

Турухтан – это птица, относящаяся к семейству бекасовых. Гнездиться предпочитает во влажных лугах и на травяных болотах северной части Евразии. Как и остальная болотная дичь, турухтан является перелётной птицей. Зимует он в Африке, Южной и Западной Европе, а также в Австралии. На пролёте всегда держится большими стаями, в месте зимовки нередко образует обширные колонии по несколько сотен тысяч птиц. Является объектом активной охоты. Ближайшие к нему родственные виды – острохвостый песочник и грязовик.

# бекас

Бекас – болотная птица с длинным клювом, к тому же еще и очень острым. Длина тела составляет 26 см, масса 180 г, размах крыльев равняется 45 см. Проживает эта небольшая болотная птица вблизи от берегов водоемов.



# ВЫПЬ



- Выпь – ночная болотная птица, принадлежащая семейству цаплевых. Чаще всего ее можно увидеть в Японии. Небольшие ареалы встречаются в странах Африки



# Мандаринка

- Мандаринка
- Яркая небольшая птица из семейства утиных, широко распространенная только в Восточной Азии. Отличительной чертой этих птиц является очень яркая и необычная расцветка, благодаря которой их сложно спутать с другими представителями многочисленного семейства уток. Основными местами обитания этих миниатюрных уток, являются горные реки с густой растительностью в береговой зоне, где они любят проводить время на воде или на ветвях деревьев. Семейные пары мандаринок очень редко устраивают гнезда на земле, предпочитая располагать их в дуплах деревьев, даже расположенных достаточно высоко от земли. Рацион этих птиц преимущественно составляют разнообразные водные растения, желуди и мелкие беспозвоночные животные.

# ШИЛОКЛЮВКА

A black and white grebe (Shiloklyuvka) is shown standing on a grassy field. The bird has a white body with a black cap and a long, thin neck. Its wings are spread out, showing a dark underside. The background is a blurred green field.

- Шилоклювка - одна из самых грациозных водоплавающих птиц. Эта птица медленно бродит по мелководью, не вынимая ног из воды, а бороздя ими воду. В глубоких местах шилоклювка ищет корм плавая. Во время поиска пищи птица водит клювом из стороны в сторону.

# ТУПИК

- Тупик формой тела схож с пингвином, но эти птицы друг другу не “родственники”. Тупик относится к семейству чистиковых и пыжиковых, отряду ржанкообразных . Весит тупик самец около 345г, а самка – 310г. Примерный рост тупиков около 30 см, при этом размах крыльев достигает 47 – 63 см. Живут тупики от десяти до пятнадцати лет.

# кряква



- Одной из наиболее распространенных во всем мире водоплавающих птиц является утка кряква. Всеядность и высокая приспособляемость к внешним условиям позволили птице крякве расселиться на всех континентах, кроме Антарктиды. Особенностью этого вида является значительное различие в расцветке между самками и самцами, что позволяет безошибочно определять пол утки.



КОНЕЦ

*Chapman*

Sehr