

Пиелонефрит

Сделал: Ковалёв Денис 8-А






- **Пиелонефрит** – неспецифическое инфекционное заболевание почек, вызываемое различными бактериями.

Основные варианты течения заболевания:

- острый;
- хронический;
- хронический с обострением.

Причины пиелонефрита



Заболевание может возникнуть в любом возрасте.

- у детей в возрасте до 7 лет (из-за особенностей анатомического развития);
- у молодых женщин в возрасте 18-30 лет (связано с началом половой жизни, беременностью и родами);
- у пожилых мужчин (при обструкции мочевыводящих путей вследствие развития аденомы предстательной железы).

Любые органические или функциональные причины, препятствующие нормальному оттоку мочи, увеличивают вероятность развития заболевания.

Нередко пиелонефрит появляется у больных мочекаменной болезнью, сахарным диабетом, с иммунными нарушениями, хроническими воспалительными заболеваниями и частыми переохлаждениями, после перенесённого острого цистита.

Симптомы пиелонефрита

- внезапное начало с резким повышением температуры до 39-40°C.
- обильное потоотделение
- потеря аппетита
- выраженная слабость
- головная боль
- иногда – тошнота и рвота
- тупые боли в поясничной области

Осложнения пиелонефрита

- формирование множественных мелких гнойничков на поверхности почки и в ее корковом веществе
- острая почечная недостаточность
- абсцесс почки (расплавление почечной паренхимы)
- некроза почечных сосочков

Лечение пиелонефрита

Острый пиелонефрит лечится в условиях отделения урологии стационара

Проводится антибактериальная терапия. Медикаменты подбираются с учетом чувствительности обнаруженных в моче бактерий. Для того, чтобы максимально быстро ликвидировать воспалительные явления лечение начинают с самого эффективного препарата.

Если лечение не проводится, развивается пионефроз, при котором почка полностью подвергается гнойному расплавлению и представляет собой очаг, состоящий из полостей, заполненных мочой, гноем и продуктами тканевого распада.

Диета:

- При остром пиелонефрите рекомендуется увеличение количества потребляемой жидкости до 2 л в сутки
- отказаться от жареной, сдобной, печёной, жирной, острой и сильно солёной пищи
- желательно отказаться от свежего хлеба, батона и прочих печёных продуктов
- отказаться от продуктов-аллергенов
- рекомендуется уменьшить потребление поваренной соли
- противопоказаны крепкие мясные бульоны и продукты питания, вызывающие резкие вкусовые ощущения.

ВЫВОД:

Пиелонефрит является серьезным заболеванием, характеризующееся тяжелым течением. Больные страдают от сильных болей, общее самочувствие нарушается. Я считаю, что болезнь намного легче недопустить, чем от нее избавиться.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ