


Красная Книга Белгородской области.



Редкие птицы Белгородской области.

Цели:

- ◆ Познакомиться с редкими видами местной флоры и фауны.
 - ◆ Привить любовь к родной природе.
 - ◆ Осознать необходимость в сохранении природы нашего края.
 - ◆ Выработать действия по оказанию помощи исчезающим видам флоры и фауны.
- 

европейская

Распространение: Населяет лесную зону европейской части России, в целом населяет тундровую, лесотундровую и лесную зоны России. За последние 60-90 лет гнездовой ареал сократился.

Местообитания: Гнездится на озерах, расположенных среди обширных верховых болот, избегает озер, часто посещаемых людьми. Кладка содержит 1-2 яйца, насиживают обе птицы 28-30 дней. Птенцы начинают самостоятельно добывать корм и летать в возрасте 60-70 дней. Питается мелкой и средней величины рыбой. Для Белгородской области является редким и пролетным видом.



Охрана: Необходимы заказники с полным запретом торфоразработок на верховых болотах, где сохранились значительные гнездовые группировки. Следует полностью запретить сетевой лов рыбы на гнездовых водоемах и в местах регулярных кормежек.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СРЕДНИЙ ДЯТЕЛ

Распространение: Граница обитания проходит по южной границе России, с вост. граница определяется находками на гнездовании Старого Оскола и г. Липецка.



Местообитания: Заселяет СТАРЫЕ дубравы, с обилием усыхающих деревьев. Насиживают оба партнера поровну в течение суток.

Охрана: Охраняется на Территории «Лес на Воскле», «Ямская степь» ГПЗ «Белогорье». Основным средством спасения вида является сохранение крупных, не менее 35-40 км², массивов СТАРЫХ дубрав, искусственные посадки дубрав.

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА

- ◆ **Распространение:** **ВСТРЕЧАЕТСЯ** в Белгородском, Грайворонском, Губкинском, Ракитянском и Ровеньском районах во время сезонных миграций. Последняя находка датируется 2003 годом.
- ◆ **Местообитания:** Крутые склоны берегов рек и озер. Места гнездования относительно постоянны в течение многих лет. Насиживает ЯЙЦА только самка в течение 24-27 суток. В выводке в среднем 4-6 птенца. Кормится побегами трав, на зимовках и пролете - эфемерными злаками, озимыми, луковицами, клубнями, корневищами степных растений



- ◆ **Охрана:** Охраняется на территории ПП «Ровеньковский».
- ◆ В условиях неволи в некоторых питомниках вид успешно размножается.
- ◆ Необходимо усиление пропаганды среди охотников и местного населения о недопустимости добычи птиц и сбора их яиц.

КУЛИК-СОРОКА

Распространение: На территории Белгородской области отмечен в Белгородском и Губкинском районах. Последняя находка датируется 200- годом.

Местообитания - гнездится преимущественно в хорошо разработанных долинах крупных и средних рек, по береговой линии пресных и соленых озер. Избегает заболоченных и лесистых берегов В кладке чаще 3 яйца. Одна кладка в сезоне. Легкодоступность гнезд определяет высокий уровень гибели кладок - до 38%. Питается ракообразными, моллюсками, насекомыми.



Охрана: Необходимо выявление основных мест гнездования и включение их в состав особо охраняемых.

Вид охраняется на территории заповедных участков «Лес на Ворскле» ГПЗ «Белогорье» и ПП «Ровеньский»

ЧЕРНЫЙ АИСТ

Распространение: Широко распространен в лесной зоне и горных р-нах. Из-за редкости и скрытности в период гнездования на большей части России ареал изучен плохо. На территории Белгородской области единично отмечен в Грайворонском и Корочанском районах.

Местообитания: Старые и перестойные лесные массивы на равнинах в отрогах гор возле рек, лесных болот, озер, стариц. Изучены слабо. Гнездится один раз в году. Гнезда устраивает в средней части деревьев, на обрывах и в нишах скал. Выводят по 3-6 птенцов. Продолжительность насиживания 30 дней.

Питание: водные беспозвоночные, амфибии, рыба, в средней полосе России - щурята, вьюны; на зимовках: крупные насекомые, мелкие грызуны, редко змеи, ящерицы.



Охрана: В ряде мест России наличие на гнездовании черного аиста явилось одним из важных факторов заповедования территории или объявления ее заказником или памятником природы. Необходима активная разъяснительная работа со школьниками, охотниками, туристами и другими любителями и пользователями природы. Охраняется с 1983 года.

СТЕПНОЙ ЛУНЬ

Распространение: Гнездятся обычно в степи, лесостепи, полупустыни Евразии. На территории Белгородской области встречается в Борисовском, Губкинском, Новооскольском и Ровеньском районах. Последняя находка – 200 год.

Местообитания: Населяет равнины и холмы лесостепной, степной и полупустынной зоны. Гнездятся там, где повышена численность мышевидных грызунов. Вдали от воды селится редко. В выводке 1-6 птенцов. В питании преобладают мыши, полевки, суслики, а также мелкие птицы.



Охрана: сохранение выявленных мест обитания. Охраняется на территории заповедных участков «Лес на Ворскле», «Ямская степь», «Лысые Горы» ГПЗ «Белогорье».

Дрофа

Распространение. На Белгородской области дрофа отмечена в Валуйском, Вейделевском, Губкинском, Красненском и Ровеньском районах. Последняя находка – 2002 год.

Местообитания: Редкий вид, численность которого быстро сокращается по всему ареалу. Длина крыла 590-700 мм. Дрофа предпочитает степные угодья, но охотно гнездится на залежах и даже на пашнях, если их обрабатывают не более одного раза в год. Кладка состоит из 2-3 оливково-зеленых с пятнами яйца. Кормится насекомыми, мелкими позвоночными, побегами и семенами трав.



- ♦ **Охрана:** разработать технологию разведения в неволе, создать сеть регионально охраняемых территорий. В белгородской области охраняется на заповедных территориях «Ямская степь» ГПЗ «Белогорье» и ПП «Ровеньский» с 1991 года.

ФИЛИН

- ◆ **Распространение:** от тайги до пустыни. На территории Белгородской области единично отмечен в Губкинском и Ровеньском районах.
- ◆ **Местообитания:** Использует труднодоступные участки рельефа во всех природных зонах. Избегают близости человека. В экстремальные зимы и при неурожае кормов совершает местные кочевки. Гнездится на земле, на склонах и обрывах, на выходах скалах, использует гнезда хищных птиц, крупные дупла, брошенные постройки, развалины. Средняя кладка из 2-3 яиц, выкармливают в гнезде 60 дней. Максимальная продолжительность жизни 15-25 лет. Круг питания - от рыб, амфибий, птиц, различных видов некрупных млекопитающих до молодняка копытных.



Охрана: Охраняется во многих государственных заповедниках и заказниках. Необходимо формировать положительное отношение к ночным хищным птицам со стороны населения, акцентируя внимание на их редкости и уязвимости. Охраняется на участке «Ямская степь» ГПЗ «Белогорье» и ПП «Ровеньский».

Орлан - белохвост.

Распространение: широко распространенный, но редкий вид, численность которого сокращается. Длина крыла 575-625 мм. Обитает в зоне лесов. На территории Бел. области отмечен в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Губкинском и др. районах.

Местообитания: в первой половине XX в. населял всю территорию России, за исключением арктических тундр. Населяет прибрежные леса. Главные условия гнездования - наличие высокоствольных деревьев в редко посещаемых человеком местах, поблизости от богатых рыбой водоемов. Плодовитость вида невысока: в кладке обычно 2 яйца, до вылета доживает 1-2 птенца.



Охрана: На территории России добыча запрещена. следует устраивать искусственные гнездования, особенно в заповедниках. Необходимо дальнейшее разъяснение недопустимости не только уничтожения и разорения гнезд, но и беспокойства орланов-белохвостов (особенно в гнездовое время). Вид охраняется на территории заповедников «Ямская степь», «Острасьевы Горы» ГПЗ «Белогорье» и ПП «Ровеньский»

Пискулька.

Распространение:

Лесотундровая зона. Редкий, малоизученный вид. Длина крыла 381-412 мм. В Бел. области пискулька отмечена в Губкинском и Ивнянском районах. Может встречаться в местах кормежки и отдыха перелетных гусей.

Местообитания: населяет северную часть тайги, лесотундру и кустарниковую тундру. В последние годы на северо-востоке нашей страны встречается все реже и реже. Гнездится в речных долинах. Кладка состоит из 4-5 белых яиц.

Питание – хвощи, пойменные злаки. Пасется вместе с другими гусями.



Охрана: официальный запрет охоты на пискульку. Вид охраняется на территории заповедного участка «Ямская степь» ГПЗ «Белогорье».

Распространение: Зона лесов. Редкий вид. Длина крыла 448-515 мм. В Бел. области скопа отмечена в Белгородском районе, Валуйском и Яковлевском районах. Последняя находка – 2003 год.

Местообитания: Населяет лесную зону и пойменные леса. Селится только вблизи рек, озер и морских побережий, богатых рыбой. Добывает только живую рыбу в чистой воде, гнездиться на деревьях с обломанными вершинами или уплощенными кронами.



Охрана: Необходимо введение строгих наказаний за уничтожение скоп и разорение их гнезд. Охраняется на территории заповедного участка «Ямская степь» ГПЗ «Белгорье» и ЯПП «Ровеньский» с 19991 года.

В Белгородской области:

- ◆ Расположен заповедник с пятью участками,
- ◆ 2 из которых – биосферного значения,
- ◆ 6 комплексных заказников,
- ◆ 24 ботанических,
- ◆ 20 зоологических,
- ◆ 5 гидрологических заказников и более 200 памятников природы.
- ◆ 1400-1500 видов растений;
- ◆ 10000-12000 видов животных;
- ◆ Более 30 видов растений занесены в Красную Книгу Белгородской области;
- ◆ Около 100 видов животных занесены в Красную Книгу Белгородской области, среди них 43 вида птиц.

Сохраним родное Белогорье для потомков!!!

- ◆ «Красная Книга Белгородской области должна стать настольной для всех любителей природы, руководителей учреждений, предприятий, поселков, городов, районов, области».