


Профилактика  
употребления  
психоактивных веществ



# Современная ситуация с употреблением ПАВ

- ☹️ Сегодня средний возраст знакомства детей с алкоголем составляет 12 лет.
- ☹️ Средний возраст приобщения к наркотикам по России составляет 14,5 лет.
- ☹️ Сегодня 50% выпускников школ России имеют табачную зависимость.



# Классификация психоактивных веществ (ПАВ) и основные понятия

Все химические соединения растительного и синтетического происхождения, непосредственно влияющие на психическое состояние человека, принято называть психоактивными веществами.

## Психоактивные вещества

```
graph TD; A[Психоактивные вещества] --> B[Наркотические вещества]; A --> C[Токсикоманические вещества];
```

### Наркотические вещества:

героин;  
кокаин;  
анаша, марихуана;  
психостимуляторы

### Токсикоманические вещества:

растворители, клеи..;  
реланиум, тазепам...;  
циклодол, кетамин,...;  
некоторые обезболивающие  
препараты



# Причины употребления ПАВ

## Социальные:

- Неблагополучная семья
- Распространённость употребления ПАВ в социуме ребёнка
- Активная пропаганда в СМИ и неадекватная молодёжная политика
- Проживание в районах с низким материальным благополучием
- Отсутствие досуга

## Психологические:

- Любопытство
- Неадекватная самооценка
- Попытка уйти от эмоциональных переживаний
- Подчинение давлению группы

## Наследственные:

- Наследственность, отягощённая психическими заболеваниями
- Наследственность, отягощённая наркологическими заболеваниями





# Стадии формирования зависимости

**Первые пробы.** Они возможны из любопытства, стремления «стать как все», при определённом стечении обстоятельств.

**Групповая зависимость.** Она формируется по механизму условного рефлекса: приём вещества в обычных для этого условиях или в определённой компании.

**Психическая зависимость.** Появление потребности принимать ПАВ, чтобы вновь и вновь испытывать приятные ощущения.

**Физическая зависимость.** Включение химических соединений, входящих в состав ПАВ в обмен веществ и вызывающих состояния тревоги, злости, агрессии.

**Повышение толерантности к ПАВ.** Такое состояние организма, когда отмечается всё менее выраженная ожидаемая реакция организма на определённую дозу вводимого препарата.





# Следствия употребления ПАВ

- ☹ **Высокий риск заболевания неизлечимыми болезнями.**
- ☹ **Среди лиц употребляющих ПАВ высокий процент смертности.**
- ☹ **Большая вероятность, что дети, родившиеся у человека имеющего зависимость, тоже обретут зависимость от ПАВ.**

# Общие признаки употребления ПАВ:

- *Снижение интереса к учёбе, обычным увлечениям.*
- *Отчуждённость, скрытность и лживость.*
- *Эпизоды агрессивности, раздражительности, которые сменяются периодами неестественного благодушия.*
- *Компания подростка, зачастую состоит из лиц более старшего возраста и некоторые из них имеют опыт употребления ПАВ.*
- *Эпизодическое наличие крупных или небольших сумм денег непонятного происхождения.*
- *Изменение аппетита. Периодически тошнота, рвота.*
- *Сужение или расширение зрачков, состояние огушённости, заторможенности.*
- *Наличие следов инъекций на коже.*






# Этапы оказания первой помощи при передозировке ПАВ

- Вызвать «Скорую помощь»
  - Повернуть на бок
- Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс
  - Следить за характером дыхания до прибытия врачей.
- В случае замедления дыхания выполнить искусственное дыхание.





**Спасибо за  
совместную работу!**

