

# Презентация – пособие «Преобразование графиков функций»

## Часть I

Учителя Новопокровской ош  
Глухова Виктора Владимировича

Новопокровка 2014 – 2015 уч. год

Рассмотрим преобразования графика функции

$y = f(x)$  в график функции  $y = k f(x + m) + n$ .

**Осознаем роль коэффициента  $k$  и слагаемых  $m$  и  $n$  в данной формуле.**

*График функции  $y = f(x)$  является базовым. Повторим для начала все основные графики функций, которые мы изучали в 9 классе*

Прямая пропорциональность  $y = kx$

Например,  $y = 2x$ , (прямая, проходящая через начало координат.)






График линейной функции  $y = kx + b$

Например,  $y = 3x - 2$  (прямая, не проходящая через начало координат.)



$$4$$

*График обратной пропорциональности, функции  $y = \frac{4}{x}$   
гипербола, не пересекающая оси координат.*



## График квадратичной функции

$$y = x^2$$

Парабола, проходящая через начало координат и точки  $(1;1)$  и  $(-1;1)$ .








График кубической функции  $y = x^3$

Кубическая парабола, проходящая через начало координат и точки  $(1;1)$  и  $(-1;-1)$ .



**График функции  $y = \sqrt{x}$**

Парабола, существующая только для  $x \geq 0$ , проходящая через начало координат и точки  $(1; 1)$  и  $(4; 2)$ .






Теперь повторим материал **8** класса по уравнению прямой  **$y = k \cdot x + b$**


- Как проходит прямая в зависимости от коэффициента  $k$  ?
- Каково положение прямой в зависимости от свободного члена  $b$  ?

Рассмотрим на конкретных примерах.

1. Если в уравнении  $y = kx$  коэффициент  $k > 0$ , то прямая проходит в I и III четвертях. Угол между прямой и положительным направлением оси абсцисс – **острый** ( $k = \operatorname{tg} \alpha > 0$ )



Если в уравнении  $y = kx$  коэффициент  $k < 0$ , то прямая проходит в II и IV четвертях. Угол между прямой и положительным направлением оси абсцисс – **тупой**.  
( $k = \operatorname{tg} \alpha < 0$ )



Если в уравнении  $y = kx + b$   $b > 0$ , то прямая  $y = kx$  сдвигается параллельно вверх на  $b$  единиц, если  $b < 0$  то прямая  $y = kx$  сдвигается вниз параллельно на  $b$  единиц.


В одной системе координат построим графики (по цвету формулы)

а)  $y = -0,5x$

б)  $y = -0,5x + 5$

в)  $y = -0,5x - 4$

г)  $y = -0,5x - 8$




Рассмотрим, какова роль свободного члена  $b$  в формуле прямой  $y = kx + b$   
построим графики в одной системе координат

а)  $y = 0,3x + 3$  ;

б)  $y = 2x + 3$  ;

в)  $y = -4x + 3$



Все эти графики  
пересекают ось  
ординат в точке  
( 0 ; 3 )

Мы все ближе к осознанию  
преобразования графика функции  
 $y = f(x)$  в график функции  
 $y = kf(x+m) + n$

■ Рассмотрим поэтапно  
преобразования:

■ а)  $f(x)$  и  $f(x) + n$

■ б)  $f(x)$  и  $f(x+m)$

■ в)  $f(x)$  и  $kf(x)$

■ г)  $f(x)$  и  $kf(x+m) + n$

Первое преобразование  
 $y = f(x)$  в  $y = f(x) + n$

Построим в одной системе координат графики следующих функций

а)  $y = x^2$  ;


б)  $y = x^2 + 3$  ;

в)  $y = x^2 - 4$  ;


г)  $y = x^2 - 9$

Вывод: если  $n > 0$ , то парабола  $y = x^2$  сдвигается параллельным переносом **вверх на  $n$  единиц**,  
если  $n < 0$ , то парабола  $y = x^2$  сдвигается **вниз на  $n$  единиц**.

б)







**Рассмотрим преобразование, которое мы не могли наблюдать с графиками прямых. Общий вид преобразования  $y = f(x)$  и  $y = f(x + t)$ . Теперь число прибавляется не к функции, как в предыдущем примере, а к аргументу.**

- *Что же мы ожидаем увидеть?*
- *Что если  $t > 0$ , то парабола  $y = x^2$  сдвигается параллельным переносом вдоль оси абсцисс **влево** на  $t$  единиц, если  $t < 0$  то парабола  $y = x^2$  сдвигается параллельным переносом вдоль оси абсцисс **вправо** на  $t$  единиц.*
- *То есть если  $t$  положительное число, то **сдвиг происходит** вдоль оси абсцисс, но в отрицательном направлении и, наоборот, если  $t$  отрицательное число, то **сдвиг** происходит вдоль оси абсцисс, но в положительном направлении*


Для того, чтобы увидеть параллельный перенос – сдвиг вдоль оси абсцисс нам достаточно построить в одной системе координат графики следующих функций

1.  $y = x^2$  ;

3.  $y = (x - 3)^2$  ;

2.  $y = (x + 2)^2$  ;

4.  $y = (x - 5)^2$




*Теперь рассмотрим преобразование*

$$y = f(x) \text{ и } y = kf(x).$$

- *Оценим роль коэффициента  $k$ . Оценивать будем по двум моментам.*
- *а)  $k$  - положительный или отрицательный коэффициент.*
- *б)  $k$  - больше или меньше единицы.*


Рассмотрим преобразование, когда  $y = f(x)$  переходит в  $y = k f(x)$ , где  $k$  - отрицательный коэффициент. Наблюдаем симметричное отображение относительно оси абсцисс графика  $y = x^2$  в график  $y = -x^2$ , а  $y = 3x^2$  в график  $y = -3x^2$



Рассмотрим преобразование, когда  $y = f(x)$  переходит в  $y = k f(x)$ ,

где  $k$  - **положительный коэффициент**. Наблюдаем, что, график функции  $y = k x^2$  получается из графика  $y = x^2$  с помощью сжатия его в  $k$  раз к оси ординат ( $Oy$ ), если  $k > 1$ , или с помощью растяжения в  $k$  раз к оси ординат ( $Oy$ ), если  $0 < k < 1$ . Строим графики :

$$y = x^2 ; \quad y = 2 x^2 ; \quad y = 3 x^2 ; \quad y = 0,2 x^2$$




Для обобщения преобразование

$$y = f(x) \quad \text{в} \quad y = kf(x + m) + n$$


рассмотрим для наглядности построение простого графика функции

$$y = (x - 3)^2 - 1$$

1) Строим базовый график  $y = x^2$




По формуле  $y = k f(x + m) + n$  имеем  $m = -3$ .  
2) График  $y = x^2$  сдвигается *вправо* ( $m < 0$ ) на три единицы, получили график  $y = (x - 3)^2$





По формуле  $y = k f(x + m) + n$  имеем  $n = -1$ .  
3) График  $y = (x-3)^2$  сдвигается параллельным переносом *вниз* ( $n < 0$ ) на одну единицу, получим график  $y = (x-3)^2 - 1$




*Подведем итоговое преобразование, комплексно объединяющее все предыдущие преобразования*

$$y = f(x) \quad \text{в} \quad y = kf(x + t) + n.$$

*Из выше сказанного, после обобщений, следует :*


- *1)  $k$  – растягивает или сжимает график функции  $f(x)$  к оси ординат ( $Oy$ )*
- *2)  $t$  – производит сдвиг графика вдоль оси абсцисс ( $Ox$ )*
- *3)  $n$  – производит сдвиг графика вдоль оси ординат ( $Oy$ )*
- *Для наглядности построим график функции  $y = -2(x - 4)^2 + 5$ , но разобьём построение на последовательные этапы*
- *1.  $y = x^2$  (базовый график)*
- *2.  $y = 2x^2$  (сжатие к оси ординат в два раза)*
- *3.  $y = -2x^2$  (симметричное отображение относительно  $Ox$ )*
- *4.  $y = -2(x - 4)^2$  (сдвиг влево на 4 единицы)*
- *5.  $y = -2(x - 4)^2 + 5$  (сдвиг вверх на 5 единиц)*

Этапы построения графика функции  $y = -2(x - 4)^2 + 5$ ,  
базовый график  $y = x^2$  переходит в  $y = 2x^2$ .  
Наблюдаем сжатие к оси ординат (Oy) в два раза




Этапы построения графика функции  $y = -2(x - 4)^2 + 5$ ,  
график  $y = 2x^2$  переходит в  $y = -2x^2$ .

Наблюдаем симметричное отображение относительно  $Ox$ .




Этапы построения графика функции  $y = -2(x - 4)^2 + 5$ ,  
график  $y = -2x^2$  переходит в  $y = -2(x - 4)^2$ .


Наблюдаем сдвиг влево параллельным переносом на 4 единицы.



Этапы построения графика функции  $y = -2(x - 4)^2 + 5$ ,  
график  $y = -2(x - 4)^2$  переходит в  $y = -2(x - 4)^2 + 5$ .  
Наблюдаем сдвиг вверх параллельным переносом на 5 единиц.




Таким образом по преобразованию  $y = f(x)$  в  $y = k f(x + m) + n$ . график  $y = x^2$  в несколько этапов переходит в график  $y = -2(x - 4)^2 + 5$ .









Второй шаг, результат первого шага пунктиром. Какое действие?




Третий шаг, результат первых шагов пунктиром. Какое действие?



## Четвёртый, окончательный шаг. Какое действие?



Это окончательный график  $y = -\frac{4}{(x+2)} - 3$ . это график никогда не пересечёт горизонтальную линию  $y = -3$  и вертикальную линию  $x = -2$  ( их называют асимптотами)  
Вспомним, область определения функции  $D(y) = (-\infty; -2) \cup (-2; \infty)$   
область изменения функции  $E(y) = (-\infty; -3) \cup (-3; \infty)$



*В преобразовании  $y = f(x)$  в  $y = kf(x + m) + n$  не учитывается коэффициент, который может стоять перед аргументом  $X$ . В 10 классе это будет учитываться.*


- А пока рассмотрим построение графика  $y = \sqrt{-x-2} - 4$
- Область определения  $D(y) = [0; \infty)$  базовой функции  $y = \sqrt{x}$
- Минус перед аргументом делает область определения противоположной.

$$D(y) = (-\infty; 0] \text{ для функции } y = \sqrt{-x}$$

То есть происходит симметричное отображение базового графика, но относительно оси  $Oy$ .

Ну а дальнейшие преобразования - параллельный сдвиг вправо и вниз Вам уже известен.

Проследите самостоятельно эти этапы, но уже в одной системе координат.



Проверьте степень  
усвоения учебного  
материала, ответив на  
тесты. Нажмите клавишу  
Esc и заполните тесты.

Сравните свои ответы с  
приведёнными ниже, если результат  
Вас не удовлетворил, то посмотрите  
презентацию вновь, но более  
внимательно



### В-1 русский яз

| Дана функция | Новая функция   | Описание преобразования       |
|--------------|-----------------|-------------------------------|
|              |                 | Сдвиг-перенос на 2 ед. вверх  |
| $y = x^2$    |                 |                               |
| $y = x^2$    | $y = x^2 - 4$   |                               |
| $y = x^2$    |                 | симметрия относительно оси Ох |
|              | $y = (x + 2)^2$ | Перенос на 2 ед. влево        |
| $y = x^2$    |                 | Перенос на 2 ед. вправо       |
| $y = x^2$    |                 | Растяжение в 2 раза от оси Оу |

### В-2 украинский язык

| Дана функція | Нова функція    | Опис перетворення           |
|--------------|-----------------|-----------------------------|
|              |                 | Перенесення на 1 од. вниз   |
| $y = x^2$    |                 |                             |
| $y = x^2$    | $y = x^2 + 6$   |                             |
| $y = x^2$    |                 | симетрія відносно осі Ох    |
|              | $y = (x - 1)^2$ | Перенесення на 1 од. вправо |
| $y = x^2$    |                 | Перенесення на 1 од. вгору  |
| $y = x^2$    |                 | Стиск в 2 рази до осі Оу    |


Проверим  
результаты  
усвоения  
материала

### В-1

| Дана функція | Новая функція   | Описание преобразования       |
|--------------|-----------------|-------------------------------|
| $y = x^2$    | $y = x^2 + 2$   | Сдвиг-перенос на 2 ед. вверх  |
| $y = x^2$    | $y = x^2 - 4$   | Сдвиг-перенос на 4 ед. вниз   |
| $y = x^2$    | $y = -x^2$      | симметрия относительно оси Ох |
| $y = x^2$    | $y = (x + 2)^2$ | Перенос на 2 ед. влево        |
| $y = x^2$    | $y = (x - 2)^2$ | Перенос на 2 ед. вправо       |
| $y = x^2$    | $y = 0,5 x^2$   | Растяжение в 2 раза от оси Оу |

### В-2

| Дана функція | Нова функція    | Опис перетворення           |
|--------------|-----------------|-----------------------------|
| $y = x^2$    | $y = x^2 - 1$   | Перенесення на 1 од. вниз   |
| $y = x^2$    | $y = x^2 + 6$   | Перенесення на 6 од. вгору  |
| $y = x^2$    | $y = -x^2$      | симетрія відносно осі Ох    |
| $y = x^2$    | $y = (x - 1)^2$ | Перенесення на 1 од. вправо |
| $y = x^2$    | $y = x^2 + 1$   | Перенесення на 1 од. вгору  |
| $y = x^2$    | $y = 2x^2$      | Стиск в 2 рази до осі Оу    |



*Удачи и терпения  
в изучении  
математики !!!*

Когда будете закрывать программу , пожалуйста, не сохраняйте изменения.