

*Дети с ограниченными
возможностями здоровья,
причины их возникновения*

Падалкина Юлия, Д-4а

Дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие)

Причины:

- * Неблагоприятное течение беременности. Если Ваша беременность протекала плохо, с сильным токсикозом, с постоянной угрозой выкидыша и преждевременных родов, либо у матери и плода был резус-конфликт, то Вам обязательно стоит проверить слух Вашего ребенка после его рождения. Так же причиной для врожденной тугоухости может быть прием матерью антибиотиков из группы аминогликозидов, злоупотребление алкоголем или наркотиками
- * Патологические роды. Все патологии, которые приводят к прекращению поступления кислорода к плоду преждевременные, затяжные или стремительные роды, частичная отслойка плаценты, кесарево сечение и т.д.) и внутричерепная травма плода могут являться причинами нарушения детского слуха.

Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);

- * С чем связаны причины нарушения зрения у детей? В большинстве случаев ухудшение зрения провоцирует высокая нагрузка на глаза. Это могут быть всевозможные достижения технического прогресса – компьютер, телевизор, телефон и так далее. Не меньше устают глазки и от «сидячих» увлечений – лепки, рисования, чтения, настольных игр и тому подобное.
- * Дети мало двигаются, а значит, у них нарушается осанка и застаивается в организме кровь. Специалистами доказано, что ухудшение зрения в детском возрасте напрямую связано с проблемами позвоночника, так как снижается полноценное кровоснабжение мозга. А школа еще больше прибавляет малоподвижных занятий, не все из которых нравятся малышам. Щуря и напрягая глазки, ребенок усиливает нагрузку на них, быстро теряет интерес и устает.
- * Детские очки лишь отчасти решают проблему, часто малыши стесняются и отказываются их носить. Если плохое зрение досталось ребенку в наследство, то без коррекционных очков вряд ли можно обойтись.

Дети с нарушениями речи

Причины:

- * Внутриутробные патологии.
- * Наследственность.
- * Родовые патологии.
- * Заболевания первых лет жизни ребенка.
- * Неблагоприятные социально-бытовые условия.

Дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети)

Причины:

- * Генетические заболевания;
- * Наследственность;
- * Нарушения внутриутробного развития;
- * Поздние роды (в возрасте старше 45 лет);
- * Неблагоприятное течение беременности;
- * Родовые травмы;
- * Воспаление оболочек мозга;
- * Черепно-мозговые травмы.

Дети с задержкой психоречевого развития (ЗПР)

Факторы, провоцирующие ЗПРР:

- * Болезни матери во время беременности.
- * Нарушению развития плода может способствовать проникновение инфекции, отравление, травмы.
- * Кислородное голодание (гипоксия) плода в утробе матери.
- * Тяжелые роды (стремительные, преждевременные, обвитие пуповины вокруг шеи), травма ребенка при родах (перинатальная энцефалопатия, травма ЦНС, шейных отделов позвоночника).
- * Перенесение ребенком тяжелых инфекций (вызвавших заболевания мозга) и травм в раннем возрасте.
- * Генетические, хромосомные заболевания, при которых нарушается структура мозга.
- * Неправильное воспитание: ребенок растет под слишком сильной опекой или, наоборот, брошен на произвол судьбы, с ребенком дома жестоко обращаются.

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

Причины:

- * заболевания нервной системы: детский церебральный паралич (ДЦП), полиомиелит;
- * врожденная патология опорно-двигательного аппарата (ОДА): врожденный вывих бедра, кривошея, деформации стоп (косолапость и др.), аномалии развития позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз (врожденные аномалии опорно-двигательного аппарата);
- * приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, заболевания, приводящие к деформациям скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания ОДА (хонродистрофия, рахит).

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;

Основными причинами нарушений являются:

- * перенесённые стрессы;
- * отставание в интеллектуальном развитии;
- * недостаточность эмоциональных контактов с близкими взрослыми;
- * социально-бытовые причины;
- * фильмы и компьютерные игры, не предназначенные для его возраста;
- * ряд других причин, вызывающих у ребёнка внутренний дискомфорт и чувство неполноценности.