

# **Заболевания передающиеся половым путём**

Выполнила Гошева Марина Андреевна 11А класс.

**ЗППП (заболевания передающиеся половым путем)** — это группа болезней, заразиться которыми можно при сексуальном контакте. Возбудителями могут быть вирусы, бактерии, грибки или паразиты. Они отличаются высокой восприимчивостью — заболеть может каждый человек, который живет половой жизнью.

С каждым годом половые инфекции вырабатывают иммунитет к антибиотикам, поэтому успешное лечение невозможно без комплексного и индивидуального подхода.

# Виды ЗППП

- вирусные инфекции (папилломавирус, генитальный герпес);
- бактериальные инфекции (гонорея, хламидиоз и др.);
- паразитарные инфекции;
- протозойные инфекции;
- паразитарные заболевания (лобковый педикулез).

- **К заболеваниям, передающимся половым путем, относятся недуги, вызываемые разными возбудителями.**
- Они подразделяются на несколько групп:
- Грибковые инфекции. К таким инфекциям относится кандидоз. Стоит отметить, что кандидоз не во всех случаях передается половым путем, поскольку грибы рода Кандида в незначительном количестве могут находиться в организме каждого человека. Вспышка инфекции может быть спровоцирована различными факторами: болезнью, приемом антибиотиков, снижением иммунитета. Однако от больного человека здоровому молочница передается именно половым путем.
- Вирусные инфекции. Вирусные инфекции – это одни из самых опасных своими последствиями заболевания: ВИЧ, генитальный герпес, цитомегаловирус, контагиозный моллюск, гепатит В, саркома Капоши, а также остроконечные кондиломы, которые возникают под воздействием вируса папилломы.
- Бактериальные инфекции. Они несут серьезную опасность для здоровья. Это гонорея, донованоз, хламидиоз, паховая гранулема, микоплазмоз, уреаплазмоз, сифилис, венерическая лимфогранулема, мягкий шанкр. Некоторые из них встречаются редко, а другие достаточно распространены, однако все они опасны своим течением и последствиями для здоровья человека.
- Папилломавирус. Его возникновение считается причиной некоторых форм заболеваний половых органов у женщин, особенно шейки матки.
- Паразитарные поражения. Чаще всего из паразитарных инфекций встречаются чесотка и лобковые вши.
- Протозойные инфекции. Наиболее распространенная протозойная инфекция, которая вызвана простейшими микроорганизмами и передается через половой контакт, – трихомониаз.

# Причины ЗППП

- свобода половых отношений;
- отсутствие необходимого полового воспитания и просвещения;
- пропаганда «свободной любви» в СМИ, Интернете;
- пренебрежение походом к врачу;
- появление различных контрацептивов.

# СИМПТОМЫ

Среди них:

- зуд и жжение в интимной области;
- измененные выделения из половых органов;
- повышение количества выделений;
- болевые ощущения внизу живота;
- высыпания в области половых органов и т. д.



# Сифилис

- **Сифилис** — одно из самых древних заболеваний, передающихся половым путем, его возбудителем является бледная спирохета. Выделяют три стадии сифилиса, и каждую из них сопровождают свои симптомы. Инфекция может пребывать в организме долгое время (иногда — несколько лет) и никак не проявляться внешне.
- Один из первых симптомов болезни — появление твердого шанкра. Он возникает в области половых органов или анального отверстия. Реже — на пальцах рук. Со временем высыпания распространяются по всему телу.
- Больного беспокоит ломота в костях, лихорадка, головная боль. На поздних стадиях ухудшается зрение, появляется слабость, понижается иммунитет. При отсутствии лечения сифилис приводит к поражению всех органов и систем.



# Гонорея

- **Гонорея** — классическое венерическое заболевание, которое относится к ЗППП. Его возбудитель — гонококк - поражает уретру, шейку матки, органы малого таза, прямую кишку, глотку и даже глаза. Инкубационный период составляет несколько суток. Заболевание проявляется острыми симптомами — больных беспокоят гнойные выделения из половых органов, боль внизу живота, жжение при мочеиспускании и дискомфорт.
- Среди осложнений гонореи — воспалительные заболевания органов малого таза, яичек и предстательной железы, мужское и женское бесплодие, прерывание беременности. При хроническом течении болезни поражаются все органы и системы организма.



## Каждый человек может заразиться этими болезнями вне зависимости от пола, возраста и социального статуса:

- **ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)** — самое опасное ЗППП, которое при отсутствии антиретровирусной терапии может перерасти в СПИД. Инкубационный период составляет от 1 до 6 месяцев (чаще всего — 3 месяца). Среди первых симптомов болезни — острая ангина, увеличение и воспаление шейных лимфатических узлов, длительная субфебрильная температура тела.
- **Хламидиоз** — первые симптомы проявляются приблизительно через неделю после инфицирования. У зараженных мужчин и женщин наблюдаются слизистые выделения из половых органов, режущая боль при мочеиспускании и неприятные ощущения во время полового акта. Нередко у инфицированных женщин возникают межменструальные кровотечения и боли в области органов малого таза.
- **Генитальный герпес** — инфекционное ЗППП, которое вызывает вирус простого герпеса первого или второго типа. При первичном заражении может протекать бессимптомно. После инфицирования вирус навсегда остается в организме человека и время от времени проявляется внешне. Характерный симптом болезни — высыпания в виде маленьких пузырьков на половых органах и в области ануса.
- Они сопровождаются зудом, дискомфортом и жжением при мочеиспускании. Через несколько дней пузырьки превращаются в язвы и покрываются коркой. Наблюдается слабость, повышение температуры тела и увеличения паховых лимфоузлов. Вирус герпеса представляет особую опасность для беременных женщин и требует срочного лечения.

- **Вирус папилломы человека** – это вирусы, передающиеся половым путем. Вне зависимости от пола недуг проявляется одинаково – в виде бородавок в области анального отверстия и промежности. У мужчин бородавки могут скрываться в мочеиспускательном канале и за крайней плотью. Вирусы папилломы человека 16 и 18 типов служат одной из основных причин возникновения рака шейки матки. Не исключено бессимптомное протекание недуга, в этом случае узнать о наличии инфекции можно только после диагностики.
- **Уреаплазмоз** – заболевание, для которого характерно хроническое течение. Его возбудителем является уреаплазма – одноклеточный микроорганизм, относящийся к условно-патогенной флоре. Это означает, что уреаплазма присутствует в небольшом количестве и у здорового человека. Болезнь начинает прогрессировать, когда микробы начинают стремительно размножаться, вытесняя здоровую микрофлору. Симптомы появляются через 2-3 недели, у больных наблюдается жжение при мочеиспускании, воспаление мочеполовой системы и мутные выделения из влагалища. Нередко женщин беспокоит боль внизу живота. При отсутствии лечения болезнь переходит в хроническую стадию и влечет за собой осложнения: эндометрит, кольпит, сужение уретры, цистит, воспаление маточных труб и пр. Несвоевременное лечение уреаплазмоза может привести к преждевременным родам, замершей беременности и бесплодию.
- **Микоплазмоз** – вызывается условно-патогенными микроорганизмами. Они могут находиться в организме абсолютно здорового человека и провоцировать множество заболеваний мочеполовой системы. У мужчин болезнь проходит бессимптомно, у женщин возникает жжение при мочеиспускании, боль во время полового контакта и боли внизу живота.

# Профилактика

- Отказ от случайных связей. Даже презерватив не дает гарантии защиты.
- При малейших симптомах - незамедлительно обращаться к врачу. В ранние сроки инфекцию можно легко уничтожить.
- Соблюдать элементарные правила гигиены до и после полового контакта.
- Использование профилактических ванночек, растворов и медицинских препаратов.
- Сдавать анализы на различные ЗППП и наблюдаться у врача.