

**Гродненский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии**



Репродуктивная функция женщин после хирургического лечения эктопической беременности

**Выполнила: студентка 5 курса
лечебного факультета
24 группы
Бык Алина Юрьевна**





Внематочная (эктопическая) беременность – это...

**осложнение
беременности, при
котором прикрепление
оплодотворённой
яйцеклетки происходит
вне полости матки**

Варианты внематочной беременности

- **Чаще всего (почти в 97% случаев) встречается трубная беременность.**
- **Абдоминальная (в брюшной полости) беременность наблюдается примерно в 1,4%,**
- **Шеечная беременность (в цервикальном канале шейки матки) – в 0,7%,**
- **Яичниковая (в яичнике) – в 0,15% всех случаев внематочной беременности.**

ТРУБНАЯ



АКТУАЛЬНОСТЬ

**Внематочная беременность -
одно из наиболее часто
встречающихся острых
гинекологических заболеваний,
которое до настоящего времени
продолжает представлять
опасность для жизни.**




Последствия внематочной беременности

- ***БЕСПЛОДИЕ***
- ***ПОВТОРНАЯ ТРУБНАЯ
БЕРЕМЕННОСТЬ***

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

**Оценить
репродуктивную
функцию женщин в
зависимости от типа
хирургического
лечения внематочной
беременности**






Материалы и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ 30 историй пациенток с внематочной беременностью в УЗ «БСМП» г. Гродно с последующим оценкой репродуктивной функции по данным женских консультаций.


РЕЗУЛЬТАТЫ



Four hands are positioned around the text, with their fingers pointing towards the center. The hands are light-skinned and appear to be of different ages or orientations, creating a circular frame for the central text.


**Средний возраст
пациенток составил
27,8 лет
(20 до 33 лет).**

Пациенткам были проведены следующие операции:




- Лапароскопическая сальпингостомия
- Лапароскопическая сальпингэктомия
- Лапаротомическая сальпингэктомия

После проведения лапароскопической сальпинготомии




- **Беременность в полости матки**
- **Беременность не наступила**


Сроки наступления беременности в полости матки после проведения лапароскопической сальпинготомии




После проведения лапароскопической сальнгиэктомии



Сроки наступления беременности в полости матки после проведения лапароскопической сальпингэктомии



После лапаротомической сальпигэктомии



ВЫВОДЫ





1. Для сохранения репродуктивной функции женщин имеет значение техника выполнения хирургического вмешательства.

2. При проведении органосохраняющих операций вероятность наступления маточной беременности значительно выше, чем при других методах оперативных вмешательств.

3. При внематочной беременности важнейшим этапом является не только оперативное лечение, но и адекватная реабилитация, что значительно снижает риск возникновения повторной трубной беременности.

Спасибо за внимание!

