

Неотложная помощь при синдроме «Острого живота»

Понятие острого живота

- Острый живот — это ряд острых хирургических заболеваний органов брюшной полости угрожающие развитию перитонита или уже приведший к нему, а также осложняются внутрибрюшинным кровотечением.

Понятие собирательное

- Понятие собирательное, но имеет большое практическое значение, так как нацеливает медицинского работника, на неотложную госпитализацию больного в хирургический стационар, для проведения оперативного лечения, чтобы предупредить развитие перитонита.
- При необходимости провести с ним борьбу. Выраженность и сила симптомов не определяет диагноз острого живота

Заболевания, входящие в синдром острого живота

- Аппендицит
- Флегмонозный холецистит
- Острый панкреатит
- Перфорация желчного пузыря
- Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки
- Непроходимость кишечника
- Расслаивающая аневризма брюшного отдела аорты
- Тромбоэмболия нозотериальных сосудов
- Кровотечение в брюшную полость
- Открытые травмы живота
- Внутрибрюшной разрыв мочевого пузыря
- Разрыв селезенки
- Гинекологические заболевания; такие как **внематочная беременность**, разрыв кисты яичника, перекрут ножки кисты яичника.

Скорая медицинская

ПОМОЩЬ

- Острый аппендицит
- Боли в правой подвздошной области, усиливающиеся при кашле, чихании, ходьбе. Иррадиации боли нет!
- Симптомы:
 - 1. **Щёткина- Блюмберга** (симптом раздражения брюшины).
 - 2. **Ситковского** (усиление боли при повороте больного на правый бок).
 - 3. **Бартомье Михельсона** (усиление боли при пальпации в правой подвздошной области в положении больного на правом боку).
 - 4. **Кохера — Волковича** (боль вначале локализуется в эпигастрии, а затем переходит в правую подвздошную область).
 - 5. **Образцова** (при пальпации в области аппендикса с вытянутой вверх ногой — резкое усиление боли).
 - 6. **Ровзинга** (при толчкообразной пальпации в левой половине живота - боли справа за счёт передвижения газов).
 - 7. **Воскресенского** (симптом «рубашки»).

Острый холецистит

- Боли в правом подреберье, эпигастрии.
- Тошнота, многократная рвота желчью, не приносящая облегчения, горечь во рту.
- Положительный симптом Щёткина - Блюмберга, симптом Ортнера (поколачивание по рёберной дуге справа — резкое усиление боли),
- Мерфи (симптом «прерванного вдоха» — при введении пальцев рук в правое подреберье просят больного вдохнуть при этом происходит резкое усиление боли), Френикус — симптом (боль в правом плече и надплечье).
- Может быть повышение температуры тела до фебрильных цифр, **желтуха**, задержка стула, вздутие живота.

Прободная язва желудка или 12-перстной кишки

- Сильнейшая боль в эпигастрии («удар кинжалом»), бледность, холодный пот, тахикардия, снижение артериального давления, дефанс, положительный симптом Щёткина-Блюмберга, рвота.
- Больной лежит на боку или спине с подтянутыми к животу ногами.
- При перкуссии — печёночная тупость отсутствует, аускультативно — отсутствие кишечных шумов.
- Медицинская помощь: спазмолитики — в/в, в/м, госпитализация.

Желудочное, желудочно-кишечное кровотечение

- При язве желудка или 12-перстной кишки.
- Слабость, рвота алой кровью или типа «кофейной гущи», бледность кожных покровов, головокружение, сухость во рту, жажда, тахикардия, снижение АД, дёгтеобразный чёрный стул (мелена), могут быть боли в эпигастрии.
- Симптом Бергмана — исчезновение болей вслед за начавшимся к/течением (при язвенной болезни).
- Первая медицинская помощь: холод на живот, Sol. *Calcii chloridi* 10%-10,0 — в/в, инфузионная терапия.

Острая кишечная непроходимость

- Острая сильная схваткообразная боль в животе, рвота, задержка стула и газов, тахикардия, артериальная гипертензия, возможно повышение температуры тела от субфебрильных цифр до фебрильной.
- Язык сухой, обложен налётом.
- Живот вздут, резко напряжён, асимметричен.
- При пальпации определяется опухолевидное выпячивание, «шум плеска». Аускультативно «шум падающей капли».
- МП: спазмолитики — в/в, в/м, госпитализация.

Прерывание внематочной беременности (по типу разрыва маточной трубы)

- Анамнез: нарушение менструального цикла, задержка *mensis*.
- Острая внезапная боль внизу живота, иррадиация в прямую кишку, лопатку (Френикус — симптом), подреберье.
- Тошнота.
- Стул — в N. | Ps, | АД, t° — в N.
- Язык — в N. «+» симптом Щёткина-Блюмберга.
- МП: спазмолитики — в/в, в/м; инфузионная терапия, госпитализация.
- Острый (обострение хр.) аднексит.
- Анамнез: переохлаждение, гнойные бели, воспалительные заболевания придатков.
- Острые боли внизу живота с иррадиацией в пах, внутреннюю поверхность бедра, поясницу, задний проход.
- Стул — в N. | t°, язык -влажный, при перитоните — сухой, «+» симптом Щёткина-Блюмберга, | Ps, | АД.

ЖКБ. Печёночная колика

- Боли в правом подреберье, эпигастрии, иррадиирующие в правую лопатку, плечо. «+» печёночные симптомы — Ортнера, Мерфи (см. о. холецистит).

Острый панкреатит

- После погрешности в диете — интенсивная боль в эпигастрии, вокруг пупка, в правом и левом подреберьях.
- Боль носит опоясывающий характер.
- Неукротимая рвота, не приносящая облегчения.
- Может быть вздутие живота.
- Болезненность при пальпации в эпигастрии, вокруг пупка. «+» симптом Мендельсона (боль при поколачивании по левой рёберной дуге).
- Медицинская помощь: спазмолитики — в/м, госпитализация

Острая окклюзия мезентериальных сосудов

- Причины: эмболия, тромбоз, расслаивающая аневризма брюшной аорты, травма.
- На первой стадии (первые 5-7 часов) боль в животе, понос, шок.
- Расхождение между тяжёлым общим состоянием больного и относительно небольшими изменениями, выявляемыми при осмотре живота: вздутие его и умеренная болезненность без симптомов раздражения брюшины, ослабление перистальтики кишечника.
- Может быть тестовидная опухоль между пупком и лобком.
- Вторая стадия (через 7-12 часов) — боль усиливается, но перитонеальных симптомов нет.

Острая окклюзия мезентериальных сосудов

- **Третья стадия: больной кричит, мечется, не находит себе места, подтягивает ноги к животу, принимает коленно-локтевое положение.**
- **Резкая боль в животе схваткообразного характера, вздутие живота, задержка стула и газов, перистальтика останавливается.**
- **Кровянистый стул, шок, тахикардия, снижение артериального давления, рвота.**
- **Болезненность при пальпации в эпигастрии и вокруг пупка**

Ущемлённая грыжа

- Резкая боль, в области грыжевою выпячивания, которое становится плотным, болезненным, неврправимым.
- Тошнота, рвота, сухость во рту, тахикардия, снижение артериального давления.
- Положительный симптом «кашлевого толчка».