


Патологии ЖПО,
вызываемые микоплазмой и
хламидиями

Mycoplasma genitalium



Этиология и классификация

- уретрит у лиц обоего пола,
- Цервицит
- воспалительные заболевания органов малого таза у женщин.

Пути инфицирования

- ***У мужчин и женщин:***
 - полового контакт.

- ***У детей:***
 - интранатальный;
 - полового контакт

Клиника

- **Неосложненная** - в случае развития уретрита у мужчин и уретрита и/или цервицита у женщин;
- **Осложненная** - в случае развития воспалительных заболеваний органов малого таза.

Неосложненная форма

- **Более чем у 50% женщин** - субъективно асимптомное течение заболевания.

субъективные симптомы:

- слизисто-гнойные выделения из половых путей;
- ациклические кровянистые выделения;
- болезненность во время половых контактов (диспареуния);
- зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании (дизурия);
 - дискомфорт или боль в нижней части живота.

Объективные симптомы

- гиперемия и отечность слизистой оболочки наружного отверстия мочеиспускательного канала,
- инфильтрация стенок уретры,
- слизистые или слизисто-гнойные выделения из уретры;
- отечность и гиперемия слизистой оболочки шейки матки,
- слизисто-гнойные выделения из цервикального канала.

Осложненные формы

- Субъективные симптомы
- Объективные симптомы

Эндометриит

- **Субъективно:**
 - боль в нижней части живота, как правило, тянущего характера,
 - слизисто-гнойные выделения из половых путей;

при хроническом течении: субъективные проявления менее выражены, нередко отмечаются межменструальные скудные кровянистые выделения.
- **Объективно:**

при остром течении инфекционного процесса определяется болезненная, увеличенная матка мягкой консистенции, обильные слизисто-гнойные выделения из цервикального канала; при хроническом течении заболевания — плотная консистенция и ограниченная подвижность матки.

Сальпингофорит

- **Объективно:**
при остром течении: увеличенные, резко болезненные маточные трубы и яичники,
-укорочение сводов влагалища,
обильные слизисто-гнойные выделения из цервикального канала;
при хроническом — незначительная болезненность, уплотнение маточных труб;
- **Субъективно:**
- боль в области нижней части живота схваткообразного характера,
- слизисто-гнойные выделения из половых путей;
при хроническом течении: субъективные проявления менее выражены, отмечается нарушение менструального цикла;

Группа риска:

- лицам с клиническими и/или лабораторными признаками воспалительного процесса органов урогенитального тракта и репродуктивной системы;
- при предгравидарном обследовании;
- при обследовании женщин во время беременности;
- при предстоящих оперативных (инвазивных) манипуляциях на половых органах и органах малого таза;
- лицам с перинатальными потерями и бесплодием в анамнезе;
- половым партнерам больных ИППП;
- лицам, перенесшим сексуальное насилие

Материал для исследований

- у женщин: отделяемое (соскоб) уретры, цервикального канала, первая порция свободно выпущенной мочи;
- у мужчин: отделяемое (соскоб) уретры, первая порция свободно выпущенной мочи;
- у детей и у женщин, не имевших в анамнезе половых контактов с пенетрацией — отделяемое уретры, задней ямки преддверия влагалища, влагалища; при осмотре с использованием детских гинекологических зеркал — отделяемое цервикального канала.

Лечение

Препараты выбора:

- *доксциклина* моногидрат 100 мг перорально 2 раза в сутки в течение 10 дней (А)
- или *джозамицин* 500 мг 3 раза в сутки перорально в течение 10 дней (С)

Альтернативный препарат:

офлоксацин 400 мг 2 раза в сутки перорально в течение 10 дней (В)

Chlamydia trachomatis



Этиология

- Серотипы *Chlamydia trachomatis* A, B, Ba, C — возбудители трахомы;
- D—K — урогенитального хламидиоза;
- L1, L2, L3 — венерической лимфогранулемы

Классификация

- A56.0 Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта Хламидийный: цервицит, цистит, уретрит, вульвовагинит
- A56.1 Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов Хламидийный(ые): эпидидимит (N51.1) воспалительные заболевания органов малого таза у женщин (N74.4) орхит (N51.1)
- A56.3 Хламидийная инфекция аноректальной области
- A56.4 Хламидийный фарингит A56.8 Хламидийные инфекции, передаваемые половым путем, другой локализации
- A74.0 Хламидийный конъюнктивит (H13.1*)

Пути инфицирования

- У взрослых лиц:
 - половой контакт (инфицирование происходит при любых формах половых контактов с больным хламидийной инфекцией).
- У детей:
 - перинатальный;
 - половой контакт;
 - контактно-бытовой (в исключительных случаях девочки младшего возраста могут инфицироваться при нарушении правил личной гигиены и ухода за детьми).

Клиника

- Субъективные симптомы
- Объективные
- Более чем у 70% женщин отмечается субъективно асимптомное течение заболевания

Субъективные

- слизисто-гнойные выделения из уретры и/или половых путей;
- межменструальные кровянистые выделения;
- болезненность во время половых контактов (диспареуния);
- зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании (дизурия);
- дискомфорт или боль в нижней части живота.

Объективно

- гиперемия и отечность слизистой оболочки наружного отверстия мочеиспускательного канала,
- инфильтрация стенок уретры,
- слизисто-гнойные или слизистые необильные выделения из уретры;

- отечность и гиперемия слизистой оболочки шейки матки,
- Слизисто-гнойные выделения из цервикального канала,
- эрозии слизистой оболочки шейки матки

Другие патологии хламидийной

ЭТИОЛОГИИ:

- Инфекция аноректальной области
- Фарингит
- Конъюнктивит
- Поражение парауретральных желез
- ВЗОМТ

Диагностика

- Обнаружение специфических ДНК или РНК хламидий с помощью тест-систем
- метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ), иммуноферментный анализ (ИФА) для обнаружения антител к *S. trachomatis*, микроскопический и морфологический методы недопустимо использовать для диагностики хламидийной инфекции.

Лечение

Препараты выбора:

- доксициклина моногидрат 100 мг перорально 2 раза в сутки течение 7 дней (А) или
- азитромицин 1,0 г перорально однократно (А), или
- джозамицин 500 мг перорально 3 раза в сутки в течение 7 дней (С)

Альтернативный препарат:

- офлоксацин 400 мг перорально 2 раза в сутки в течение 7 дней (В)

Спасибо за внимание

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

На базаре баба Мила
Дезинфекцию купила.
Бедные микробики,
Приготовьте гробики!

