

Неотложная помощь при укусе змеи

Бакберген Улбала Бекжановна



- ❖ **Цель:** подготовить врача умеющего оказывать доврачебную помощь при укусе змеи.



Задача

1. Определить состояние человека.

2. Оказание первой помощи при укусе змеи.

□ «В Казахстане насчитывается **19** видов змей, **6** из них ядовиты. Пять из шести видов ядовитых змей представляют серьезную опасность для человека.

□ В мире самая ядовитая змея- **Тайпан**



Это степная и обыкновенная гадюки, палласов щитомордник, эфа и гюрза. В мире ежегодно от укуса ядовитых змей страдает более **2 млн.** человек, из которых около **120 тысяч** погибает.

В Южно-Казахстанской области (ЮКО) от укусов змей и каракуртов с начала года пострадали **40** человек.

Королевская кобра



Гюрза



Эфа



- Укусы **неядовитых** змей оставляют на теле **мелькие царапины** . А укус **ядовитых** змей **оставляют глубокие проколы от зубов**, через который впрыскивается яд.



Первые минуты после укуса ядовитой змеи

- При укусе ядовитой змеи - на коже остаются две небольшие **красные точки** -от проникновения ядовитых зубов.
- В первые минуты после укуса в этом месте возникает **слабая боль и чувство жжения, кожа краснеет, нарастает отек.**
- Через **2-6 часов** **появляются высокая температура, головокружение, сухость во рту, жажда, тошнота, рвота.**



Общие симптомы

- Тошнота
- Сонливость
- Головокружение
- Сердцебиение
- Понижение температуры тела
- **При тяжелой степени интоксикации:**
- Слабость
- Бледность кож
- Потливость
- **По мере нарастания симптомов появляется:** жар, одышка, возможно потеря сознания, развитие почечной недостаточности.

Если укусила змея

Нельзя

Делать
надезы на
месте укуса

Накладывать
жгут

Высасывать яд

Нужно

Пить много напитков
с мочегонным
эффектом, чай,
кофе

Обратиться за
медицинской
помощью при
первой же
возможности

Спать положив
укушенную
конечность 15-20см
выше уровня сердца



Что необходимо дать пострадавшему от укуса змеи ?

Первый помощь

Обильно промыть ранку от укуса кипяченой водой или слабым раствором марганцовки, или перекиси водорода

Если есть специальное устройство для отсасывания, приложить его к ране, оттянуть кровь вместе с ядом

Придать конечности возвышенное положение

Обеспечить пострадавшему покой

Наложить стерильную повязку

На место укуса наложить холод

Дать пострадавшему солевое слабительное

Отправить пострадавшего в медицинское учреждение



1. Если имеется шприц и противоядная сыворотка, то будет немедленное ее введение.
2. Сыворотка называется: **Bitis**
3. Немедленно приступить к отсасыванию яда
4. Противозмеиная сыворотка вводится в дозе 50-100ЕД внутримышечно.



Стадии местных изменений при укусе змеи ,черная мамба (в течение около 20 минут после укуса)



