



ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

10 класс

Ознакомьтесь с видеороликами

https://yandex.ru/efir?stream_id=46b2cf04faa31bdb95ce23970c77f388&from_block=logo_partner_player&t=67

https://yandex.ru/efir?stream_id=4cab2acb8925748f86a3ed8b98de2897&from_block=partner_context_menu

До 9 числа выполнить квизис **664834**

вещества

```
graph LR; A[вещества] --- B[проводники]; A --- C[полупроводники]; A --- D[диэлектрики]
```



проводники

полупроводники

диэлектрики

ПРОВОДНИКИ

- Содержат большое количество свободных зарядов – электронов (металлы) и ионов (растворы электролитов).
- При помещении в электростатическое поле свободные заряды начинают перемещаться, возникнет электрический ток.



ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

- Происходит перераспределение заряда – свободные электроны двигаются до тех пор, пока поле в проводнике не обратится в нуль.
- Электрический заряд располагается на поверхности как в случае заряженного, так и в случае незаряженного проводника.
- При равновесии зарядов напряженность поля внутри изолированного проводника равна нулю.

ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ




Рис. 236

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Электростатическая защита
- Экранирование




рис.9.15

ДИЭЛЕКТРИКИ



- Не имеют свободных зарядов при обычных условиях
- В зависимости от состава вещества подразделяются на полярные и неполярные
- Примеры: газы, стекло, пластмасса, резина, дистиллированная вод



ДИЭЛЕКТРИКИ


полярные

неполярны
e




Nonpolar covalent bonding

Hydrogen
(H_2 or $\text{H}-\text{H}$)




ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Поляризация – смещение положительных и отрицательных связанных зарядов по направлению напряженности внешнего электрического поля.





ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПОЛЯРНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ



Со стороны электрического поля начинает действовать сила, поворачивающая полярную молекулу диэлектрика по полю

ПОЛЯРИЗАЦИЯ НЕПОЛЯРНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ



Неполярная молекула деформируется под действием электрического поля, и дальше ведет себя как электрический диполь

ВЫВОД:

- Связанный заряд создает в диэлектрике электрическое поле, напряженность которого направлена **против** напряженности внешнего поля.
- Таким образом, поле внутри диэлектрика **ослабляется**.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ

Диэлектрическая проницаемость среды – физическая величина, показывающая, во сколько раз уменьшается напряженность электрического поля внутри данного однородного диэлектрика.

ε - диэлектрическая проницаемость среды

$$\varepsilon = \frac{E_0}{E'}$$

E_0 – напряженность внешнего поля,

E' – напряженность поля внутри поляризованного диэлектрика