

Презентація на тему Вирощування молодняка ВРХ

Підготувала студентка 2 курсу магістратури
Вет.забезпечення скотарства , вівчарства і
козівництва

Петькун Ганна Володимирівна

- Турботу про отримання здорового і життєздатного теляти слід проявляти ще під час перебування плоду в утробі матері. Тому дуже важливе значення має повноцінне годування тільних корів і особливо в сухостійний період.



- Щойно народженого теляти насухо обтирають солом'яним джгутом. Це сприяє очищенню пор шкіри від родової слизу і підсилює кровообіг.

У першу добу після отелення телят зважують, дають йому кличку і мітять. Результати зважування та відомості про походження теляти записують до книги обліку вирощування молодняку тварин. У профілакторії телят містять перші 15-20 днів. Вирощують їх в цей час ті ж доярки, за якими закріплені корови після отелу.

- Першою і майже нічим не замінної їжею для новонародженого теляти служить молозиво. Воно багате білковими і мінеральними речовинами, вітамінами і, крім того, має особливу речовину, що охороняє молодий організм від різних захворювань. Молозиво має послаблюючу властивість, сприяє очищенню кишечника теляти від первородного калу.



- Поятъ теляти молозивом не пізніше години після народження. Перші 15 днів життя теляті згодовують чотири рази на добу через рівні проміжки часу приблизно по 1,5 л молозива. Рекомендується напувати телят протягом дня:
- перший раз о 4 годині ранку,
- другий в 10,
- третій в 16,
- четвертий в 21 год.
- Молоко телятам дають парне, негайно після доїння корів. Якщо ж молоко охололо, його підігрівають до 38 градусів, опускаючи відро в гарячу воду. Після кожного годування мордочку телятко витирають сухим рушником.
- Найкраще поїти телят молозивом, а надалі і молоком матері зі спеціальних сосковий поїлок. З сосковий поїлок молоко в шлунок теляти надходить невеликими порціями і краще перетравлюється. Молоком матері телят випоюють до 20-денного віку.

- Молозиво - це перший продукт, який виділяється молочною залозою після отелення. Воно має особливий склад і відрізняється від звичайного молока високим вмістом протеїну, імуноглобулінів і зв'язаних з ними антитіл, які запобігають хворобам теляти, а також каротину, вітамінів А тощо. Так, у корів чорно-рябої породи в молозиві першого надою (1,5-2 год. після отелення) 65-66% сухої речовини становили білки, в числі яких частка імуноглобулінів сягала 54,3-56,6%. З кожним наступним доїнням вміст загального білка та імуноглобулінів послідовно знижується.



- Дослідженнями встановлено, що вміст загального білка і його фракцій у крові новонароджених телят знаходиться у прямій залежності від кількості і якості згодованого в перший день молозива. Ці зміни відбуваються в основному за рахунок різкого збільшення γ -глобулінової фракції, яка за своїми фізико-хімічними властивостями досить близька до антитіл. У перші години після народження глобуліни і зв'язані з ними антитіла молозива всмоктуються із травного каналу теляти в кров без змін.



- Час першого згодовування молозива дуже важливий. Як специфічна і природна їжа новонародженого молозиво відіграє роль зі зміцнення його здоров'я у перехідний період, тобто перші два дні після народження. Молозиво має сильні бактерицидні, а також і послаблюючі властивості й, потрапляючи до організму теляти, підвищує його імунобіологічний статус і сприяє очищенню шлунка й кишечника від первородного калу. Ось чому дуже важливо дати йому молозиво відразу, як тільки корова відпочине й у теляти з'явиться рефлекс ссання.



- За даними вітчизняних і зарубіжних дослідників, найкращі результати одержують, коли теля споживає молозиво впродовж перших 30-90 хв. після народження, але ні в якому разі не пізніше 2 год. Затягування із першим впоюванням молозива спричинює заселення травного каналу несприятливою патогенною мікрофлорою, яка викликає важкі порушення травлення і призводить до диспепсії та загибелі телят. Нині за кордоном і в деяких господарствах України практикують введення консервованого (замороженого у 1,5-2 літрові пластикові бутлі) і підігрітого до температури 36-38°C молозива, одержаного від повновікових корів через 25-30 хв. після народження за допомогою спеціального зонда безпосередньо в сичуг теляти



- Зазвичай телятниці приймають від доярок телят у віці 20 днів. У цей час із профілакторію їх переводять до загального телятник. Прийом здійснюється за актом, в якому вказується жива вага і стан здоров'я кожного теляти.



- Телят до 2-місячного віку містять по одному в клітці або верстаті. Бажаний розмір для одного теляти: довжина 1,6, ширина і висота 1,5 метра. У віці 2 місяців здорових телят можна утримувати в групових станках по три-п'ять голів в кожному. У групи підбирають телят по можливості одного віку і однакового живої ваги.



- Повноцінне годування телят є основною умовою успішного їх вирощування.
- Щоб середній добовий приріст теляти в 6-місячному віці становив 550-600 г, йому слід згодувати за молочний період 200 кг незбираного молока, 425 кг знятого (відвійок), а також необхідну кількість соковитих кормів і сіна.
- Цільним молоком випоюють телят 20-30 днів, а з 21-24-го дня поступово переходять до згодовування відвійок.
- З 51-го дня незбиране молоко повністю замінюють обратом, який дають на добу по 7 л і більше на теля.

- З 21-го дня починають підгодовувати телят концентратами.
- Спочатку рекомендується давати сіяну вівсянку, а з місячного віку їх привчають і до інших концентратів - макуха, висівки, дерти з ячменю і кукурудзи, даючи ці корми в суміші.
- Поряд з дачею сухих концентратів з досвіду передових телятниць слід застосовувати для годівлі телят вівсяний кисіль, відвар макухи, лляного насіння в суміші з молоком або обростом. Дуже корисно згодовувати сінної настій.
- Загальний обсяг рідких кормів (незбираного молока, відвійок, відварів і сінного настою) не повинен перевищувати 15 літрів на добу на голову.

- З 10-денного віку телят привчають до поїдання сіна. Раннє привчання телят до сіна сприяє розвитку органів травлення, що сприяє нормальному росту і розвитку молодняка.
- Передові телятниці з раннього віку привчають телят до соковитим кормів

Для нормального росту і розвитку молодняк вимагає великої кількості різноманітних мінеральних речовин. В якості мінеральної підгодівлі рекомендується давати телятам кухонну сіль, крейда, кістяну муку. Кухонну сіль включають в раціон з 25-денного віку по 3 г на голову на добу, в 6-місячному віці дають по 20 г.



- При вирощуванні телят в фермерських господарствах велике значення має чистота приміщень, де утримуються телята, посуду, щоденне чищення телят щіткою і часта зміна підстилки. Телятам вкрай необхідне свіже повітря. Взимку їх випускають на прогулянку з 10-го дня на 10 хвилин. До 2-місячного віку тривалість прогулянок доводять до 2 годин на день.



ДЯКУЮ

УВАГУ!

