

Лекарственные средства в гинекологии

***Подготовили:** студентки группы 2-2
Горбенко Анна и Гнусарева Виктория*

***Преподаватель:** Овчарова Елена Алексеевна*

Гинекологические болезни – это заболевания женских половых органов. Наиболее распространенные заболевания вызываются такими причинами, как инфекции, травмы и гормональные нарушения.




Чтобы выявить гинекологическое заболевание, необходимо раз в полгода и по необходимости проходить осмотр у врача–гинеколога.



Наиболее распространенные заболевания женской половой системы и препараты для их лечения:

□ Вульвит – воспаление наружных женских половых органов.

Характерные симптомы – отечность, покраснение больших и малых половых губ, их зуд и жжение



Для устранения признаков воспалительного процесса в области наружных половых органов пациенткам любого возраста назначают препараты местного воздействия.

Инстиллагель. Разрешается проводить лечение мазью у девочек и женщин. Данное средство оказывает губительное воздействие практически на все группы патогенной микрофлоры, в том числе грибы. В его составе присутствует лидокаин, за счёт чего происходит облегчение симптоматики, исчезает зуд, жжение, боль. Применяется местно на поражённых участках.



Пимафукорт. Такое средство является комбинированным и содержит антибиотик и кортикостероид, благодаря чему оказывает противомикробное воздействие на различные группы микроорганизмов, включая кокков, эшерихии, протейя, устраняет воспалительные изменения в области вульвы. Разрешен к применению у детей старше 1 года. Также он может использоваться и беременными женщинами, кормящими мамами. Препарат нужно применять, точно соблюдая дозировку и не превышая курс лечения, в противном случае может наблюдаться синдром отмены, а также такие побочные реакции, как пурпура, дерматиты, истончение кожи.



□ *Вагинальный кандидоз (молочница) - это воспаление слизистой оболочки влагалища, вызванное дрожжеподобными грибами (кандида)*

При кандидозе женщины жалуются обычно на белые, творожистые выделения из влагалища с неприятным кисловатым запахом. Частым симптомом является зуд, который усиливается после длительной ходьбы и во время менструации.



На российском фармацевтическом рынке выбор препаратов от молочницы представлен довольно широко, и среди большого спектра лекарственных препаратов выделяют наиболее эффективные:

Дифлюкан — самое популярное средство. Капсулы содержат флуконазол, который подавляет рост грибков. Лечиться им очень просто — достаточно выпить одну капсулу с 150 мг активного вещества. Имеет в противопоказаниях беременность, период лактации, заболевания печени и почек.






Пимафуцин — эффективный и популярный препарат, разрешенный для лечения женщин во время беременности и лактации, выпущен в форме свечей, крема и таблеток. Пимафуцин известен хорошей переносимостью, нетоксичностью, и отсутствием аллергических реакций. Действующее вещество — **натамицин** — это противогрибковый антибиотик, обладающий широким спектром действия.

□ Миома (фибромиома) — это доброкачественная опухоль из мышечной (мышечно и соединительной) ткани.

Миома матки обычно протекает бессимптомно. Однако существуют некоторые признаки, по которым женщина может заподозрить у себя миому матки:

- ✓ чересчур обильные кровотечения при менструации;*
- ✓ нарушения цикла;*
- ✓ боли внизу живота или в пояснице.*





У большинства пациенток кардинально уменьшаются проявления таких симптомов, как боль в области малого таза, учащенное мочеиспускание. Применение препарата позволяет уменьшить объем хирургического вмешательства и осложнений после него.

Комбинированная терапия с использованием БУСЕРЕЛИНА и препаратов железа в течение 3 месяцев позволяет устранить анемию, вызванную обильным менструальным кровотечением. Длительное применение БУСЕРЕЛИНА может стать альтернативой для пациенток, которым противопоказано хирургическое вмешательство.

□ *Киста яичника – опухолевидное образование яичника доброкачественного характера.*

Большая часть кист яичников длительное время не имеют выраженных клинических проявлений.

- ✓ *болями в нижних отделах живота*
- ✓ *нарушениями менструального цикла*
- ✓ *увеличением и асимметрией живота*





Дюфастон— это прогестаген, активный при приеме внутрь. Дидрогестерон по своей молекулярной структуре, химическим и фармакологическим свойствам весьма близок к природному прогестерону. Он показан во всех случаях эндогенной недостаточности прогестерона. Препарат не имеет контрацептивного действия.

□ Климакс – физиологический период в жизни женщины, характеризующийся угасанием репродуктивной функции вследствие гормональных изменений в организме.

Проявляется постепенным прекращением менструации.
внезапных приступов прилива крови

- ✓ раздражительностью,
- ✓ колебаниями артериального давления
- ✓ повышенной сухостью кожи и слизистых оболочек
- ✓ расстройством сна



Бонисан – это биологически активная добавка к пище, которая применяется женщинами в период менопаузы для улучшения общего состояния.

Лефем- способствуют восполнению недостатка эстрогенов в организме, уменьшают выраженность симптомов, возникающих в период климакса. При длительном приеме предотвращает развитие поздних климактерических нарушений



□ Цистит – воспалительное поражение слизистого (реже – подслизистого и мышечного) слоя мочевого пузыря острого или хронического течения.

Цистит у женщин сопровождается:

- ✓ болезненным, учащенным мочеиспусканием с остаточными ощущениями жжения и рези
- ✓ болями в области малого таза
- ✓ чувством недостаточно полного опорожнения мочевого пузыря





Антибактериальное средство из группы фторхинолонов. Оказывает бактерицидное действие. Воздействует на бактериальный фермент ДНК-гиразу, обеспечивающую сверхспирализацию и, таким образом, стабильность ДНК бактерий. Дестабилизация цепи ДНК приводит к гибели бактерий. Обладает широким спектром антибактериального действия.



Подавляет первый этап синтеза клеточной стенки бактерий. Обладает также специфическим действием — угнетает энолпирувил-трансферазу, что обеспечивает отсутствие перекрестной резистентности и возможность синергизма с другими антибактериальными средствами