

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

- **Болезнь Бехтерева относится к хроническим системным воспалительным заболеваниям:**
- **- поражение крестцовоподвздошных суставов;**
- **- синовиальных (межпозвонковых, ребернопоперечных) и несиновиальных (дискоverteбральных) суставов позвоночного столба;**
- **- корневых (тазобедренных и плечевых) суставов;**
- **- периферических суставов нижних конечностей;**
- **- мест прикрепления связок и сухожилий к телам позвонков и костям таза.**

- **Первичными местами поражений при болезни Бехтерева являются:**
- **- крестцово-подвздошные суставы;**
- **- ниже-грудной и верхне-поясничный отдел позвоночника;**
- **- впоследствии изменения могут встречаться во всех отделах позвоночника.**

- **Вовлечение в патологический процесс периферических суставов незначительно или умеренно выражено, хотя и составляет до 50 % всех случаев. В этом случае говорят о *периферической форме болезни Бехтерева.***
- **Изменения в тазобедренных и плечевых суставах встречаются наиболее часто, при сравнении с частотой поражения периферических суставов.**
- **Поражение осевого скелета и корневых (тазобедренных и плечевых) суставов относится к *ризомелической форме ББ.***

- ***Сакроилеит*** при анкилозирующем спондилоартрите появляется на самых ранних этапах развития заболевания и характеризуется в типичных случаях *двухсторонним и симметричным распространением*.
- ***В редких случаях*** первичные изменения в крестцовоподвздошных суставах характеризуются *односторонними или несимметричными изменениями*.
- Изменения определяются и в *синовиальной* (нижней и наружной), и в *связочной* (верхней и внутренней) частях сустава.
- При этом изменения в большей степени обнаруживаются со стороны *подвздошной кости* (Resnick, 1988).

- **Изменения в крестцово-подвздошных суставах является обязательным для диагноза анкилозирующего спондилоартрита.**
- **Отсутствие сакроилеита вызывает большие трудности при верификации этого заболевания и заставляет усомниться в диагнозе болезни Бехтерева.**
- **Очень редко изменения в позвоночнике могут протекать с отсутствием убедительных рентгенологических симптомов поражение крестцово-подвздошных суставов. В этом случае требуется динамическое наблюдение за изменениями в этих суставах и проведение дифференциального диагноза с другими заболеваниями из группы серонегативных спондилоартритов.**