

Стеноз гортани

Причины заболевания

- Это заболевание может быть вызвано следующими причинами:
- острые инфекционные заболевания (скарлатина, дифтерия, коклюш, корь);
- травмы области шеи, с повреждением гортани;
- аллергические заболевания;
- травмы гортани (ожоги глотки и гортани);
- заболевания внутренних органов;
- хронические инфекционные заболевания;

Стадии заболевания

- В клинической картине стеноза гортани различают четыре стадии, которые проявляются следующим образом:

1 стадия – компенсации:

- **1 стадия – компенсации:**
- **пациент спокоен, обычное поведение;**
- **затрудненное дыхание появляется при физической нагрузке, плаче;**
- **дыхание шумное, одышка инспираторная.**

2 стадия – субкомпенсации:

- **2 стадия – субкомпенсации:**
- **появляется выраженное беспокойство;**
- **шумное дыхание в покое – продолжительный вдох, резкий выдох;**
- **в акте дыхания участвует вспомогательная мускулатура;**
- **отмечается значительная тахикардия до 100 и выше в 1 минуту, повышение артериального давления;**
- **больной занимает вынужденное положение, сидя с запрокинутой головой;**
- **выраженные признаки акроцианоза.**

3 стадия – декомпенсации:

- **3 стадия – декомпенсации:**
- Резкое, психоэмоциональное беспокойство, чувство страха смерти;
- дыхание поверхностное учащенное;
- выраженная тахикардия и повышенное АД;
- кожа лица багрово – синюшная, покрыта холодным липким потом;
- выраженный цианоз губ и ногтей;
- голос и кашель становятся беззвучными.

4 стадия – асфиксии:

- **4 стадия – асфиксии:**
- **Помрачение или потеря сознания;**
- **Патологическое дыхание типа – Чейн – Стокса;**
- **зрачки широко расширены;**
- **выраженная бледность кожных покровов;**
- **артериальное давление резко снижено или отсутствует;**
- **наступает летальный исход.**

оказание неотложной помощи

- **Выбор способа оказания неотложной помощи, при остром стенозе гортани, определяется причиной заболевания, стадией стеноза, состоянием пациента.**
- **Необходимо помнить, что отек, возникший в любом месте гортани, может быстро распространиться на область голосовых складок.**
- **Поэтому при оказании неотложной помощи следует предусмотреть возможность немедленной госпитализации в ЛОР – отделение, где может быть оказана помощь в полном объеме.**

Неотложная помощь

- Неотложная помощь при остром стенозе гортани:
- голосовой покой;
- горчичные ножные ванны;
- обеспечение в помещении свежего прохладного воздуха;
- экстренная госпитализация.

Лечение в стационаре

- В стационаре при 1 -2 степени стеноза проводится консервативное лечение:
- оксигенотерапия;
- лекарственные средства, уменьшающие отек тканей – мочегонные (лазикс), снижающие проницаемость сосудистой стенки (10% раствор хлористого кальция, 20% раствор глюкозы с инсулином, 5% раствор аскорбиновой кислоты), десенсибилизирующие, гормональные препараты;
- лекарственные средства, стимулирующие дыхательный центр (1% раствор лобелина), раствор 2% ношпы с раствором 1% димедрола в/м.
- антибактериальные препараты по показаниям.

Лечение в стационаре

- При стенозах 3-4 стадии применяется неотложная хирургическая помощь: коникотомия, трахеотомия.