

Первая медицинская помощь при кровотечении.



- **Кровотечение** - излияние (вытекание) крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок.

Типы ран

- Огнестрельные: сквозные, слепые, касательные
- Резаные: менее инфицированные, сильно кровоточат;
- Колотые – глубокие с вероятной инфекцией внутренних органов
- Рубленые – сопровождаются ушибом, размозжением мягких тканей;
- Ушибленные, рваные и размозженные – пропитаны кровью, омертвленная ткань.
- Укушенные – всегда инфицированы слюной.

По характеру
кровотечения



артериальное



венозное



капиллярное



паренхиматозно
е

По степени
повреждения



Внутреннее
кровотечение



Наружное
кровотечение

При **артериальном** кровотечении изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, бьет сильной пульсирующей струёй.

При **венозном** кровотечении кровь более темная и обильно выделяется из раны непрерывной струёй.

При **капиллярном** кровотечении кровь выделяется равномерно по всей поверхности раны (как из губки).

Паренхиматозное кровотечение наступает при повреждении внутренних органов.

Смешанное кровотечение характеризуется признаками артериального и венозного кровотечений.

- Средства оказания ПМП – асептика, антисептика специальные средства и методы.
- Способы остановки кровотечения – давление на артерию, подъем конечности, жгут, бинт, подручные средства

- Асептика и антисептика

Антисептика – мероприятия направленные на уничтожение или ингибирование патогенных микроорганизмов (механическая, физическая, химическая и биологическая).
Асептика – обеззараживание ран или предметов контактирующих с поверхностью ран (спирт, йод, бинт).

Перевязочный материал

Салфетки
стерильные

Бинт

Повязка
стерильная
малая

Вата:
стерильная,
нестерильная,
компрессионная
(при наложении
шин)

Косыночные
повязки, повязки
(простыни,
рубашки)

ПМП при артериальном кровотечении

- Главным способом, часто спасающим жизнь пострадавшему, является временная остановка кровотечения.
 - пальцевое прижатие артерии,;
 - асептические действия;
 - нанести тугую повязку;
 - Придать возвышенное положение и обеспечить ее покой.
 - нанесение жгута (если кровь не останавливается)
 - Обезболить (анальгин, шприц тубик);
 - при сильной потере крови обильное сладко – соленое питье, чай.
 - вызвать врача.

Нанесение жгута: выше раны, подложить ткань, вставить записку (часы, минуты). Правильность наложения жгута контролируется отсутствием пульса на периферическом сосуде.

Лето

Зима

Записка вкладывается под жгут с указанием времени (часы, минуты)


60 мин

60 мин.

Через 1ч.
Ослабить на
15-10 мин.

Через 40
мин
ослабить на
10-15 мин.

Через 1ч.
жгут
следует
ослабить
на 10-15
мин.



ПМП при венозном кровотечении

извлечь из-под поражающего фактора

асептические действия;

придать возвышенное положение

нанести тугую повязку

обезболить, обеспечить покой, обильное питье, вызвать врача