

Қазақстан Республикасының Денсаулық Сақтау Министрлігі
Семей Мемлекеттік Медицина Университеті
Молекулалық биология және микробиология кафедрасы

СӨЖ

Тақырыбы: Пародонтоз аурулары. Патогенез. Алдын алу және емдеу

Жоспар:

- I. Пародонтоз жайлы түсінік;
- II. Негізгі бөлім:
 - 2.1. Пародонтоз аурулары;
 - 2.2. Пародонт ауруларының себептері;
 - 2.3. Ауруды алдын алу және емдеу;
- III. Корытынды;
- IV. Пайдаланылған әдебиеттер.

Kipіспе:

Пародонтоз (көне грекше: παρα- — маңы және көне грекше: ὀδόντος-тіс) пародонт тіндерінің жеткіліксіз қоректенуімен (дистрофия) туатын созылмалы ауру.

Бұл тіс мойны түбірінің жалаңаштанып, қызыл иектің семіп отырыумен сипатталады. Бұдан тіс тканьдері желініп, сына тәрізді ақау пайда болады да, тіс түбірлері ыстық-суыққа сезімталдығы артып мазалайды.



Пародонт аурулары

Пародонт ауруларына тән белгілер – қызыл еттің қызаруы мен қанауға бейімділігі, ауыздан жағымсыз иіс шығып, тістесудің дұрыс болмауы, тістің түптерінің жалаңаштанып қалуы.

Пародонтологияда жиі кездесетін аурулар - гингивит, пародонит, пародонтоз.




Гингивит

Гингивит – бұл қызыл еттің беткі қабынуы, катаралдық түрі де болады (шырышты қабығының қабынып, ісінуі). Бұл жағдайда науқастың аузынан жағымсыз иіс шығып, қызыл еттері қанайды. Ауыз куысынан қызыл еттің қызарғаны мен шырышты қабығының ісінгені көрініп тұрады.

Гипертрофиялық гингивит кезінде қызыл ет ұлғайып, гипертрофияланады. Кей жағдайларда қызыл ет тістерді жартылай немесе жартысынан көбін жауып тұрады. Жара гингивит – бұл жара участкері мен қызыл еттің некрозымен (семуімен) қатар жүретін өте ауыр сырқат.

Егер қызыл ет уақытында емделмесе, ол пародонтитке айналады.



ГИНГИВИТ





Пародонтит

Пародонтит – бұл қызыл ет пен буын аппаратында жүретін қабыну үрдісі, буын аппараты тісті жақтың шұнқырында ұстап тұрады. Осылайша бұл аурудың келесі белгілері бар: тістердің тұптері жалаңаштанып қалады, тістер қозғалыссыз қалып, көлбеу бұрышы өзгереді, қызыл ет қызарып, қызыл ет іріндейді. Тіс пен шұнқыр (альвеола) арасында патологиялық қалта пайда болып, пародонтит белгілері біліне бастайды.


СТЕПЕНИ ПАРОДОНТИТА



пародонтит легкой
степени



умеренный
пародонтит



тяжелый
пародонтит

Пародонтоз ауруларының пайда болуына вирустар мен бактериялардың қатысы болмайды. Ауру гигиеналық заттар, ыдыс, ауа арқылы таралмайды. Қазіргі кезде медицинада пародонтоз ауруларын тудыратын факторларға:

- тістемнің дұрыс болмауы;
- генетикалық ақаулар;
- ауыз қуысындағы болезнестворная микрофлора;
- тіс пен қызыл иек тіндерінің қабынуы;
- қант диабеті, қантамырлар склерозы, гипертоникалық аурулар жатады

Пародонтиттің 3 ауырлық дәрежесі бары белгілі. Женіл дәрежесі кезінде науқастардың қызыл еті қышып, ауыздан жағымсыз иіс шығып, тіске шөгінділер жиналады. Осы кезеңде тіс пен қызыл ет арасында патологиялық тіс-қызыл ет қалталары деп аталатын санылау тәрізді кеңістік пайда болады.

Пародонтиттің орташа дәрежесі кезінде тіс-қызыл ет қалталары одан сайын терендеп, терең сүйек қалталары пайда болады. Нәтижесінде аузында хрониосепсис басталады – бұл ағзаның ең қатты улануы. Пародонтиттің ауыр дәрежесі кезінде тістер босаңсып, түсіп қалады.

Пародонтоз

Пародонтоз – бұл пародонттың барлық ұлпаларының дистрофияға ұшырап, созылмалы түрде қан кернеуі. Тістердің тұптері жалаңаштанып, температура ауытқығанда ауырсынады.

Пародоноз себептері – бұлар ең алдымен тістегі тастар, дұрыс тістеспеу немесе протездің дұрыс орнықпауы. Егер пародонтоз уақытында емделмесе, қабыну үрдісі тістердің босаңсып, түсіп қалуына дейін апарады.

Қазіргі заманғы пародонтология қызыл ет ауруларының алдын-алу мен пародонтозды кешенді емдеудің тиімді әдістерін ұсынады. Емдеу табыстылығы пародонт патологиясы мен әр накты жағдайда тірі ұлпаларға ықпал ету механизмдерінің әрекеттесуін жақсы білуден басталады.

Здоровые зубы



Пародонтоз



Здоровые десна



Пародонтоз



Егер сізде тәмендегі белгілер байқалса, дереу стоматологтың кеңесіне жүргініңіз:

- тістерді тазалаған кезде қызыл еттің қанауы
- ауыздан жағымсыз иістің шығуы
- тістерді қара қактың басуы
- қызыл еттің ісінуі
- тіс тұптерінің жалаңдануы
- тістердің қарысуы

Қызыл етті емдеуді алдымен толық зерттеуден бастайды, өйткені қызыл ет ауруларының себептері стоматологиялық себептермен қатар, ағзадағы басқа да қындықтарға байланысты болуы мүмкін.

Патологиялар орын алмаған жағдайда стоматолог пародонтты зондтауға кіріседі. Ол тіс-қызыл ет қалталарының терендігін өлшеп, оларды орнатылған нормалармен салыстырады. Тіс-қызыл ет қалталары норма бойынша 2-3 мм-ден аспауы тиіс. Бұл шара міндетті саналады, өйткені соның нәтижелерінің негізінде пародонтитті емдеу әдістері құрылады. Егер пародонтит жаңа ғана дамып келе жатқан болса (тіс-қызыл ет қалталарының терендігі 5 мм шамасында болса), пародонтолог тек тістегі тастандарды алумен шектеледі.

Егер тіс-қызыл ет қалталарының терендігі 7 мм-ден асып кетсе, жалаң тіс түбірін өндеу амалы орындалады. Бұл түбірдің бұдырлы бетіне бактериялар жиналмауы үшін керек.

Түбір өнделгеннен кейін қызыл ет қайтадан тіске иек артады.

Өте терең қалталар қалыптасқанда түбірді тегістеп, қалталарды жою үшін микрохирургиялық әрекет жасалады.



Пародонт ауруларын емдеу әдістері

Консервативті

Хирургиялық

Консервативті әдістерге пациентке ауыз қуысының гигиенасын, тістегі шөгінділерді алуды үйрету, түсіндіру, дәрі-дәрмектік инъекциялар мен таңғыштар жатады.

Кеңес: қызыл етті емдеуді КӘСІБИ ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЗАЛАУДАН бастаңыз. Пародонтит (гингивит) кезеңінде бұл қызмет ауру белгілерін жою үшін жеткілікті болуы да мүмкін. Қызыл еттің қабынуы мен қанауына тістегі қактар, тістегі тастар мен ауыздың дұрыс күтілмеуі де себеп болуы мүмкін.

Хиургиялық әдістерге жабық және ашық кюретаж, кесінділік операция, сонымен қатар еріннің алдыңғы жағы мен жүгеншесінің, тілдің икемділігіне қатысты алдын-алу хиургиялық шаралары да жатады

Жабық және ашық кюретаж периодонтиллік женіл формалары кезіндегі тиімді ем болып табылады және тіс аралықтарын қабыну ұлпаларынан тазарту, түбірдің бетін өндеу мен қызыл ет асты шөгінділерін алудан тұрады.

Орташа және ауыр дәрежелі пародонтитті емдеудің тиімді жолы –**кесінділік операция болып саналады**. Бұл операция барысында тіс аралықтарынан барлық қабынған ұлпалар алынып, тіс беттері тегістеліп, жылтыратылып, шырышты-сүйек беті кесіндісі модельденеді. Кейде сүйек-икемді материалдары мен мембрана орнату қажет болуы мүмкін.

Кесінділік операция қызыл ет кесіндісі аршылып, сүйектің жаңа нобайы жасалып, тас қалдықтары алынады. Тігістер арқылы қызыл ет кесіндісі жаңа орынға орналастырылады, қызыл ет бітеледі.

Қорытынды:

Қорыта келе айтарым: пародонтит жазылатын ауру, алайда көпжақты, кешенді қарауды және білікті мамандар тобының жұмысын жұмылдыруды қажет етеді.



ПАЙДАЛАНЫЛГАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1) <http://stomatologiya.kz/kz/uslugi/parodontologija.html>;

