


# СНІД – загроза людству



- 

**А**

**Автор: КОХАНЕНКО В.**

# **1 – го грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом**

- **Відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом було започатковано з 1987 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я Глобальною програмою зі СНІДу і вперше цей день був відзначений 1 грудня 1988 року.**
- **Його мета: підвищити рівень обізнаності людей про цю інфекційну хворобу, вшанувати пам'ять тих, хто пішов з життя, та святкування здобутків – розширення лікувальних профілактичних послуг.**



# **СНІД – загроза людству**

- У червні 2011 року світові лідери зібралися у штаб – квартирі ООН у Нью - Йорку на Засідання високого рівня з питань ВІЛ/СНІДу в рамках Генеральної асамблеї ООН, на якому одноставно прийняли нову Декларацію «Активізація на зусиль з викорінення ВІЛ/СНІДу»



# **СНІД – загроза людству**

- Декларацією передбачено цілі боротьби з ВІЛ – інфекцією на період – до 2015 року, а саме:
- - вдвічі скоротити показники передачі ВІЛ – інфекції статевим шляхом;
- - скоротити на 50% передачу ВІЛ – інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків;
- - викоринити передачу ВІЛ – інфекції новонародженим;
- - розширити доступ до антиретровірусної терапії з тим, щоб це рятівне лікування отримували понад 15 млн. осіб;
- - скоротити на 50% смертність від туберкульозу серед людей, які живуть з ВІЛ – інфекцією.

# **СНІД – загроза людству**

- В цьому році та на весь період до 2015 року боротьба з ВІЛ/СНІДом буде проводитися під лозунгом :
- **«нуль» - число нових захворювань на ВІЛ - інфекцію,**
- **«нуль» - дискримінації людей, які живуть з ВІЛ – інфекцією,**
- **«нуль» - смертей від СНІДу.**




## ***ВІЛ може передаватися:***

- - при переливанні крові, пересадці донорських органів;
- - від ВІЛ – інфікованої матері дитині під час вагітності і пологів, годування груддю;
- - у разі користування спільними голками для ін'єкцій, лезами для гоління. манікюрними ножицями, нестерильними інструментами пірсингу та татуажу;
- - під час сексуальних контактів.




# Шляхи передачі











# **СНІД – невиліковна хвороба**

- **Установити хворобу можна через 2 – 3 місяці після проникнення вірусу до організму після аналізу крові.**
- **Ознаки хвороби:**
  - - **постійна втома;**
  - - **підвищена температура, озноб, сильне нічне пітіння;**
  - - **зменшення ваги;**
  - - **запалення лімфатичних вузлів;**
  - - **виразки рожевого кольору на поверхні шкіри;**
  - **або під шкірою;**
  - - **постійна діарея;**
  - - **постійний сухий кашель, що супроводжується задишкою.**



# ***Згадаймо, як ВІЛ не передається:***

- - під чхання та кашлю,
- - через поручні у громадському транспорті,
- - при рукостисканні та обіймах,
- - через піт чи сльози;
- - у разі використання спільної ванни, унітазу, дитячих горщиків;
- - через воду у басейні;
- - під час поцілунку;
- - під час спільних занять спортом;
- - при користуванні фонтанчиком для питної води;
- - при користуванні спільними побутовими приладами;
- - через монети та паперові гроші;
- - через контакти з варинами та укуси комах



# Медицина виділяє п'ять основних стадій ВІЛ-інфекції

- **Стадія інкубації** – період від моменту інфікування людини до вироблення організмом антитіл. В середньому цей період становить від 3 тижнів до 3 місяці. Варто пам'ятати дві страшних істини: ще з моменту зараження ВІЛ-інфікований є переносником хвороби (тобто, може заражати інших) і він вже невиліковний. Рано чи пізно в нього з'явиться СНІД.
- **Стадія первинних проявів** – це період реакції організму на ВІЛ-інфекцію. Може протікати безсимптомно або із загостреннями. Тривалість стадії – до трьох тижнів.
- **Стадія латентна** – період повільного прогресування імунодефіциту. Ця стадія може продовжуватись
  - від 2 до 20 років.



# Стадія вторинного захворювання – у людини розвивається СНІД.

- Поступово організм вражається інфекційними та онкологічними захворюваннями. На початку, ці хвороби можуть проходити самі або піддаються лікуванню. З часом проблеми із здоров'ям у ВІЛ-інфікованих стають більшими. Тривалість стадії – в середньому 2 роки. Ось список хвороб, які можуть вражати хворого на СНІД:
  - Пневмонія
  - Токсоплазмоз і стонгілоїдоз мозку та легень
  - Кандіоз ротової порожнини і стравоходу
  - Криптококкоз центральної нервової системи
  - Туберкульоз
  - Сальмонельоз
  - Зараження вірусом звичайного герпесу
  - Фурункули
  - Лімфотомі
  - Грибкові захворювання та лишай
  - Саркома Капоши
- **Термінальна стадія** – заключна. Відбувається важке враження організму. Будь-яке лікування стає неефективним. Хворий помирає протягом декількох місяців.



# Статистика





- Число інфікованих у світі перевищило 433 млн. людей.
- Щорічно у світі реєструється 5 млн. ВІЛ-інфікованих, помирає щодоби 5 тис. людей.
- Щодня у світі заражається ВІЛ 16 тис. людей.
- За даними фонду ООН, кожні 14 секунд у світі вірусом імунодефіциту людини заражається одна людина у віці від 15 до 24 років.



- Україна посідає **перше місце** по кількості ВІЛ-інфікованих серед країн Східної Європи.
- Серед молоді перше місце з усіх причин смертності – СНІД.
- За весь період реєстрації ВІЛ-інфекції/СНІДУ **в Україні вмерло 11 822 людини, з них 233 дітей.**



# ” Зоряні“ жертви СНІДу



*Цінуй життя – зупини  
СНІД!*

*Майбутнє – без СНІДу!*