



Заболевания с фекально-оральным механизмом передачи



- Фекально-оральный механизм передачи инфекции — механизм передачи инфекции, при котором локализация возбудителя инфекции преимущественно в кишечнике определяет его выведение из зараженного организма с испражнениями (фекалиями, мочой) или рвотными массами.

- **Дизентерия – это острая или хроническая инфекция, которая протекает с явлениями общей интоксикации и поражает преимущественно толстый кишечник человека.**

Germ Farm



Scrub'em!

www.1st-in-handwashing.com

Дизентерия – симптомы заболевания

- жидкий стул с включениями слизи и кровяных сгустков;
- тенезмы – ложные позывы к опорожнению;
- тошноту, рвоту;
- головные боли;
- потерю аппетита;
- общую слабость, быструю утомляемость;
- обезвоживание организма;
- повышение температуры тела.

Дизентерия: профилактика

Дизентерию можно предупредить, соблюдая правила личной и коммунальной гигиены.



Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи

Вирусные гепатиты – это группа распространенных и опасных для человека инфекционных заболеваний, которые довольно значительно различаются между собой, вызываются разными вирусами. Имеют общую черту – это заболевание, поражающее в первую очередь печень человека и вызывающее ее воспаление.

Гепатит А или болезнь Боткина.

- Гепатит А – это инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом.



- Заражение людей происходит при употреблении инфицированной воды (водным путем) и пищи (алиментарным путем), иногда контактно-бытовым путем.



Профилактика гепатита А

- Обязательная госпитализация
- Медицинское наблюдение в течение 45 дней с момента госпитализации
- Текущая и заключительная дезинфекция в очаге
- Биохимическое и иммунологическое обследование лиц, которые были в контакте с больным
- Выписка больного не ранее чем через 21 день после появления желтухи при условии нормализации клинико-лабораторных данных

Полиомиелит

- Полиомиелит, спинальный детский паралич, болезнь Гейне-Медина – это названия тяжелого инфекционного заболевания.




Страшные фотографии перенесших полиомиелит деток в странах, где не проводится вакцинация:





- Профилактика полиомиелита осуществляется с помощью инактивированной полиомиелитной вакцины.
- Иммунизация против полиомиелита проводится в возрастах, установленных Национальным календарем профилактических прививок: вакцинация трехкратная в 3 мес., 4,5 мес. и 6 мес., однократная ревакцинация в 18 мес., 24 мес., 6 лет. В большинстве случаев это обеспечивает пожизненную защиту.

Ревматизм (болезнь Соколянского - Буйо) - системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией процесса в сердечнососудистой системе, развивающееся в связи с острой инфекцией



Симптомы:

- связь с перенесенной острой стрептококковой инфекцией;
- наличие "абсолютных признаков ревматизма"
- склонность к формированию порока сердца.



Профилактика

- 1) Водные процедуры
- 2) Закаливание
- 3) Физические упражнения
- 4) Личная гигиена

Туберкулез

- **Туберкулез** – это одно из инфекционных заболеваний, которое вызывается несколькими разновидностями бактерии туберкулёза, т. е. палочки Коха.





Существует несколько факторов, вызывающих повышенную восприимчивость человека к туберкулёзу:

- Наиболее значимым в мире стал ВИЧ;
- Курение (особенно более 20 сигарет в день) — увеличивает вероятность туберкулёза в 2—4 раза;
- Диабет.

Различают следующие пути передачи туберкулёза

- Воздушно-капельный.
- Алиментарный.
- Контактный.
- Внутриутробное заражение туберкулёзом.

Симптомы туберкулёза

Различают следующие стадии туберкулеза:

- первичное инфицирование - в месте проникновения инфекции возникает локальное воспаление.
- латентная (скрытая) инфекция - вследствие ослабления защитных сил организма
- рецидивирующий туберкулез взрослого типа - проявляется туберкулезным поражением многих органов, сопровождающимся лихорадкой, значительным упадком сил.

Виды туберкулёза

- Туберкулез костей и суставов.
- Туберкулез лимфатических узлов
- Туберкулез почек
- Туберкулез кожи
- Туберкулезный менингит

Профилактика туберкулеза

- Основные методы профилактики заболевания туберкулёзом у детей - вакцинация БЦЖ и химиопрофилактика
- Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является ежегодное диспансерное наблюдение и выявление заболевания на ранних стадиях.

Литература

- <http://ru.wikipedia.org> – Википедия
- <http://dic.academic.ru> – Медицинская
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
- <http://www.diagnos.ru>
- <http://medinfo.ru> – медицинская
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Спасибо за внимание!

