

**Укусы животных.
Бешенство.**

Укусы змей

- По механизму действия яды всех видов змей подразделяются на 3 группы:
- 1. Яды, действующие на нервную систему, вызывающие паралич мускулатуры, угнетение дыхания и сердечной деятельности (яды кобры, морских змей тропических прибрежных вод).
- 2. Яды, свертывающие кровь, вызывающие местную отечность и отмирание тканей (яды гюрзы, эфы, щитомордника, обыкновенных гадюк).
- 3. Яды, действующие на нервную систему, свертывающие кровь, вызывающие местную отечность и отмирание тканей (яды гремучих змей, австралийских аспидов).

СИМПТОМЫ

- Боль
- Чувство онемения в зоне укуса
- Головокружение
- Возможны обморочные состояния
- Чувство онемения в области лица и языка
- Нарушения речи и глотания



Первая помощь

- Немедленно интенсивно отсосать ртом яд из ранок (Продолжать отсасывание 10-15 мин, тщательно сплевывая содержимое. Крайне важно, чтобы пораженная конечность оставалась при этом неподвижной.)
- Показано обильное питье.

Укусы насекомых

Симптомы:

- Повышение температуры тела
- местный отек тканей
- Резкие головные боли
- Возможны судороги




Первая помощь:

- если жало все еще находится в коже, удалите его путем соскребывания ногтем или каким-нибудь предметом (не следует использовать пинцет, так как при сдавливании жала в кожу может попасть больше яда);
- промойте ужаленное место и прикройте чем-нибудь, чтобы не попала грязь;
- для уменьшения боли и припухлости приложите холодный компресс;
- постоянно наблюдайте за состоянием пострадавшего, следите за возможным появлением аллергической реакции (у некоторых людей тяжелая аллергическая реакция может привести к **анафилактическому шоку**)

Бешенство

Бешенство — это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса заражённого животного, характеризующееся тяжёлым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. Обнаруживается в слюне, а также в слезах и моче.



Источники заражения:

Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. К диким относятся волки, лисицы, шакалы, еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши, грызуны, а к домашним — собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот. Однако наибольшую опасность для человека представляют лисы и бездомные собаки за городом в весенне-летний период

Пути передачи вируса:

- воздушно-капельный
- алиментарный (через пищу и воду)
- трансплацентарный (через плаценту в период беременности)

Инкубационный период (период от укуса до начала заболевания) в среднем составляет 30-50 дней, хотя может длиться 10-90 дней, в редких случаях — более 1 года.

Выделяют 3 стадии болезни:

- I — начальную,
- II — возбуждения,
- III — паралитическую.

Первая помощь:

- Немедленно промыть место укуса мылом
- Обратиться в ближайший травм пункт

