

Государственное автономное образовательное  
учреждение среднего профессионального  
образования РТ  
«Зеленодольское медицинское училище/техникум»

# Острая абдоминальная боль



Проверила: Дмитриева Ю.  
В.

Выполнила: Катыхина Д.Р.



# Острая абдоминальная боль

Острый живот представляет собой симптомокомплекс, отражающий патологическое состояние организма, при котором произошло серьёзное повреждение органов брюшной полости с раздражением брюшины.






# Причина

## 1. Заболевания брюшной полости




# Причина

## 2. Внебрюшная патология



# Причина

## 3. Системные заболевания



# КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Хирургическую, которая требует госпитализации в хирургическое отделение стационара.
2. Гинекологическую — в гинекологическое отделение стационара.
3. Урологическую — в урологическое отделение стационара.
4. Нехирургическую — в многопрофильный стационар.
5. При инфекционных заболеваниях — инфекционный стационар

# Классификация

□ Острые

□ Хронические



# Локализация

## Верхний правый квадрант живота


Острый холецистит  
Жёлчная колика  
Гепатит  
Панкреатит  
Печёночные и поддиафрагмальные абсцессы  
Инфаркт миокарда  
Пневмония  
Плеврит  
Перикардит  
Кишечная непроходимость

## Нижний правый квадрант живота

Аппендицит  
Кишечная непроходимость  
Дивертикулит  
Прободная язва  
Ущемление грыжи  
Почечная колика  
Эктопическая беременность

## Верхний левый квадрант живота

Панкреатит  
Разрыв селезёнки  
Инфаркт селезёнки  
Гастрит  
Инфаркт миокарда  
Пневмония  
Плеврит  
Кишечная непроходимость



## Нижний левый квадрант живота

Разрыв аневризмы аорты  
Расслоение аорты  
Кишечная непроходимость  
Дивертикулит  
Забрюшинный абсцесс  
Почечная колика  
Эктопическая беременность  
Заболевания яичника

# Характеристика боли

| Характер боли                          | Острая хирургическая патология                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Коликоподобная                         | Жёлчная колика, почечная колика, механическая кишечная непроходимость |
| Постоянно нарастающая                  | При воспалительных процессах                                          |
| Кинжальная, внезапно начавшаяся        | При перфорации полого органа                                          |
| Диффузная тупая без четкой локализации | Ишемия кишечника                                                      |

# Иррадиация боли

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правое надплечье →             | Перфорация пептической язвы, правосторонний плеврит, поддиафрагмальный абсцесс,                        |
| Левое предплечье →             | Повреждение селезенки, острый панкреатит, левосторонний плеврит, перфорация острой язвы                |
| Мезогастрий →                  | Аппендицит, острый, панкреатит, почечная колика                                                        |
| Левое подреберье →             | Заболевания желчных путей, панкреатит                                                                  |
| Внутренняя поверхность бедер → | Мочевая колика, аппендицит, острый пиелонефрит, заболевания половых органов, паховая и бедренная грыжи |
| Паховая область →              | Заболевания прямой кишки                                                                               |

# Обязательные вопросы анамнеза при острой боли в животе



- ✓ Боль:
  - Время возникновения
  - Характер рецидивирования боли
  - Характер иррадиирования
  - Характер боли
- ✓ Провоцирующие и облегчающие факторы
- ✓ Характер рвоты
- ✓ Отмечался ли обморок
- ✓ Менструальный анамнез



# «Острый живот» в гинекологии.

## Причины:

- \* острые внутрибрюшные кровотечения
- \* нарушение кровообращения во внутренних половых органах
- \* острые воспалительные заболевания внутренних половых органов с вовлечением в процесс




АПОПЛЕКСИЯ  
ЯИЧНИКА

# Клиника

## Аппоплексия яичника:

- \* Характерны внутрибрюшное кровотечение (анемическая форма)
- \* Болевой синдром (болевая форма).
- \* Заболевание начинается остро, с внезапных болей в низу живота, преимущественно на стороне поражения.



# Клиника

## Внематочное беременность

Кровянистые выделения из влагалища


Болезненные ощущения внизу живота,  
схваткообразные боли.



# Клиника

## Перекрут ножки кисты

- \* боли в низу живота на стороне поражения (постепенно нарастающие или острые)
- \* тошнота
- \* рвота
- \* метеоризм
- \* парез кишечника.
- \* При осмотре: напряжение передней брюшной стенки и симптомы раздражения брюшины.



# Неотложная помощь

- \* В экстренном порядке госпитализируют в хирургическое отделение больницы.
- \* Транспортировка лёжа на носилках.
- \* Контроль состояния



Download from  
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.


ID 26904342

Candybox Images | Dreamstime.com

# «Острый живот» в хирургии: Острый аппендицит

## Синдромы:

1. Болевой (боль в эпигастральной области)
2. Диспептический;
3. Воспалительный;
4. Перитониальный.




# Клиника.

## Острый холецистит

- ☐ Желчная колика
- ☐ «Острый» живот
- ☐ Лихорадка
- ☐ Интоксикация



# Клиника. Острый панкреатит




- \* Острое начало
- \* Рвота
- \* Диспепсия
- \* Лихорадка
- \* Опоясывающая боль
- \* «Острый живот»



# Прободение ЯБЖ и ДПК



- \* Боли возникают после еды (1,5-2ч); голодные и ночные боли
- \* Типично стихание боли после приема пищи
- \* Рвота , приносящее облегчение
- \* Изжога , отрыжка
- \* Запоры
- \* Повышение аппетита




# Клиника.

## Разрыв аневризмы брюшной аорты

- \* Боль внезапное в пупочной области
- \* Иррадиация боли в спину, паховую область
- \* Обморок
- \* Шок




Аневризма брюшной аорты



Разрыв аневризмы

# Клиника. Почечные колики.


- ❑ Интенсивные приступообразные боли в поясничной области
- ❑ Иррадиация в половые органы
- ❑ Поллакиурия, макрогематурия
- ❑ тошнота , рвота
- ❑ Брадикардия , АД



# Клиника.

## Печеночные колики.

- \* Внезапное начало (чаще ночью)
- \* Интенсивная боль в поясничной области
- \* Многократная рвота , тошнота
- \* Температура , озноб
- \* метеоризм



# **Осмотр и физикальное обследование при острой абдоминальной боли**

- \* Оценка общего состояния**
- \* Определение позы**
- \* Оценка цвета кожных покровов , слизистых , участия живота в акте дыхания**
- \* Исследование пульса, измерение ЧСС и АД**
- \* Осмотр живота**
- \* Аускультация живота**
- \* Перкуссия живота**
- \* Пальпация живота**
- \* Выявление специфических симптомов**
- \* Осмотр и пальпация наружных половых органов**
- \* Пальцевое ректальное исследование**
- \* ЭКГ**

# Неотложная помощь при острой абдоминальной боли

- \* Выявление пациентов с острыми хирургическими заболеваниями и их экстренная госпитализация.
- \* Выявление пациентов с нехирургическими причинами острой боли в животе и определение показаний к их госпитализации.
- \* Обеспечение венозного доступа, мониторинг и поддержание витальных функций.
- \* При гиповолемии, гипотонии: в/в натрий хлорида 0,9%-400 мл.
- \* При коликообразной боли: в/в дротаверин 40-80 мг медленно (р-р 2%-2-4 мл).
- \* Под язык нитроглицерин в таб (0,25 или 0,5) или спрей (400 мкг или 1 доза)
- \* При рвоте, тошноте: метоклопрамид 10 мг (р-р 5%-2 мл) в/в