

COWID-19

НАЧАЛО ПАНДЕМИИ

Распространение вируса SARS-CoV-2 началось с китайского города Ухань. В 2020 году там произошла мощная вспышка этого заболевания. По последним данным сегодня в мире выявлено около 9 млн случаев заражения коронавирусом.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ

**Воздушно-капельным путем (кашель и чихание).
Контактным путём (через прикосновения).**

Вирус может передаваться через поручни в метро, автобусе, дверные ручки и другие поверхности.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

то есть отрезок времени от момента заражения до проявления симптомов, обычно составляет около пяти дней, но может варьироваться от двух до четырнадцати дней

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ КОРОНАВИРУСА У ЧЕЛОВЕКА

Температура (может быть от 37 С и до 40 С), Слабость, недомогание;

Затрудненное дыхание;

Чихание, кашель и заложенность носа;

Боли в мышцах и в груди;

Головная боль и слабость;

ДИАГНОСТИКА

Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется молекулярно-генетическими методами – ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Для исследования берётся мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Также возможно сдать кровь на анализ на наличие иммуноглобулинов (М и G)

ОРВИ И COVID-19

Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

В качестве профилактических мер В качестве профилактических мер рекомендуются: мытьё рук В качестве профилактических мер рекомендуются: мытьё рук , поддержание дистанции от других людей (социальное дистанцирование),
ношение СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в общественных местах (МАСКИ, ПЕРЧАТКИ) Смена масок не реже 1 раза в час! Использование антисептиков

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН

Организовать ежедневный перед началом рабочей смены «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания;



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Организовать при входе в организацию места для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в т.ч. с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;



Ограничить доступ на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования.)

Прекратить проведение любым массовых мероприятий на предприятии (в организации), запретить участие работников в мероприятиях других коллективов.

Запретить прием пищи на рабочих местах, выделить для приема пищи специально оборудованное помещение с раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. Организовать максимальное разобщение сотрудников (рабочих) во время приема пищи.


ГРУППЫ РИСКА

- пожилые люди 65+
- лица с хроническим заболеваниями

ВАЖНО!!!

**При первых признаках ОРВИ оставайтесь дома и
вызовите врача!**

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!