



ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ



МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

- | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| Антилопа | Носуха | Песец |
| Белый медведь | Нотки | Пятнистый олень |
| Благородный олень | Нулан | Рысь |
| Бурый медведь | Лемминг | Северный олень |
| Верблюд | Леопард | Серна |
| Волк | Лиса | Снежный барс |
| Выхухоль | Лиса-корсан | Слон |
| Газель | Лось | Соболь |
| Гиббон | Лошадь Пржевальского | Сурок |
| Горный баран | Морж | Суслик |
| Горный козел | Носорог | Тигр |
| Дромедар | Овцебык | Черный медведь |
| Дромедар | Олень-марал | Як |
| Зубр | Орангутанг | |
| Набан | | |

ПТИЦЫ

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| Белая куропатка | Глухарь | Птица-носорог |
| Белая сова | Павлин | Райская птица |
| | Полугай-намаду | Птица "базар" |

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

- Варан
- Гавнал
- Эмен (обра, удав, гора, зфа)

ЗОНА АРКТИЧНИХ ПУСТЕЛЬ

- Займає острови Північного Льодовитого океану та крайню північ Євразії (арктичний кліматичний пояс).
- Температури зимові (-50°C), літо (до $+5^{\circ}\text{C}$)
- Кількість опадів – до 200 мм
- Ґрунти не утворюють суцільного покриву (кам'янисті, пустельні, арктичні), поширена багаторічна мерзлота.
- Рослинний та тваринний світ бідний.
- Життя переважно пов'язане з морем.

Зона арктичних пустель

Господарем Арктики є **білий ведмідь**, найбільший з сучасних хижаків. Він чудово плаває, має гострий нюх. Харчується рибою, тюленими, водоростями, не гребує мертвечиною. Годинами може чекати біля лунки, поки визирне тюлень. Тільки морж здатен протистоять у боротьбі з білим ведмедем. Має гострий нюх: може відчувати труп кита навіть за 30 км під водою! Живе у барлогу, виритому в снігу. Зимою самиця народжує 1- 3 сліпих ведмежат, довжиною 30 см. Перші 3 місяці вони їдять лише молоко. Через місяць відкривають очі і виходять з мамою на прогулянку.



Зона арктичних пустель

Життя тварин пов'язане з водою. Арктичні пустелі – справжнє царство **тюленів**. Ці тварини – здебільшого великі ссавці. Довжина тіла буває від 1 до 6 м, а маса від 20 кг до 5 тон! Тюлені плавають, як риби, проте на суходолі дуже незграбні. Всі тюлені дихають легенями, тому періодично підпливають до лунки, щоб набрати повітря. Тюлені мають відмінний слух, але поганий зір. Харчуються рибою, молюсками та ракоподібними. Товстий шар жиру має теплоізоляційну та гідростатичну роль. Відомо 19 видів справжніх і 12-13 видів вухатих тюленів. Часто зустрічається гренландський тюлень, довжиною до 2 м і масою 150-160 кг. Живе до 40 років. Охороняються законом.



Дитинча гренландського тюленя має жовто-біле хутро, за що одержало назву – "більок". Маля народжується довжиною 80 см.





Морський заєць або лахтак є одним з найкрупніших тюленів, що живуть у водах Північного Льодовитого океану. Його розміри становлять, як правило, не менше 2,5 метрів. Вага звіра досягає 360 кг.



КОСАТКА

**самці досягають в довжину 6-7м, при масі до 8 т, самиці
— 6 м при масі до 4 т.**

Зона арктичних пустель

Часто трапляються **моржі**, характерною ознакою яких є пара бивнів, довжиною 70-80 см. Ними тварини риють дно, шукаючи молюсків, а також пробивають лунки у кризі для дихання.





ПОЛЯРНИЙ МАК



НЕЗАБУДКА



КАМЕНЕЛОМКА





ЯГЕЛЬ




ЗОНА ТУНДРИ ТА ЛІСОТУНДРИ

- Займає субарктичний пояс.
- На заході формується в умовах морського клімату, де не буває суворих зим, на сході - в умовах континентального клімату з меншим різноманіттям рослинного і тваринного світу.
- Поширені болота.
- Ґрунти - тундрово-глеєві.



КАРЛИКОВА ВЕРБА



Зона тундри



Журавлина болотна



Карликова береза




ПОЛЯРНА СОВА

YAPLAKAL.COM



ЛЕМІНГ





ПЕСЕЦЬ



ВІВЦЕБИК



РОСОМАХА


ПОМІРНИЙ КЛІМАТИЧНИЙ ПОЯС

1.ТАЙГА

- Підзолисті ґрунти, в пониззях часті заболочені.
- В європейській тайзі поширені переважно сосна та ялина.
- Сибірська тайга світлохвойна, у заболоченому Західному Сибіру переважає сосна.

МОДРИНА






СОСНА КЕДРОВА
Максимальна тривалість
життя — 800–850 років,
висота — до 35–45 м,
діаметр стовбура — до 2 м.




Глухар - це велика птах загону курообразних. Вона відноситься до сімейства Фазанові. Самці досягають у вазі 6,5 кг, розмах крил доходить до 1,5 метра, висота їх більше метра



Бурого ведмедя занесено до Червоного Списку МСОП як «вид, що знаходиться під загрозою»

РИСЬ





КІТ ЛІСОВИЙ

2. МІШАНІ І ШИРОКОЛИСТІ ЛІСИ

-ГРУНТИ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТІ

-- В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЧАСТИНІ ПЕРЕВАЖАЮТЬ
СОСНОВО-ДУБОВІ ЛІСИ, З ДОМІШКОМ ГРАБА,
БУКА

-- В ЗАХІДНОМУ СИБІРУ ХВОЙНІ З ОСИКОВО-
БЕРЕЗОВИМИ

-- НЕ УТВОРЮЮТЬ СУЦІЛЬНУ ПОЛОСУ В
СИБІРУ.

3. СТЕПОВА ЗОНА

- ПОШИРЕНІ НА ПІВДНІ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РІВНИНИ ТА ЗАХІДНОГО СИБІРУ, А ТАКОЖ НА ПРОСТОРАХ КАЗАХСЬКОГО ДРІБНОСОПКОВИКА. ДАЛІ НА СХІД ТРАПЛЯЄТЬСЯ ОКРЕМИМИ ДІЛЯНКАМИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ ТА ПРИАМУР'І.
- ГРУНТИ ЧОРНОЗЕМИ, КАШТАНОВІ, СОЛОНЦІ, СОЛОНЧАКИ, ПІД ДЕРЕВНОЮ РОСЛИННІСТЮ СІРІ ЛІСОВІ.
- КЛІМАТ ПОСУШЛИВИЙ



КОВИЛА

A photograph of a clump of tall, thin grasses, likely a species of oat or similar cereal grass. The grasses are green and have long, slender panicles with small, brownish seed heads. The background is a blurred field of similar vegetation. The text "ТИПЧАК" is overlaid on the left side of the image.

ТИПЧАК

A close-up photograph of a field of tall grasses. The grasses are green at the base and have turned a golden-brown color at the top, where they have formed seed heads. The background is a soft-focus green field. The word 'ΤΟΗΚΟΗΓ' is written in white, bold, uppercase letters across the center of the image.

ΤΟΗΚΟΗΓ

A close-up photograph of a tuşkançik (kangaroo rat) standing on a rocky, sandy surface. The animal has large, upright ears, a long tail, and is looking towards the left. The text "ТУШКАНЧИК" is overlaid in white at the bottom of the image.

ТУШКАНЧИК

Тхір степовий

- Тхір степовий, або світлий тхір (*Mustela eversmanni*) - хижий ссавець роду Мустела родини Мустелові, або куницеві.
- Поширений на всій території України, але в багатьох місцях зник.







ХОБРАХ

4. ПУСТЕЛІ?



Саксаул - одно из немногих деревьев, которое может расти в пустынях. Он удивительно вынослив: способен переносить чрезвычайно сильную засуху, нестерпимый зной, засоленную почву. Ствол дерева корявый, извилистый, невысокий; крона очень рыхлая, почти не дающая тени. Листья у саксаула нет. С ветвей свешиваются вниз длинные зеленые веточки, тонкие, как вязальная спица. Листьев у растения совершенно нет.



Tiger headcount in 1990 shown as a percentage of the top market (India - 3,750)





Індійський лев, або азійський лев (*Panthera leo persica*) — підвид [лева](#)) — підвид лева, що живе в [Індії](#). Самці важать 160—190 кг, самиці 110—120 кг. Найбільший самець, який був помічений, мав 2,92 метри в довжину, включаючи хвіст.

КИТАЙЦІ (ПОНАД 1,3 млрд. осіб)





ГІНДУСТАНЦІ (250 млн. осіб)



БЕНГАЛЬЦІ (190 млн. осіб)



සරණගාමි සිංහල භික්ෂු භික්ෂුණී සංඝායා
GOLDEN TEMPLE
HARDY PERPETUAL



භික්ෂුණී

Буддизм («Вчення Просвітленого» -
виник в IV-I ст. до н.е.





Ісла́м (араб. означає сумирність, покірність Єдиному Богу), сформувалася у 7-му столітті в Аравії. Засновником вважається пророк Магомет (570-632 рр.).



Христианство

Католицизм

Католическая церковь

Старокатолицизм

Протестантизм

Англиканская церковь

Евангельские христиане

Лютеранство

Адвентисты Седьмого Дня

Баптизм

Пятидесятники

Православие

Старообрядчество

Неканонические православные объединения

Автономные православные церкви

Православная церковь

Християнство виникло в I ст. в Палестиніюка знаходилась тоді під владою Римської імперії. (від греч. Χριστός — «помазанник», «мессія»)

