

**Первый МГМУ им. И. М. Сеченова.
Кафедра кожных и венерических болезней
им. В. А. Рахманова.**

Морфологические элементы сыпи.

Научный куратор: Профессор, д. м. н.
Кочергин Н. Г.

Выполнила: клинический-ординатор
Соколова К. А.

Сыпь-это совокупность морфологических элементов (эффоресценций), а морфологически элементы - реакции, кожного покрова и слизистых оболочек на воздействие патогенов.

Морфологически элементы делят на первичные и вторичные.


Первичные морфологические элементы:

1. Пятно – можно определить лишь визуально.

- сосудистые;
- геморрагические;
- пигментные;
- артифициальные.



1. Пятно



Сосудистые пятна

Невоспалительные пятна
- эмотивная эритема.

ВОСПОЛИТЕЛЬНЫЕ ПЯТНА

розеола



эритема





эритродермия

Телеангиэктазии (греч. *telos* – конец, *angion* – сосуд, *ectasis* - расширенный)



постоянные!

Геморрагические пятна:


- петехии;
- пурпура;
- ЭКХИМОЗЫ;
- вибицес;
- гематома.



Пигментные пятна:



Искусственные пятна.



2. папула

- основная причина которой острое и хроническое воспаление, а так же гиперплазия.



Папула



бляшки



при слиянии!

3. узелок

-может быть
либо обменным,
либо опухолевыми.

ксантома



4. бугорк


-до 1 см.



5. узел



6. гумма



7. пустула



8. везикула



9. пузырь



10. волдырь



Вторичные морфологические элементы:

1. пятно



2. чешуйка

– конгломерат роговых пластинок.



3. корка



4. эрозия

– дефект кожи в пределах эпидермиса....



5. экскориація



6. трещина



7. язва

– формируется в результате распада патологического субстрата.



8. рубец



9. атрофия

– аналогична атрофическому рубцу, но развивается без предшествующего нарушения целостности кожи.



10. вегитация

-



11. лихенификация



12. индурация

