

**Жүре пайда болған (ЖИТС, СПИД ағылш. *AIDS*) иммундық дефицитінің синдромы** - Вич фонында дамитын күй - лимфоциттердің құлау сипаттайтын CD4+нің саны, көптік оппортунистік инфекциялар, инфекция емес және ісік ауруларымен (Human immunodeficiency virus, HIV ағылшынша) инфекция.



## Инфекция көзі

**Вирус жұққан адам** — вирус тасымалдаушылар, ЖИТС-пен ауырған адамдар инфекция жұқтыру көзі болып табылады. Ешқандай ауру белгілері байқалмайтындықтан әсіресе вирус тасымалдаушылар өте қауіпті. Вирус көп мөлшерде қанда, спермада, қынап кілегейінде, емшек сүтінде болады. Көз жасында, жұлын сұйығында, сілекейде өте аз мөлшерде болуы мүмкін



*ЖИТС (СПИД) ауруына көбінесе нашақорлар шалдығады*

---

## **Жүгу жолдары**

- жыныстық қатынас;
- вирустың бірден қанға түсуі (әртүрлі инъекциялар жасаған кезде т. б. жағдайларда);
- анасынан нәрестеге жүгу арқылы.

## *ЖИТС жезудан қалай сақтанады?*

Өртүрлі инфекциялардан сақтанудың ең тиімді тәсілі — вакцина егу. Алайда вакцина дайындау бағытында тыңғылықты зерттеулер жүргізіліп жатса да, ондай профилактикалық препарат алу әзірше қолдан келмей отыр. ЖИТС-пен науқастанудан сақтанудың маңызды шаралары мыналар:

- әлеуметтік, халықаралық, мемлекеттік шаралар;
- жеке басты қорғауға бағытталған шаралар.**

## Оларға мыналар жатады:

— салауатты, әдепті өмір сүру;

— кездейсоқ жыныстық қатынастан және гомосексуалист, жезөкшелермен жақындасудан сақ болу (жыныстық партнер көп болған сайын ЖИТС жұқтыру қаупі арта түседі. Г. В. Сколубовичтің. (1989) айтуы бойынша, «Жыныстық тәртіпсіздік, нашақорлық және жезөкшелік — ЖИТС вирусын жұқтыру кепілі»);

— стерильденбеген немесе кездейсоқ біреудің шприцін, қайшысын, сақал алғышын және басқа да құрал-жабдықтарын пайдаланбау;

— әсіресе терісі, шырышты қабаттары зақымданған жағдайда бөтен біреудің қанымен, бөлінділерімен жанасудан абай болу;

— презервативті дұрыс пайдалану (ол ЖИТС-тен қорғайды);

— қан құйғанда немесе донор қанынан дайындалған препараттар қабылданғанда олардың АИВ-ке тексерілгеніне көз жеткізу (ол үшін қолданылған қанның сериялық нөмерін жазып алыңыз);

— маникюр, педикюр жасайтын құралдардың стерильдігіне көңіл аудару;

— ЖИТС вирусын жұқтырып алдым-ау деген күмәнді жағдайда міндетті түрде дәрігерге көріну.

Кез-келген азамат АИВ-инфекциясының жұққан-жұқпағандығын анықтау үшін Алматыда, Астанада, еліміздің басқа да ірі қалалары мен облыс орталықтарында ашылған лабораторияларға барып тексерілуіне болады.

**Сіздің мұнда ЖАҒАЛЫҚ естіп, МАҒЫЗДЫСЫН біліп,  
ЕҢ БАСТЫСЫН түсінуге мүмкіндігіңіз бар...**

**Вы сможете услышать НОВОЕ, узнать ВАЖНОЕ  
и понять самое ГЛАВНОЕ...**



**ЖҚТБ**  
**СПИД**

**Әуелі қауіпсіздік  
Безопасность  
прежде всего**

**АҚТҚ-ны ағзадағы сұйықтықтардан  
анықтауға болады:**

- қан;
- шәует;
- іншектік секрет;
- ана сүті.

**АҚТҚ-ның берілу жолдары:**

- жыныстық жол;
- парентералдық жол;
- анадан балаға.

**ВИЧ можно обнаружить  
в жидкостях организма:**

- кровь;
- сперма;
- вагинальный секрет;
- грудное молоко.

**ВИЧ передается:**

- половым путем;
- парентеральным путем;
- от матери ребенку.



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің талсырысы бойынша  
по заказу Министерства Здравоохранения Республики Казахстан

"Сапауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы" ЖҚДС  
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Тәуелсіздік даңғ., 6/2  
төқ. 8 (7172) 55 50 80, 49 69 20 | [www.dosh.kz](http://www.dosh.kz)

ТОО «Центр формирования Здравого образа жизни»  
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, 6/2.

«Астана қ. ЖҚТБ күресу және оның алдын алу орталығы»  
ММ Есенберлин к-сі, 5/1.

Телефондары: 38-07-02, 38-04-64


сайты: [www.dosh.kz](http://www.dosh.kz) - астаналық

Оқи алардан СПИД-ден сақтанушыларды сақтауға, құрметті көмегістерін жасауға  
көмегіңізді досім сұраймын.

Тү «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ул.Есенберлина,5/1  
Мы көбінесе, ыңғайлы ақпаратты ПОНОЖЕГ. Вам сақтанғы абораме и  
көбінесе опаснығ ашыбай!



**ЖИТС**-тің жұғу көздері және жұғу жолдары ДДҰ мәліметі бойынша АИВ жұқтырғандардың саны 2000 жылдан кейін 40—50 миллионға жетуі ықтимал. ЖИТС-пен ең көп науқастанушылар АҚШ-та, Батыс Еуропа елдерінде (әсіресе Франция, Германия, Ұлыбритания, Италия), Орталық Африкада, Гаитиде тіркелген. Вирус ТМД мемлекеттерінде, Жапония, Шығыс Араб елдерінде кездесе бастады.



*Қазіргі кезде республикамызда ЖИТС-тен қорғану жөнінде жұмыс жүргізетін 20 орталық және 80 лаборатория бар. Олардың жұмыс бағыттары мынадай:*

1. Вирус жұғу мүмкіндігі бар «қатерлі топтарға» (группы риска) жататын адамдарды тексеріп, вирус жұққан адамдарды дер кезінде тауып отыру;
2. Ауру ошағын анықтап, дәрігерлік бақылауға алып, вирустың әрмен қарай тарауына, яғни басқа адамдарға жұғуына мүмкіндік бермеу жұмыстарын ұйымдастыру.