

Тема:

Опасные дикие животные Якутии (Волк)

Выполнила:

ученица 6 А класса МОУ гимназии №1
имени С.С. Каримовой г. Нерюнгри
Савченко Полина

1. Волк

Волки свирепые и опасные животные, но на людей нападают очень редко. Как и все хищники, они охотятся, чтобы прокормиться и стараются держаться подальше от людей. Волки обитают на всей территории Якутии, включая острова Ледовитого океана. Охотятся на мелких и крупных млекопитающих.



1. Волк

Волки относятся к одной из групп отряда хищных млекопитающих - семейству псовых или собачьих. В Якутии представлен 4 семействами, 12 родами, 18 видами..



1. Волк

Из-за высокой холки голова у волка немного опущена вниз. Голова крупная, глаза небольшие желтые, уши небольшие треугольной формы с острой вершиной, шея толстая. Грудная клетка большая, глубоко спущенная, живот подтянутый. Окраска варьирует от беловато-серой до рыжевато-желтой. В Якутии встречаются два подвида: обыкновенный или лесной волк. Различаются они, в основном, по структуре и окраске меха. При этом более светлую, нередко почти белую окраску имеет полярный волк. Самец и самка сходны по окраске, но самец крупнее.



1. Волк

Ориентировочная численность волка в 1963-64 гг. составляла 500-700 особей, в 1980-х г.- 2 тысячи, 1985 г.- 2 тысячи, 1992 г.- 5 тысяч, 1993 г.- 5 тысяч, 1995 г.- 10 тысяч, 1996 г.- 18,8 тысяч, 1997 г.- 13,9 тысяч, 1998 г.- 13,6 тысяч особей.



1. Волк

Типичный хищник, отличающийся особой выносливостью и сообразительностью. За исключением периода размножения ведет стайный образ жизни. Стая состоит, как правило, из членов семьи.



1. Волк

Волки используют и облавный метод, когда одни гонят, а другие поджидают. Редко и ловит и боровую дичь, не брезгует падалью. В летний период рацион его становится более разнообразным, при этом существенно возрастает роль мышевидных грызунов. Зимой, как правило, возвращается недоеденной жертве, иногда через много дней.



1. Волк

Логово волки устраивают в наиболее глухих участках, как правило, на сухих обрывистых берегах и буграх. Оно представляет нору глубиной 1,5-5 м, иногда с двумя выходами. Одна нора может использоваться в течение ряда лет, иногда с перерывами. В тундре для логова нередко используются норы песцов и расщелины скал.



1. Волк

В тундре известны случаи заболевания волков "дикованием". Из других регионов известно, что волки являются основным резервуаром вируса бешенства в природе, однако число людей заболевших бешенством от укуса волков в 27-44 раза меньше, чем от укусов собак.



1. Волк

Волк наносит значительный ущерб оленеводческим, коневодческим хозяйствам и диким копытным. Например, за 1954-1958 годы в Якутии волками были затравлены 24 тысячи домашних оленей. Известно, что один волк только за зиму в среднем убивает 12 лосей и оленей.



1. Волк

