


Казахстанско-Российский медицинский университет



Проявления на слизистой полости рта специфических инфекций

Подготовила: Раимова К. гр 605

ТУБЕРКУЛЕЗ

- Туберкулез проявляется во рту в виде туберкулезной волчанки или милиарно-язвенного туберкулеза.
- **Туберкулезная волчанка.** Чаще всего поражается кожа лица, верхней губы и слизистой десен, альвеолярного отростка в области передних зубов.
Люпома - туберкулезный бугорок - первичный элемент поражения при туберкулезе. Он имеет мягкую консистенцию, красную или желто-красную окраску, его диаметр примерно равен 1-3 мм. Эти бугорки обнаруживаются не по одному, а группами, очень легко разрушаются с формированием язв.
- Туберкулезная язва имеет **характерный вид**: ее края малоблезненные, отечны, выполнены папилломатозными разрастаниями, красными или желтыми, которые легко кровоточат. При дальнейшем развитии туберкулезной волчанки, кость челюсти начинает разрушаться, и зубы расшатываются и выпадают. Губа, вовлеченная в патологический процесс, становится отечной, увеличенной, покрывается корками.



СИМПТОМЫ

- Лимфатические узлы становятся плотными и увеличенными. Разрушающиеся туберкулезные бугорки заживают с образованием рубца, который может сильно деформировать пораженную область и даже нарушать прием пищи или артикуляцию. В 10% случаев эти образования могут озлокачествляться и вызывать развитие рака.



МИЛИАРНО-ЯЗВЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

- Милиарно-язвенный туберкулез развивается у людей, которые **давно болеют**. Палочки Коха из мокроты попадают через поврежденные участки кожи в слизистую. Обычно локализация патологического процесса располагается в местах травм. Образуется **1-3 небольшие язвы, которые очень болезненны и имеют тенденцию к росту вширь**. Она имеет подрытые и неровные края, дно - зернистое, покрытое желтоватым налетом. Человек при этом имеет одышку, сильно потеет, отмечает потерю веса, у него повышается температура, анализ крови соответствует наличию тяжелого общего заболевания. Иногда люди могут не знать о наличии у них даже самой тяжелой формы туберкулеза легких, появление язвы может натолкнуть врача-стоматолога проверить анализы и дать направлению к соответствующему **специалисту - фтизиатру**.

□ .



Сифилис

- Сифилис - инфекционное заболевание, которое вызывает **бледная трепонема**. Заражение происходит разными путями: от матери к ребенку через плаценту, через поврежденные кожу и слизистые оболочки, контактным, парентеральным путем. Самыми заразными являются больные, которые находятся в **первичном или вторичном** периоде заболевания с проявлениями в полости рта или на половых органах.
- **Твердый шанкр** - это место первичного внедрения инфекции, он чаще всего возникает на губах, немного реже - на языке, небных миндалинах. Шанкр начинает образовываться с покраснения, уплотнения, в центре которого появляется **язва с ярко-красным плотным дном**. Отличительной особенностью этого образования является **полная безболезненность**, вне зависимости от места локализации и глубины.



ЭЛЕМЕНТЫ ПОРАЖЕНИЯ

- Пятнистый сифилид - красное, четко отграниченное на фоне нормальной слизистой, пятно. Оно держится без каких-либо изменений, по меньшей мере, месяц.
- Папулезный сифилид - крупный (до 1,5см в диаметре) элемент в виде плоской папулы, имеющей четкие границы.
- Пустулезный сифилид - болезненная язва, имеющая некротически-гнойный налет, возникает у очень ослабленных



- **Гумма** - безболезненный узел в толще слизистой, который достигает размеров 3 и более сантиметров в диаметре, ее центр со временем распадается с образованием кратерообразной язвы. Внутри язвы расположен некротический стержень, края гладкие, вся ее поверхность покрыта грануляциями. При ее расположении на твердом небе в процесс вовлекается кость, возникает ее некроз. Гумма слабоболезнена, хотя может вызывать значительные воспалительные реакции и быть обширной.
- **Бугорковый сифилид** - синюшно-красный плотный и безболезненный бугорок, который очень легко распадается и образует язву, имеющую плотные края. Иногда эти бугорки могут существовать годы. Заживают язвы с образованием грубых рубцов. При подобных симптомах нужно направить человека на консультацию к венерологу.

