


СТОМАТИТЫ

Данилова Т.Н.




СТОМАТИТЫ

Стома = отверстие, рот

определение

Группа заболеваний, **разной** этиологии, характеризуется воспалением слизистой оболочки полости рта.

Этиология

- **Грибы** рода кандиды –
грибковые стоматиты
 - **Вирусы** герпеса - вирусные
стоматиты
 - **Бактерии** – бактериальные
стоматиты
- 

Пути передачи возбудителей

- Воздушно – капельный
(чихание, кашель, плач)
- Контактно- бытовой
(игрушки, посуда, соски)
- В родах
(при кандидозе влагалища женщины)

Предрасполагающие факторы

1. АФО слизистой рта у детей раннего возраста в норме:

- Тонкая
- Суховата, мало слюны
до 3 -4 месяцев
- Богата сосудами
- Слизистую рта только осматривают

Предрасполагающие факторы

2. Повреждения слизистой рта:

- Механические
- Термические
- Химические

3. Аллергическое воспаление слизистых

4. Непереносимость лекарств

5. Фоновые заболевания

6. Иммунодефицитные состояния

АЛЛЕРГИЯ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

СТРЕСС

ВИТАМИНЫ

Грибковый стоматит

Возбудитель –

- грибки рода Candida


МОЛОЧНИЦА

Чаще развивается:

- У недоношенных новорожденных детей
- У детей с дистрофией
- После курсов антибиотиков


Проблема

- Белый творожистый налет во рту



Потенциальная проблема

- Риск ухудшения течения болезни



Уход

- Информировать маму, успокоить
- Беседа о правилах личной гигиены:
- Мыть руки часто
- Мыть игрушки ежедневно, посуду
- Обрабатывать соски, пустышки
- Не целовать ребенка в область губ
- Наблюдать за ребенком
- Питание щадящее:

теплая пища, полужидкая, молочная

Правила обработки полости рта

- Часто 4 – 5 раз в день
- Не менее 5 - 6 дней
- Промокательными движениями
- Теплым раствором

Назначения врача

□ Противогрибковые средства:

1% р-р клотримазол

КАНДИД



□ При упорном течении молочницы
противогрибковые препараты внутрь
Флуконазол 3 мг/кг сут



Вирусные стоматиты

- Синоним : **АФТОЗНЫЙ СТОМАТИТ**
- Возбудитель: вирус простого герпеса



Проблемы

- Острое начало: лихорадка 38- 39
- Изменение самочувствия – вялость, плач, отказ от еды, плохой сон
- Воспаление десен – гингивит
- **Образование афт на слизистой рта**
- Слюна вязкая с запахом
- Увеличение и болезненность подчелюстных лимфоузлов

Потенциальная проблема

- Риск ухудшения течения заболевания – больше афт
- Риск присоединения вторичной инфекции



Уход

- Ранняя изоляция от коллектива до выздоровления, не менее 10 дней
- Создание микроклимата в комнате:
Проветривание частое, влажная уборка
- Постельный режим на дни лихорадки
- Удобная постель, смена нательного и постельного белья по мере загрязнения
- Помощь в личной гигиене: умывание
- Средства гигиены индивидуальные

Отдельная посуда !!



уход

- ▣ Наблюдение за ребенком:

Сон, аппетит, за внешним видом

- ▣ Щадящее питание:

По принципу «не очень»

- ▣ Дополнительное теплое питье:

- ▣ **Вода**, вода минеральная, компот, чай..





Назначения врача

- ▣ Полоскание рта антисептиками
- ▣ **Противовирусные средства:**
Виферон, Грипферон, Ацикловир,
Анаферон, Имудон, Гексорал
Мазь оксолиновая 0,25%, теброфеновая
- ▣ **Перед едой обработать анестетиками**
- ▣ Через 2-3 дня на слизистую рта средства для заживления афт:
- ▣ Облепиховое масло, шиповника масло







Zofan
wallcoo.com