


НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ

Торговое название: НУРОФЕН® ДЛЯ ДЕТЕЙ

Международное непатентованное название
(МНН) ибупрофен



Химическое название (RS)-2-(4-изобутилфенил)-пропионовая кислота



Лекарственная форма суспензия для приема
внутри [апельсиновая, клубничная]

Фармакотерапевтическая группа-
нестероидный противовоспалительный препарат.

КОД АТС: M01AE01.

Описание суспензия белого или почти белого цвета
сиропобразной консистенции с характерным
апельсиновым или клубничным запахом.

Регистрационный номер: П № 014745/01

Нозологическая классификация (МКБ-10)

A37 Коклюш

A38 Скарлатина

B05 Корь

B26 Эпидемический паротит

G43 Мигрень

H92.0 Оталгия

J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации

J11 Грипп, вирус не идентифицирован

K08.8.0* Боль зубная

R07.0 Боль в горле

R50.9 Лихорадка неустойчивая

R51 Головная боль

R52.9 Боль неуточненная

T14.9 Травма неуточненная

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нурофен" для детей применяют с 3 месяцев жизни до 12 лет в качестве жаропонижающего средства при острых респираторных заболеваниях, гриппе, детских инфекциях, постпрививочных реакциях и других инфекционно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры тела. Препарат используют как обезболивающее средство при болевом синдроме слабой или умеренной интенсивности, в том числе: головной и зубной боли, мигрени, невралгиях, боли в ушах и в горле, боли при растяжениях и других видах боли.

Врач также может рекомендовать этот препарат и при других показаниях (в этом случае выполняйте рекомендации врача по дозировке и схеме применения).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нурофен® для детей не следует применять при:

- повышенной чувствительности к ибупрофену, ацетилсалициловой кислоте и другим нестероидным противовоспалительным препаратам;
- бронхиальной астме, крапивнице, рините, спровоцированном приемом нестероидных противовоспалительных препаратов;
- при наличии у ребенка язвенного поражения желудка и двенадцатиперстной кишки;
- активном желудочно-кишечном кровотечении;
- при воспалительных заболеваниях кишечника;
- при подтвержденной гипокалиемии;
- заболеваниях крови: гипокоагуляции, лейкопении, гемолитической анемии;
- почечной и/или печеночной недостаточности;
- снижении слуха

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следует проконсультироваться у врача прежде, чем давать ребенку Нурофен® для детей, если ребенок:

принимает другие болеутоляющие лекарства; имеет в анамнезе: язвенную болезнь, гастрит, язвенный колит, кровотечения ЖКТ; страдает заболеваниями печени или почек ; при наличии *H.pylori* принимает непрямые антикоагулянты (препараты для приема внутрь, снижающие свертываемость крови), препараты для снижения артериального давления, глюкокортикостероиды, антиагреганты, диуретики (препараты для усиления мочеотделения), препараты лития, метотрексат ; страдает бронхиальной астмой, крапивницей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нурофен® для детей - препарат специально разработанный для детей. Внимательно прочтите инструкцию перед применением препарата. Препарат принимают внутрь. Перед употреблением тщательно взболтать флакон. Для точного отмеривания дозы препарата прилагается удобный мерный шприц. 5 мл препарата содержат 100 мг ибупрофена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕРНОГО ШПРИЦА:

1. Плотно вставьте шприц в горлышко флакона.
 2. Хорошо взболтайте суспензию.
 3. Переверните флакон вверх дном и плавно потяните поршень вниз, набирая суспензию в шприц до нужной отметки.
 4. Верните флакон в исходное положение и выньте шприц, аккуратно поворачивая его.
 5. Поместите шприц в ротовую полость ребенка и медленно нажимайте на поршень, плавно выпуская суспензию.
- После употребления промойте шприц в теплой воде и высушите его в недоступном для ребенка месте.

Лихорадка (Жар) и боль:

Дозировка для детей зависит от возраста и массы тела ребенка. Разовая доза составляет 5-10 мг/кг массы тела ребенка 3-4 раза в сутки. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг на кг массы тела ребенка в сутки.

Дети в возрасте 3-6 месяцев (вес ребенка более 5 кг): по 2,5 мл 3 раза в течение 24 часов, не более 150 мг в сутки.

Дети в возрасте 6-12 месяцев (средний вес ребенка 6-10 кг): по 2,5 мл 3-4 раза в течение 24 часов, не более 200 мг в сутки.

Дети в возрасте 1-3 года (средний вес ребенка 10-15 кг): по 5,0 мл 3 раза в течение 24 часов, не более 300 мг в сутки.

Дети в возрасте 4-6 лет (средний вес ребенка 15-20 кг): по 7,5 мл 3 раза в течение 24 часов, не более 450 мг в сутки.

Дети в возрасте 7-9 лет (средний вес ребенка 21-29 кг): по 10 мл 3 раза в течение 24 часов, не более 600 мг в сутки.

Дети в возрасте 10-12 лет (средний вес ребенка 30-40 кг): по 15 мл 3 раза в течение 24 часов, не более 900 мг в сутки.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При применении препарата побочные действия наблюдаются редко, однако возможно появление следующих побочных эффектов:

- со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, ощущение дискомфорта, или боли в эпигастрии, слабительный эффект, возможно возникновение эрозивно-язвенных поражений, кровотечений.
- аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, обострение бронхиальной астмы, ангионевротический отек, анафилактоидные реакции, анафилактический шок, бронхоспазм, лихорадка, многоформная экссудативная эритема (в том числе синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла)
- со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение, бессонница,
- сердечно-сосудистая система: тахикардия, повышение артериального давления.
- со стороны органов кроветворения: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения.
- со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, цистит.

При появлении этих или других побочных эффектов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Одновременное применение НУРОФЕНА® ДЛЯ ДЕТЕЙ с антикоагулянтами может привести к усилению их действия. Нурофен® для детей повышает концентрацию дигоксина, фенитоина, метотрексата, лития в плазме крови при одновременном применении с этими препаратами. Использование Нурофена® для детей вместе с диуретиками и антигипертензивными средствами снижает их эффективность. Усиливает побочные эффекты минералокортикостероидов и глюкокортикостероидов.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Нурофен® для детей можно применять детям с сахарным диабетом, т.к. препарат не содержит сахара. Не содержит красителей.

ФОРМА ВЫПУСКА

Суспензия для приема внутрь [апельсиновая, клубничная] 100 мг/5 мл. Полиэтилентерефталатный флакон с крышкой из полиэтилена низкой плотности или полипропилена с прокладкой, содержащий 100 мл или 150 мл суспензии. Каждый флакон в комплекте со шприцом - дозатором, упакован в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25°C. В сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Не использовать препарат с истекшим сроком годности.

ОТПУСК ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

Производитель

«Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд.» Тейн Роуд,
Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания, произведено
«БСМ Лтд», Тейн Роуд, Ноттингем, NG2 3AA,
Великобритания.

Представитель в России/адрес для претензий

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Россия, 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 14

Цены:

Нурофен[®] для детей

суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл, 1 шт. 131.00 руб.-

Здрав город

Нурофен[®] для детей

суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл, 1 шт. 195.00 руб.-

Еаптека

Нурофен[®] для детей

суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл, 1 шт. 184.12 руб.- Гос.

Реестр предельно отпускных цен

Спасибо за внимание!

Ткачёва Мария Валерьевна

СПО, 4 курс, 401 группа фармацевтического
факультета ВГУ

№ зачетной книжки 15120139