



Жасына сәйкес екпе алмаған балаға жеке егу күнтізбесін құрастыру

Орындаған: Ерболов Б

539 топ

Тексерген: Бабажанова М.М

Кез келген егу баланың жағдайына байланысты болып келеді

- орталық жүйке жүйесі жағдайына
- туылған кездегі салмағына
- туа пайда болған және генетикалық ауруларына
- босану кезіндегі жарақатына байланысты
- -онкологиялық аурулармен ауыратын балалар
- -АИВ жұқтырған балалар



Жетілмеі туылған балалардың жеке егу ерекшелігі:



Баланың шала туылуына байланысты жеке кесте құрылады, көбінесе шала туылған балалардың егу кестесі халықаралық егу кестесіне сәйкес келеді, бірақ азайтылған мөлшерде егу ұснылады. Себебі балалар өте әлсіз болады және қарсы көрсетілімдер болуы мүмкін.

Инфекциялық аурулардың арнайы алдын алу.

- Ересек жастағы балалар мен ересектерге:
 - 1. егу-бірінші
 - 2. егу-бірінші егуден соң 1 айдан кейін
 - 3. егу – екінші егуден соң 6 айдан кейін
- ВГ В қарсы
 - 1 егу – босану үйінде туылғаннан кейін бірінші 24 сағат ішінде;
 - 1 айдан кейін
 - 6 айдан кейін.
 - Егер де вакцинация қандай да бір себеппен кешіктірілген болса, күнтізбеге сәйкес 1-2 ай кешігіп салынады.0-1-6

№ 505 жарлық 11.11.1998 ж. «ҚР туберкулезді алдын алуды жетілдіру шаралары туралы».

Манту сынауы жылда қатерлі топ балаларына жүргізіледі:

- тыныс алу жолдарының аурулары интоксикация ұлғаюымен жиі және ұзақ ауыратын балаларға;
- себебі белгісіз лимфаденитпен;
- шеткі лимфа түйіндері / 4 топтан артық / интоксикация симптоммен;
- БЦЖ белгілері дамымағандарға;
- туберкулез бойынша жағдайсыз шаруашылығы бар мал шаруашылығының жан ұясындағыларға;
- әлеуметтік жағдайсыз жан ұядағыларға / ішкіштер, нашакорлар мен тұрғылықты мекен жайы жоқтарға /;
- эпид.көрсетулер – туберкулез өшағында;
- балалар ауруханаларында ұзақ уақытқа гармондық ем алу алдында;
- декреттелген жастарда / 7, 12 жас /, манту сынауы бойынша қатерлі топ балаларын тексеруді БЦЖ жүргізу кезеңіне кабат келтіру;

Қызылшаға қарсы егулер:

- Бір жасқа дейінгі балалар арасында қызылша ауруымен ауру аз болғандықтан, сол сияқты ана антиденелерінің сақталуы бір жасқа дейінгі балаларда, табиғи тамақтандырудағы, вакцинация мерзімі **8 айдан 12 айға ауыстырылған;**
- **Қызылшаға қарсы ревакцинация 6-7** жаста мектепке барар кезде сақталған;
- Ұйымдастырылған коллективтерде қызылша ауруының бір жағдайлары болса, 2 күн ішінде барлық 25 жасқа дейінгі, бұрын ауырмаған және қызылшаға қарсы вакцина алмағандарға жедел түрде тірі қызылша вакцинасын егу керек.



Күл ауруына қарсы

егулер:

- Бір жасқа дейінгі АҚДС-ң үш мөлшері мен бірінші реттік вакцинация, 2 жасқа дейінгі ревакцинация сақталған бұрынғыдай;
- Вакцинаның көк жөтел бөлігіне қарсы көрсету болғанда, АДС анатоксинмен 3 рет, вакцинаның өндіргішіне байланыссыз, АДС-М бірінші реттік иммунизацияға жарамайды;
- әрі қарай ревакцинацияны мектепке барар кезде 6-7 жаста АДС-пен жүргізіледі, 16-17 жаста мектеп бітірер алдында АДС-М;
- 12 жаста моноваленттік күл ауру анатоксині мен ревакцинация жүргізіледі.
- АД-М жоқ болған жағдайда АДС-М қолдануға болады. 3 бустерлы мөлшерлі күнтізбек эпидемия аяқталғанда қолданылады;

Күл ауруына қарсы егулер:

- Бұрын егу алмаған балалар 7 жастан және ересектер егуді 2 АДС-М егу 4 апта үзіліспен және 3-ші егу 6 айдан кейін – вакцинация түрінде егу алу қажет;
- Күл ауруын басынан кешкен науқастар, ауруханадан шығар алдында келесі схемамен вакцина қабылдацлары қажет:
- Бұрын вакцина алмағандар күл ауру – анатоксины бар құрамында /АДС-М/ кешірек бірінші реттік вакцинация жиынтығын аяқтауы міндетті;
- Жартылай вакцина алған тұлғалар күнтізбекке сәйкес бірінші реттік вакцинация жиынтығын аяқтауға міндетті;
- Толық вакцина алған тұлғалар АДС-М бір мөлшерін қабылдауға міндетті, егер вакцинаның ақырғы мөлшері 5 және одан артық жыл бұрын енгізілсе;
- Жарақатталған жағдайда жедел иммунизация жүргізу үшін моноваленттік сіреспе анатоксиннің орнына АДС-М қолдану, күл ауруына қарсы иммунденгендер санын көбейтеді.



Егулер арасындағы үзілістер.

- Әр түрлі вакциналарды бір уақытта жүргізуге рұқсат етіледі. Егер вакцина бір күнде еңгізілмесе, онда вакцина арасында 4 апта үзіліс сақтау қажет. Тірі, өлі вакцина арасында үзіліс сақталмайды.
- Иммуноглобулин және қан препараттарын қабылдағаннан кейін қызылша мен паратит вакцинасын енгізу кем дегенде 3 айға дейін шегеріледі, үзіліссіз АҚДС, АДС, БцЖ, ОПВ енгізіледі.
- Қызылша, паратит, полиомиелит және БцЖ вакциналарынан кейін иммуноглобулин енгізу 2 апта және одан көп уақытқа шегеріледі, АҚДС, АДС препараттарынан кейін үзіліс сақталмайды.





- Жағдайсыз аймақтарда / Ақтөбе, Атырау, Алматы, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Қостанай / туберкулезды ерте диагностикалау мақсатымен манти сынауының орнына 12 жастағы балаларға БцЖ ревакцинациясы алдында флюорографиялық тексеру жүргізіледі.

	(ВГВ) «В» вирустық гепатиті
2 ай	ВГВ) «В» вирустық гепатиті (ОПВ) Полиомиелит (АКДС) Көк жөтел, дифтерия, сіреспе (Hib) Гемофильді жұқпа
3 ай	(ОПВ) Полиомиелит (АКДС) Көк жөтел, дифтерия, сіреспе (Hib) Гемофильді жұқпа
4 ай	ВГВ) «В» вирустық гепатиті (ОПВ) Полиомиелит (АКДС) Көк жөтел, дифтерия, сіреспе (Hib) Гемофильді жұқпа
12-15 ай	(ОПВ) Полиомиелит (ККП) Қызылша, қызамық, паротит
18 ай	(АКДС) Көк жөтел, дифтерия, сіреспе (Hib) Гемофильді жұқпа
6 жас	(БЦЖ) Туберкулез (АДС) Дифтерия, сіреспе (ККП) Қызылша, қызамық, паротит
12 жас	(АД-М) Дифтерия
15 жас	Қызамық
16 жас	(АДС-М) Дифтерия, сіреспе
әр 10 жыл сайын	(АДС-М) Дифтерия, сіреспе

Жасы	БЦЖ	ОПВ ИПВ	ВГ «В»	АКДС АБКДС	Хиb	АДС	АД- М	АДС- М	ККП моно- вакцини
1-4 кундерде	+		+						
2 ай		+	+	+	+				
3 ай		+		+	+				
4 ай		+	+	+	+				
12-15 ай		+							+
18 ай				+	+				
6 жас (бірінші сынып)	+					+			+
12 жас							+		
16 жас және әрбір 10 жылда								+	

БЦЖ- туберкулез; **ОПВ, ИПВ** - полиомиелит; **ВГ«В»** - вирусті гепатит «В»;
АКДС, АБКДС - коклюш, дифтерия, столбняк; **Хиb** - b типті гемофильді инфекция;

АДС - дифтерия, столбняк; **АД-М** - дифтерия; **АДС-М** - дифтерия, столбняк;

ККП, моновакцины – қызылша, қызамық, паротит.

Туберкулез

Если вакцинация отложена более, чем на 2 месяца, то прививку делают только после постановки пробы Манту. Если ребенок не привит своевременно, то проводить первичную вакцинацию БЦЖ следует в любом возрасте

Полиомиелит

Если интервал между тремя первыми (вакцинирующими) прививками был значительно удлинен, то ревакцинацию можно начать раньше - уже через 3 месяца после окончания курса вакцинации. Желательно, чтобы своевременно непривитой ребенок до 7 лет получил не менее 5 доз вакцины.

Коклюш Дифтерия Столбняк

Если ребенок получил только 2 прививки АКДС и в срок до 4-х лет не сможет получить третью дозу и ревакцинацию, его следует считать непривитым против коклюша. Ревакцинацию в этом случае проводят АДС-анатоксином. Если ребенок получил одну прививку АКДС-вакциной, а вторую - АДС-анатоксином, то ревакцинацию (АДС) проводят через 9-12 мес.

Если ребенок получил на 1-м году жизни 3 введения АКДС, но не получил своевременно (до 4 лет) ревакцинацию АКДС-вакциной, ее осуществляют АДС-вакциной, так как после 4 лет прививки против коклюша не проводят.

Корь

При нарушении сроков, прививку против кори нужно ввести при первой возможности.

Паротит

При нарушенном графике прививку делают при первой возможности. Плановые прививки не производят детям старше 7 лет.

Алғашқы Гепатит В- вакцинациясы салынбаса, онда кез-келген келесі күні егуге болады, ары қарай стандартты күнтізбе бойынша жүргізіледі.
2-прививка 1-айдан кейін. Уақытында салынбаса онда оны 4айға дейін егу керек.
3-прививка 5-айдан кейін.



БЦЖ уақытында егілмесе онда балаға 4 ай
болғанда егеміз.Манту пробасы теріс болса



БЦЖ уақытында егілмесе онда балаға 4 ай болғанда егеміз. Манту пробасы теріс болса

АҚДС

Коклюшқа қарсы екпе уақытында егілмей қалса -4 жасқа дейін егуге болады.

4жастан 6жасқа дейінгі балаларға –АДС егіледі, 6жастан жоғары балаларға- АДС-М егеміз.

Бұрын АҚДС екпесін алмаған және коклюшпен ауырып қойған балаларға- АДС анатоксини қолданылады. Ол 2 ревакцинациядан тұрады.

1-ші прививкадан кейін 1-ай және 1 жыл.

2-прививка АҚДС –жіберіп алса күнтізбе өзгермейді. АҚДС ревакцинациясы жүргізілмейді, егер осы уақытқа дейін бала коклюшпен ауырса. Мұндай жағдайда АДС-ревакцинациясы 9-12 ай аралығында қолданылады.

3-прививка АҚДС –міндетті түрде егілу керек ,мерзіміне қарамай.Егер бала 2-рет коклюшпен ауырып қойса онда АҚДС жасалмайды орнына АДС -9-12 ай аралығында жасалынады.



1-прививка уақытында егілмесе 6 жасқа дейінгі балаға 2- рет егіледі 1-ай аралығында.6-жастан жоғары балаларға 1-рет қалыпты жағдайда егіледі.

2-прививка қалыпты күнтізбе бойынша жүргізіледі.

3-прививка қалыпты күнтізбе бойынша жүргізіледі.

4-ИПВ-5 ОПВ болу керек 2 жасына дейін.

ККП-вакцинациясын өткізіп алса онда 1-ші мүмкіндікте жасау керек. ККП –ны бөліп егеміз ,егерде бала 1-мен ауырса (қызылша, қызамық, паратит).

Келесі ревакцинациясы күнтізбе бойынша жасалынады.

Ревакцинацияны жіберіп алған жағдайда кез келген мүмкіндік туған жағдайда жасалынады, мектепке барғанша. 0-1 бша, 0-6 бша



Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок

Вакцина	Противопоказания
Все вакцины	Сильная реакция или осложнение на предыдущую дозу**
Все живые вакцины	Первичный иммунодефицит. Иммуносупрессия. Злокачественные болезни. Беременность.
БЦЖ-вакцина	Вес ребенка менее 2000г, коллоидный рубец после предыдущей дозы
ОПВ	Абсолютных противопоказаний нет
АКДС	Прогрессирующее заболевание нервной системы. Афебрильные судороги в анамнезе (вводят АДС вместо АКДС)
АДС, АДС-М	Абсолютных противопоказаний нет
Вакцины корь, паротит, краснуха	Тяжелые реакции на аминогликозиды. Анафилактические реакции на куриный яичный белок (зарубежные тривакцины)

Относительные противопоказания для вакцинации:

- **острые и обострение хронических заболеваний (вакцинация откладывается до окончания обострения);**
- **гемолитическая болезнь новорожденных (среднетяжелая, тяжелая формы);**
- **внутриутробная инфекция;**
- **кожные заболевания;**
- **одновременный прием иммунодепрессантов;**
- **лучевая терапия (вакцинацию проводят через 6 мес. после окончания лечения);**
- **гнойно-септические заболевания;**
- **тяжелые поражения нервной системы с выраженной неврологической симптоматикой.**

early | FALL

created by ankit (1000) at work processing
account later merged with the same ID
edited by tungsten 20.05.08
copyright 2008 tungsten

