

Птицы Адамовского района



Всеми известные:



Синица

- Распр
х, отря
террит
Центр
район
встреч
открыт
водоём
и боль
кроме
включ
остаёт
много
встреч
в Росс



евы
й

а

ицы,

ица

ги

Куропатка

- Род подсемейства фазановых, объект спортивной охоты.




На полах есу

Перепел



платковых отряда куроо
ел служил предметом
ичь, употребляемая в



Снегирь

● певчая птица рода снегирей. Птица

гь

два сверху вокруг



БОЛОТНАЯ СОВА



короткими
рящими
кавчинного



исключительно
низменных
по окраинам

Менее известные, но всё же!



- **Степной лунь – редко залетный вид, 1 раз в 3- 5 лет.**
- **Орел курганник – встречаются холостые, кочующие птицы.**
- **Белая полярная куропатка – встречается на кочевках зимой.**
- **Дрофа – по всей видимости из Адамовских степей исчезла навсегда, или очень надолго. Пока подтверждения о ее появлении нет.**
- **Журавль красавка – стал обычен для района видом, гнездится в типчаково – ковыльной и полынно – злаковой степи с разреженным травостоем. Гнезда устраивает чаще всего на открытой почве вблизи водоемов /не более 600 м/, обычно высидывает 2 – 3 птенца. Птенцы, обсохнув, следуют за родителями. Перед отлетом собираются в стаи, /стаи могут быть довольно большие до 30 особей/ отлетают в конце сентября начале октября. Кормятся частью- в степи, частью- у водоема. Пища состоит из зерен, зелени, насекомых и мелких позвоночных. Эти высокие зоркие птицы очень осторожны. Подъехать к ним довольно трудно, пешего же человека они вообще не подпускают. Однако журавли и больше всего страдают от человека: распашка пастбищ, хищничество пастушечьих собак, браконьерство, весенняя вспашка, сев, культивация, ранняя уборка зерновых, применение ядохимикатов и удобрений. Зимуют журавли в Индии, Бирме, Китае и в Африке.**
- **Степная теркушка – встречается на участках типчаково – ковыльных степей вблизи водоемов.**

Шилоклювка

- Чёрно-белый крупный кулик с изогнутым вверх клювом из семейства Шилоклювковые обитает на пологих берегах солёной и пресной воды в Евразии и Северной Африке. В Предкавказье встречается в низменности и на степной зоне.



Малая крячка

- Вес птицы 45 г, длина 20 см. Имеет неполную чёрную шапочку. Лоб и полоски на крыльях жёлтый, желтоватый, серый,




Краснозобая казарка

- Водоплавающая птица из семейства *Anatidae* напоминающая утку. Имеет яркую и контрастную окраску: каштаново-коричневую шею и грудь, черную голову и спину, белую грудь и брюхо.



Стрепет

- Величиной с куропатку, длина тела достигает 0



Сокол сапсан

- Хищная птица из семейства соколиных, распространённая на всех континентах, кроме Антарктиды, выделена в отдельный род.



Савка

- Коренастая утка средних размеров. Длина 43 — 48 см, масса 500—900 граммов, длина крыла 17,2 см, размах крыльев 30 см.
- Во всех направлениях отличается способностью плавать с помощью своих ширококлиновидных перьев.



Спасибо за внимание!
Берегите птиц!

