

ВИДЫ СПЕКТРОВ. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ

Спектры излучения

Непрерывные

Линейчатые

Полосатые

Распределение энергии по частотам
(спектральная плотность интенсивности излучения)

НЕПРЕРЫВНЫЙ СПЕКТР

- Дают тела, находящиеся в твердом, жидком состоянии, а также плотные газы.
- Чтобы получить, надо нагреть тело до высокой температуры.
- Характер спектра зависит не только от свойств отдельных излучающих атомов, но и от взаимодействия атомов друг с другом.
- В спектре представлены волны всех длин и нет разрывов.
- Непрерывный спектр цветов можно наблюдать на дифракционной решетке. Хорошей демонстрацией спектра является природное явление радуги.



ЛИНЕЙЧАТЫЙ СПЕКТР

- Дают все вещества в газообразном атомарном (но не молекулярном) состоянии (атомы практически не взаимодействуют друг с другом).
- Изолированные атомы данного химического элемента излучают волны строго определенной длины.
- Для наблюдения используют свечение паров вещества в пламени или свечение газового разряда в трубке, наполненной исследуемым газом.
- При увеличении плотности атомарного газа отдельные спектральные линии расширяются.



ПОЛОСАТЫЙ СПЕКТР

- Спектр состоит из отдельных полос, разделенных темными промежутками.
- Каждая полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно расположенных линий.
- Создаются молекулами, не связанными или слабосвязанными друг с другом.
- Для наблюдения используют свечение паров в пламени или свечение газового разряда.




СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ

- Если пропускать белый свет сквозь холодный, неизлучающий газ, то на фоне непрерывного спектра источника появятся темные линии.
- Газ поглощает наиболее интенсивно свет тех длин волн, которые он испускает в сильно нагретом состоянии.


- Темные линии на фоне непрерывного спектра – это линии поглощения, образующие в совокупности спектр поглощения.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Спектральный анализ – метод определения химического состава вещества по его спектру. Разработан в 1859 году немецкими учеными Г. Р. Кирхгофом и Р. В. Бунзеном.



Роберт Вильгельм
Бунзен
1811 - 1899



Густав Роберт Кирхгоф
1824 - 1887

- Длины волн (или частоты) линейчатого спектра какого-либо вещества зависят только от свойств атомов этого вещества, но совершенно не зависят от способа возбуждения свечения атомов.
- Можно обнаружить данный элемент в составе сложного вещества, даже если масса вещества меньше 10^{-10} г.
- Атомы каждого химического элемента имеют строго определённые резонансные частоты, в результате чего именно на этих частотах они излучают или поглощают свет.
- Это приводит к тому, что в спектроскопе на спектрах видны линии (тёмные или светлые) в определённых местах, характерных для каждого вещества. Интенсивность линий зависит от количества вещества и его состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

- Открываются новые элементы: рубидий, цезий и др;
 - Узнали химический состав Солнца и звезд;
 - Определяют химический состав руд и минералов;
 - Метод контроля состава вещества в металлургии, машиностроении, атомной индустрии.
- Состав сложных смесей анализируется по их молекулярным спектрам.