



Тениидозы плотоядных

Разработка оздоровительных и профилактических мероприятий




Тениидозы плотоядных –

заболевания собак и пушных зверей,
вызываемые паразитированием цестод в
тонком кишечнике из семейства


Taeniidae

- зарегистрировано **тениид:**
 - собаки - 30 видов
 - лисицы - 14
 - песцы - 9
- относящиеся к **родам:**
 - Taenia
 - Echinococcus
 - Alveococcus (Echinococcus)
 - Multiceps (Taenia)
 - Hydatigera




Эпизоотологические данные

- тениидозы распространены повсеместно
большую роль в распространении инвазии играют:
- **приотарные собаки**
- **собаки в сельской местности**
(хозяйские, но содержащиеся без привязи)
- **бродячие собаки**



Патогенез и симптомы болезни



Цестоды локализуются между ворсинками кишечника, либо в просвете кишечника, тем самым нарушают секреторно-моторную функцию пищеварительного канала

Симптомы болезни

- у животных отмечается вялость
- извращенный аппетит
- они худеют
- слизистые оболочки анемичны
- м. б. рвота
- выделение жидких фекалий со слизью
- зуд в области ануса
- животные быстро утомляются
- развивается истощение
- м.б. закупорка кишечника большим количеством паразитов



Лабораторная диагностика

- Гельминтоскопия
- Гельминтоовоскопия (флотационные методы)- обнаруживают яйца тениидного типа



- Характеристика яйца:
- размеры 30-40x20-30 мкм
 - Форма округлая, реже слегка овальная
 - Оболочка толстая, двухконтурная, радиально-исчерченная, прозрачная
 - Внутри расположена онкосфера

Антигельминтики для плотоядных (Архипов И.А., 2009)

Антигельминтик	Доза, мг/кг	Toxocara canis	Toxascaris leonina	Ancylostoma caninum	Uncinaria stenocephala	Trichuris vulpis	Dipylidium caninum	Taenia spp.	Mesocestoides lineatus	Echinococcus spp.	Dirofilaria spp. м/ф	Opistorchis felineus	Индекс безопасности
Пиперазин	200 ¹	5	5	3	3	3							2
Фенасал	250						5	5					5
Празиквантел	5 ³						5	5	5	5		5	5
Пирантел	14,4 ²	5	5	5	5								10
Ареколин	4						5	5					2
Бунамидин	20-50						5	5	4				4
Мебендазол	20x3	5	5	5	5	3	4	5					20
Фенбендазол	50x3	5	5	5	5	5	3	5					15
Флубендазол	44x3	5	5	5	5	3		3					7
Оксибендазол	15x2	5	5	5	5	4							5
Фебантел	15	5	5	5	5	5							10
Тетрамизол	12	5	5	5	5								2
Ивермектин	0,2	5	5	5		3					5		3
Политрем	150							3				5	5

Примечание: **Уровень эффективности: 5 – свыше 98 %; 4 – 90–98; 3 – 80–89 %;**

1 – пиперазин применяют в течение двух суток собакам в дозе 200, кошкам – 100 мг/кг; 2 – пирантел применяют собакам в дозе 14,4, кошкам – 57,6 мг/кг; 3 – празиквантел применяют при описторхозе в дозе 25 мг/кг в течение 3 сут.

Терапия при тениидозах

1

- Азинокс, дронцит (ДВ празиквантел)
- Триантелм (празивантел, оксантела памоат, пирантела памоат)
- Празител (празиквантел, пирантел, фенбендазол)
- Прател (празиквантел, пирантел)
- Каниквантель (празиквантел, **фенбендазол**)
- Альбен С (празиквантел, альбендазол)
- Тронцил (празиквантел, пирантел, **фебантел,**)
- Тронцил К (празиквантел, пирантел)

Терапия при тениидозах

2

- Цестал + (празиквантел, пирантел, фенбендазол)
- Цестал КЭТ (празиквантел, пирантел)
- Фебтал-комбо (празиквантел, альбендазол)
- Дирофен (празиквантел, пирантел, тыквенное масло)
- Дронтал (кошкам), Дронтал+(собакам)
- Профендер (празиквантел, эмодапсид) **капли на холку**
- Барс спот – он (празиквантел, ивермектин) **капли на холку**
- Мильбемакс (Milbemax, Novartis, Франция)
- препарат со вкусом мяса для кошек (ДВ мильбемицина оксим, празиквантел)
- Досалид (Dosalid, “Farmasierra Manufacturing S.L.” Испания) – для дегельминтизации собак (пирантела памоат, эпсирантел). Досалид обладает широким спектром антигельминтного действия в отношении нематод и цестод у собак

Салициланилиды :(кроме эхинококка)

3

- ◎ **Поливеркан** (ДВ никлозамид, оксibenдазол)
- ◎ **Феносал** 250 мг/кг ДВ
- ◎ **Фенопег** 0,1 г на 3 кг
- ◎ **Феналидон** 100 мг/кг

Пробиотики

- При запорах – **ЛАКТУЛОЗА (НОРМАЗЕ)**
- При поносе - пероральная дегидротация **РЕГИДРОН, ГЛЮКОСАЛАН, ГАСТРОЛИТ** лучше при водянист. диарее
- Пеногасители – **ЭСПУМИЗАН**

- Бактонеотим (1 табл. на 10 кг веса в течение 3-5 дней)
- Pro-Kolin (пробиотик, пребиотик, каолин, пектин)
- **Лактобифадол** (для кошек, для собак)
- **Бифитрилак**
- **Лактоферон**
- **Протозаймс** (Protozymes – медицин.) 1 капсула два раза в день на 30 кг веса перед едой
- **Бифиформ** (медицин.)

Энтеросорбенты


- Энтерокал
- Смекта
- Энтегнин (полифепан)
- Энтеросгель
- Карболен
- Антрален (сорб. действие + иммуностимулятор – понижает уровень ЦИК и повышает Т-лимфоц. уровень))


Пет Пиллер

С этим инструментом, легким в эксплуатации, вы можете бережно и быстро дать таблетку, пилюлю и витамины вашей кошке или собаке.

Инструкция

1. Поместите таблетку или пилюлю в резиновый наконечник, рис. 1 и 2.
2. Откройте рот животному, рис. 3
3. Поместите наконечник с лекарством или витаминами на корень языка, рис. 4
4. Вытолкните лекарство, надавив на поршень.
5. Выньте инструмент и закройте животному рот, стимулируя сглатывание.





Лечить надо,
но помните:
самое
главное
- не навреди !



no comment



Вопросы?