

Растительные ткани

Ринии – первые наземные
растения.

Растительные ткани

Ткань — группа сходных по происхождению и строению клеток и межклеточное вещество, образующих структурно-функциональный комплекс и выполняющих одинаковые функции.

Различают шесть основных групп (систем) тканей:

1. Меристематические (образовательные) ткани.
2. Покровные (пограничные) ткани.
3. Основные ткани.
4. Механические ткани.
5. Проводящие ткани.
6. Выделительные (секреторные) ткани.

Растительные ткани

Образовательные ткани (меристемы):

Образованы недифференцированными (**паренхимными**) округлыми или многогранными клетками без межклетников. Клеточные стенки тонкие, легко растяжимые, цитоплазма густая, вязкая, ядро крупное, занимает центральное положение

По происхождению различают:

Первичные меристемы — меристемы зародыша. Они обуславливают развитие проростка и первичный рост органов.

Вторичные меристемы. Возникают на базе первичных. Обеспечивают рост органов преимущественно в ширину.

1. Образовательные ткани (меристемы)

По местоположению различают:

1. *Верхушечные (апикальные) меристемы.*
2. *Боковые (латеральные) меристемы.*

Возникают за счет деятельности первичных меристем. Как правило, обуславливают утолщение осевых органов. К ним относится **камбий** и пробковый камбий – **феллоген**.

1. Образовательные ткани (меристемы)

По местоположению различают:

- 3. Вставочные (интеркалярные) меристемы.*

Участки интенсивно делящихся клеток,
расположенные обычно над узлами побегов.

- 4. Раневые (травматические) меристемы.*

Обеспечивают зарастание раны,
перекрывают доступ возбудителям
болезней.

2. Покровные ткани

Основные функции — защита
молодых органов от высыхания,
механическая защита и
газообмен.

Различают:
эпидерму, перицерму и корку.

1. Эпидерма, первичная
покровная ткань.

Образована одним слоем клеток,
покрывающих все молодые
органы растений.

Покровная ткань зоны
всасывания корней называется
эпидермой (ризодермой).

2. Покровные ткани

Эпидерма листьев имеет структуры для газообмена – устьица. *Устьица* ограничено двумя клетками бобовидной формы, *замыкающими клетками*.

Замыкающие клетки содержат хлоропласти, а клетки эпидермы, окружающие замыкающие, называются *побочными или прилегающими* и не содержат хлоропластов.

Под устьицем находится *газовоздушная камера*. Устьица чаще располагаются на нижней стороне листа.

2. Покровные ткани

2. Перидерма, вторичная покровная ткань.

Состоит из *феллемы* — собственно пробки, *феллогена* — пробкового камбия и *феллодермы* — пробковой паренхимы. Она сменяет эпидерму, которая постепенно отмирает и слущивается. Феллоген закладывается в эпидерме, под эпидермой и даже в более глубоких слоях осевых органов.

Пробка состоит из плотно расположенных клеток с опробковшими стенками. Содержимое клетки отмирает. Не проницаема для воды и газов. Для газообмена и транспирации в пробке формируются чечевички.

Перидерма:
1 — чечевичка; 2 — остатки эпидермы; 3 — феллема; 4 — феллоген; 5 — феллодерма.

2. Покровные ткани

3. Корка (ритидом), третичная покровная ткань.

При образовании корки новый слой феллогена и перицермы закладывается в основной ткани, лежащей глубже первой наружной перицермы.

Вновь образовавшиеся слои пробки отчленяют к периферии органа не только перицерму, но и часть лежащей под ней паренхимы коры. Так возникает толстое многоклеточное и мертвое образование. Так как корка не может растягиваться, при утолщении ствола она лопается и образуются трещины.

3. Механические ткани

Колленхима.

Образована живыми, вытянутыми в длину клетками, часто содержащими хлоропласти. Клеточные стенки неравномерно утолщены.

Склеренхима.

Образована клетками с равномерно утолщенными, часто одревесневшими стенками. Протопласт отмирает рано, и опорную функцию выполняют мертвые клетки, которые называют волокнами.

Различают:

лубяные волокна (во флоэме);
древесинные волокна (в ксилеме).

4. Проводящие ткани

Обеспечивают транспорт веществ в растении.

Это сложное образование, состоящее из проводящих элементов и сопутствующих им механических и основных тканей.

1. Ксилема (древесина). Состоит из **сосудов** (трахей) и трахеид, осуществляющих восходящий ток воды и минеральных веществ, а также **древесных волокон** и **древесной паренхимы.**

Сосуды – длинные микроскопические трубы.

Торцевые стенки клеток, образовавших сосуды почти полностью растворяются и возникают сквозные отверстия (перфорации).

Это более совершенная проводящая ткань, достигающая наибольшего развития у покрытосеменных.

4. Проводящие ткани

Трахеиды.

Вытянутые клетки с сильно скошенными торцевыми стенками. Проникновение раствора из одной трахеиды в другую происходит через **поры**. Чаще встречаются у высших споровых и голосеменных растений.

4. Проводящие ткани

Флоэма (луб).

Состоит из **ситовидных** клеток, **ситовидных** трубок и **сопровождающих их** клеток-спутниц, лубяной паренхимы и флоэмных (лубяных) волокон.

4. Проводящие ткани

Ситовидные клетки. Характерны для высших споровых и голосеменных растений. Ситовидные поля рассеяны по боковым стенкам. В зрелых клетках сохраняется ядро. Ситовидные клетки лишены сопровождающих клеток.

Ситовидные трубки. Характерны для покрытосеменных растений. Перфорации образуют ситовидные пластиинки, которые располагаются на торцевых концах клеток. В зрелых члениках ситовидных трубок ядро отсутствует, однако клетка остается живой. Рядом с каждым члеником располагаются **клетки-спутницы**.

Олимпиадникам


5. Основные ткани

Составляют основу органов, *паренхиму*. Различают:

1. Ассимиляционную, или хлорофиллоносную, паренхиму (хлоренхиму).
2. Запасающую паренхиму.

Преимущественно развита в осевых органах, органах репродуктивного и вегетативного размножения. Служат для сохранения питательных веществ.

3. Воздухоносная паренхима.



6. Выделительные ткани

Выделяют различные химические вещества, играющие определенное значение в жизни растений: одни привлекают насекомых-опылителей, другие являются продуктами обмена веществ и т.д. К таким тканям относят:

- 1. Внешние выделительные структуры: нектарники, гидатоды и осмофоры.**

- 2. Внутренние выделительные структуры: вместилища выделений – смоляные ходы и млечники.**

6. Выделительные ткани

Видоизменения побегов

Значение видоизмененных побегов

1. Запас воды (луковица гусиного лука, кочан капусты, водозапасающий побег кактуса).
2. Запас питательных веществ (клубень картофеля, луковица тюльпана, клубнелуковица гладиолуса, **каудекс** одуванчика, люпина, адениума — видоизмененная прикорневая часть надземного побега, несущая запас питательных веществ (рис. 2, 3)).

Рис. 2

Рис.

3. Фотосинтез (**филлокладии** иглицы и спаржи — листовидные фотосинтезирующие побеги с ограниченным ростом (рис. 4), **кладодии** зигокактуса — боковые уплощенные фотосинтезирующие побеги с неограниченным ростом (рис. 5)).

Рис.4

Рис. 5

4. Опорная функция (усики винограда, тыквенных (арбуза, тыквы, огурца (рис. 6)).

5. Распространение и вегетативное размножение (столоны, усы, плети, луковицы, клубнелуковицы, корневища и т. п.).
6. Механическая защита (колючки боярышника, дикой яблони и груши; розеточные побеги подорожника и очитка — побеги с укороченными междуузлиями (рис. 7, 8)).

Рис.7

Рис. 8

Значение видоизмененных листьев

1. Сокращение испарения воды (колючки кактуса).
2. Механическая защита (колючки барбариса, белой акации и караганы).
3. Фиксация (усики у сем. бобовых).
4. Запас воды (мешковидные листья тропической лианы дисхидии (рис. 9, 10)).

5. Ловчие листья хищных растений (росянка, мухоловка (рис. 11), непентес).

Рис. 11

5. Водозапасающие (**суккулентные**) листья (агава, алоэ, видоизмененные).

Видоизменение корней

1. Запасающая функция (корнеплоды, корневые клубни (корневые шишки)).
 - Корнеплоды (морковь, репа, свекла) – разрастание верхней части корня, в который затягивается нижняя часть стебля или весь укороченный побег (рис. 15).

- Корневые клубни, или корневые шишки, (георгин, батат) – разрастание боковых корней (рис. 16).

2. Воздушные корни эпифитных растений (рис. 17) служат для поглощения воздушной влаги, т. к. не имеют возможности получать питательные вещества из почвы.

У орхидей такие корни покрыты несколькими слоями мертвых клеток, образующих губчатую поверхность. Такие корни могут впитывать воду во время дождя и росы, а также поглощать ее из воздуха в виде водяных паров. Находясь на свету, их клетки часто содержат хлоропласты фотосинтеза.

4. **Опорные корни, или корни-ходули,** (баньян, кукуруза (рис. 18)) — придаточные корни у ряда крупных деревьев в тропиках образуются на боковых ветвях высоко над землей. Они поддерживают тяжелые боковые ветви, а также служат им источником минералов

5. **Дыхательные корни** — это боковые корни, которые растут не вниз, как положено корням, а вверх. Образуются на заболоченных почвах, где корням для нормального функционирования часто не хватает кислорода. Достигая незатопляемой поверхности, они образуют на концах открытые в воздух отверстия. Внутри таких корней формируется воздухоносная паренхима с большими соединенными по всей длине корня межклетниками. По ним кислород диффундирует вглубь корневой системы, обеспечивая клеткам корней возможность получать достат