


**Лечение острой
сердечной
недостаточности и
инсульте**

**при нарушении ритма возникает
снижение деятельности
сердечной мышцы (миокарда),
реже - при нарушении сердечного
ритма.**




Самым опасным осложнением является отек легких, чаще среди больных с сердечной недостаточностью. Он проявляется от кошмарного сна с ощущением удушья и нехватки воздуха. Если больному вовремя садится, ему становится легче дышать. Иногда это не помогает, и тогда нарастает одышка, появляется кашель с выделением вязкой мокроты с примесью крови, дыхание становится клокочущим. Если больному в этот момент не оказать срочную помощь, он может погибнуть.

Первая доврачебная помощь

-
-
- Обложить пострадавшего на лицо и шею влажной тканью, смоченной в холодной воде и дать понюхать нашатырный спирт.
- Обложить пострадавшего грелками.
- Дать пострадавшему валидол, или нитроглицерин (под язык), или корвалол (40 капель на 100 мл воды).
- Срочно вызвать «скорую помощь».


Ишемический инсульт

Ишемический инсульт



Геморрагический инсульт

Геморрагический инсульт



**Создаются новые клетки
и гибнут.**

**Хотя по большей части инсульты бывают у
пожилых людей, они могут случиться в
любом возрасте. Чаще наблюдаются у
мужчин, чем у женщин.**

разрыве артериального сосуда
с вытеканием крови

или

- мозговое кровоотечение.

инсульта.

ОМ.

Риск возникновения инсульта увеличивается с возрастом, поскольку такие болезни, как атеросклероз, диабет, гипертония, чаще встречаются у пожилых людей.

Неправильное питание, курение также повышают предрасположенность к инсульту.

Кровь скапливается глубоко
в мозгу. Это ещё сильнее сжимает
мозговую ткань и причиняет ещё
больший ущерб клеткам мозга.

Инсульт от мозгового кровотечения
может случиться неожиданно в любом
возрасте.



при отсутствии дыхания
искусственное дыхание,
если нет пульса. При отсутствии пульса
начать реанимацию.

- если нет травмы головы, шеи или позвоночника,
надо помочь больному перекатиться на
повреждённую сторону, немного приподнять голову и
грудь больного и подложить под них подушки или
одеяло. Обеспечить тепло. К голове можно
приложить холод.

Не давайте пострадавшему есть или пить: он может оказаться неспособным глотать.

ИСТОЧНИКИ:

*Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», В.В.Марков,
В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, 11 класс – М. : Дрофа,
2013*

<http://1poserdcu.ru/bolezni/pervaya-medicinskaya-pomoshh-pri-ostroj-serdechnoj-nedostatochnosti-i-insulte.html>

