




**Инфекционные заболевания
передаваемые половым
путём**

Инфекционные заболевания, передающиеся от человека к человеку преимущественно половым путем - **ЗППГ** или **БППП** (болезни, передаваемые половым путем), встречаются часто, особенно в последние годы. В настоящее время насчитывается более 20 возбудителей болезней, передающихся половым путем, в том числе бактерии, вирусы, простейшие, дрожжевые грибы, членистоногие.



Наиболее частые заболевания

- 1) Сифилис
- 2) СПИД
- 3) Гонорея




- В России за последние 6 лет, к примеру, заболеваемости сифилисом возросла в 40 раз,
- Причём катастрофический рост отмечен среди детей и подростков – в 45 раз увеличилось число случаев врожденного сифилиса.

- Сифилис
Сифилис относят к классическим заболеваниям, передающимся половым путем (венерическим болезням). Возбудитель – бледная трепонема (*Treponema pallidum*). Сифилис характеризуется медленным прогрессирующим течением. На поздних стадиях он может приводить к тяжелым поражениям нервной системы и внутренних органов.

- Заражение сифилисом

В большинстве случаев заражение сифилисом происходит при половых контактах. Наиболее заразны больные первичным сифилисом (с язвами на половых органах, во рту или в прямой кишке). Кроме того, возможна передача инфекции от больной матери плоду во время беременности, а также заражение при попадании крови.



Признаки заболевания

- Проявляются только через 3-4 недели после заражения. На месте внедрившейся инфекции образуется плотная ссадина или язва – твёрдый шанкр.
- Через 1-2 месяца на коже появляется сыпь, которая пропадает и появляется вновь. Затем могут начаться головные боли и боли в костях. В запущенных случаях поражается нервная ткань спинного мозга, теряется чувствительность ног, проваливается нос, поражаются зубы, появляются тяжёлые поражения кожи и внутренних органов. Сифилис передаётся по наследству.

Гонорея

- **Гонорея** – это Инфекция передающаяся при половых контактах, а также через вещи, принадлежащие больному человеку. Поэтому недопустимо пользоваться чужими трусами, колготками, мочалками, так через эти можно заразиться гонореей и другими венерическими заболеваниями.

Признаки заболеваний

- Заболевания являются гнойными выделениями из половых органов и сильная резь при мочеиспускании. Гнойные выделения заметны утром, после сна. Инфекция распространяется и захватывает мочевой пузырь, почки, а также внутренние половые органы. Иммунная память на это заболевание также отсутствует.

СПИД

- Спид – вызывается вирусом, поражающим Т- лимфоциты иммунной системы человека. Вирус попадает в здоровую клетку и встраивается в её генный аппарат. Клетка начинает продуцировать отдельные части вирусов.

- Человек заболевший СПИДом, теряет способность бороться с любой инфекцией и раковыми перерождениями собственных клеток. Организм фактически становится беззащитным и гибнет либо от раковых заболеваний, либо от инфекций, чаще легочных.
- Знай: Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека возможно только тремя путями - половой путь, кровь - кровь, мать - дитя.

- СПИД передаётся от больного человека здоровому при половых контактах и при попадании его непосредственно в кровь. Например при использовании нестерильного шприца.
- **Знай:** Инфицирование ВИЧ в быту НЕВОЗМОЖНО

Меры предосторожности

- Презервативы являются надежным средством защиты от инфекций, которые передаются половым путем. И хотя контрацептивы полностью не защищают от заражения, они значительно снижают риск попадания инфекции на половые органы. Приобретать презервативы следует в аптеках, чтобы обезопасить себя от использования некачественного продукта.

