

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАФЕДРА: ИНТЕРНАТУРА БОЙЫНША ЖАЛПЫ ДӘРІГЕРЛІК КӨМЕК КАЕДРАСЫ

# ТАҚЫРЫБЫ: **БЖАИЖ.Диарея.**



СЕМЕЙ  
2017 ЖЫЛ

ОРЫНДАҒАН: СЕТЕРБАЕВ А.А  
608 ТОП  
ТЕКСЕРГЕН: ДОСБАЕВА А.М

# ЖАЛПЫ ҚАУІП БЕЛГІЛЕРІ БАР МА, ТЕКСЕРІҢІЗ.

СҰЙЫҚ ІШЕ  
АЛМАЙДЫ ӘЛДЕ  
ЕМШЕК СОРА  
АЛМАЙДЫ

ТАМАҚТАН КЕЙІН  
НЕМЕСЕ  
СҰЙЫҚ ІШУДЕН КЕЙІН  
ҚҰСУ БОЛДЫ

ОСЫ АУРУ КЕЗІНДЕ  
ТЫРЫСУ БОЛДЫ.

ЕСІНЕН ТАНҒАН  
НЕМЕСЕ  
ЛЕТАРГИЯЛЫҚ

**Балада диарея бар ма?**



**Егер бар болса, сұраймыз.**



Ұзақтығы? \_\_\_\_\_ Қанша күн

Дәретінде қан бар ма?

## Баланың жағдайын қараңыз.

Бала: Есінен танған немесе летаргия жағдайында?  
Мазасыз немесе ауырсынудан тітіркенеді?

Бала көзі кіртігені бар ма, аңықтаңыз.

Балаға сұйық ішуді ұсыныңыз .

Бала: ішпейді немесе іше алмайды?  
Өте ішкісі келеді, шөлдейді?

Іштегі тері қыртысының жағдайын тексеріңіз.

Қыртыс жазылады:

Өте баяу (2 секунд асқанда)?

Баяу?

# ДИАРЕЯ ЖІКТЕЛУІ.



**СУСЫЗДАНУ ДЕҢГЕЙІ  
БОЙЫНША.**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Жалпы қауіптің кез келген белгілері және</b></li> <li>• <b>Есінен танған немесе летаргия жағдайында</b></li> <li>• <b>Көзі кіртіген.</b></li> <li>• <b>Ішпейді немесе іше алмайды</b></li> <li>• <b>Тері қатпарлары өте баяу жазылады.</b></li> </ul>	<p align="center"><b>АУЫР СУСЫЗДАНУ.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Егер балада басқа ауыр аурулар болмасы : -Ауыр сусыздану кезінде схема бойынша сұйықтық беріңіз.(В жоспары)</li> <li align="center">Егер</li> <li>□ Егер балада басқа ауыр аурулары болса : -Жедел стационарға жібереміз,анасы жолда ПРС жиі беруі тиіс.Анасына омыраумен емізуді жалғастыруына кеңес береміз.</li> <li>□ Егер бала 2 жас немесе одан үлкен болса және осы аймақта холера болса, холераны емдеу үшін антибактериалды препарат береміз.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Келесі белгілердің екеуі болса.</b></li> <li>• <b>Ауырсынудан тітіркенеді.</b></li> <li>• <b>Көзі кіртіген.</b></li> <li>• <b>Өте ішкісі келеді, шөлдейді.</b></li> <li>• <b>Тері қатпарлары баяу жазылады.</b></li> </ul>	<p align="center"><b>ШАМАЛЫ СУСЫЗДАНУ.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ПРС, цинк және шамалы сусыздану кезінде схема бойынша беріңіз.(Б жоспары)</li> <li>□ Егер балада басқа ауыр аурулары болса : -Жедел стационарға жібереміз,анасы жолда ПРС жиі беруі тиіс.Анасына омыраумен емізуді жалғастыруына кеңес береміз.</li> <li>□ Анасына қашан шұғыл келу керек екендігін түсіндіріңіз.</li> <li>□ Қайта келу 5 күннен кейін,егер жақсару болмаса.</li> </ul>
<p><b>Ауыр сусыздану немесе шамалы сусыздану белгілері жеткіліксіз.</b></p>	<p align="center"><b>СУСЫЗДАНУ ЖОҚ.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Сұйықтық , цинк беріңіз және Б жоспары бойынша диареяны үйде емдеңіз.</li> <li>□ Анасына қашан шұғыл келу керек екендігін түсіндіріңіз.</li> <li>□ Егер жағдайы жақсармаса, 5 күннен кейін қайта қаралуы</li> </ul>

**ЕГЕР ДИАРЕЯ 14  
КҮННЕН КӨП  
БОЛСА:**

**• СУСЫЗДАНУ БАР.**

**АУЫР  
СОЗЫЛЫҢҚЫ  
ДИАРЕЯ.**

- Егер басқа ауыр аурулары болмаса, стационарға жибермес бұрын сусыздануды емдеңіз.
- Стационарға жіберіңіз.

**• СУСЫЗДАНУ ЖОҚ.**

**СОЗЫЛЫҢҚЫ  
ДИАРЕЯ.**

- Анасына созылыңқы диареясы бар баланы қалай тамақтандыру керек екендігін түсіндіріңіз.
- 14 күн бойы поливитаминдер мен минералдар беріңіз.
- 5 күннен кейін қайта қаралуы керек.

**ЕГЕР  
НӘЖІСІНДЕ  
ҚАН БОЛСА:**

**• НӘЖІСТЕ ҚАН.**

**ДИЗЕНТЕРИЯ.**

- 3 күн ципрофлоксацин беріңіз. сусыздануды емдеңіз және цинк беріңіз.
- 2 күннен кейін қайта қаралуы керек.

## “А” ЕМДЕУ ЖОСПАРЫ ДИАРЕЯНЫ ҮЙДЕ ЕМДЕУ

АНАСЫНА ҮЙРЕТУ ҮШІН БҰЛ ЖОСПАРДЫ  
ҚОЛДАҢЫҢЫЗ:

- нағыз диареяны үйде емдеуді жалғастыру
- баланың диарея көрінісінің емдеуін ерте бастауға дайын болу



**Сусыздануды болдырмау үшін, бұрынғыдан қарағанда, өз балаңызға көбірек сұйықтық беріңіз.**

- үйде емдеу үшін тағайындалған сұйықтықты қолданыңыз. Олар: ПРС, тағам өнімдерінің негізіндегі сұйықтықтар: сұйық бөтқа, күріш суы, сорпа және қарапайым ішетін су. Балаларды емдеу үшін ПРС ерітіндісін қолдану әдісі төменде көрсетілген. Ескүріңіз, егер бала 6 айдан кіші болып қосымша тамақты алмаса, тағам өнімдерінің негізіндегі сұйықтықтарды емес, ПРС, немесе қарапайым суды қоладаныңыз
- сұйықтықты бере беріңіз – бала қанша ішсе сонша
- диарея бітпегенше, сұйықтықтарды бере беріңіз

**БАЛАЛАР ПРС ЕРІТІНДІСІН ҮЙІНДЕ БЕРУ КЕРЕК, ЕГЕР:**

- олар “Б” немесе “В” емдеу жоспары бойынша ем қабылдаған болса
- егер диарея күшейсе, бірақ баламен стационарға келуге мүмкіндік болмаса.

**ЕГЕР БАЛА ПРС ҮЙІНДЕ АЛАТЫН БОЛСА, АНАСЫНА ӘР СҰЙЫҚ  
НӘЖІСПЕН КЕЙІН ҚАНША ПРС БЕРУ КЕРЕК ЕКЕНДІГІН  
ТҮСІНДІРУ.**

<b>Жасы</b>	<b>Әр сұйық нәжіспен кейін берілетін ПРС мөлшері</b>
2 жасқа дейін	50- 100 мл
2 жас немесе одан жоғары.	100 – 200 мл

## **АНАСЫНА ПРС ЕРІТІНДІСІН ҚАЛАЙ ДАЙЫНДАУ КЕРЕК ЕКЕНДІГІН КӨРСЕТІҢІЗ.**

### **БАЛАҒА ҚАНША ЕРІТІНДІ БЕРУ КЕРЕК ЕКЕНДІГІН КӨРСЕТІҢІЗ**

- 2 жастан кіші балаға әр 1-2 минут сайын ерітіндіні шай қасықпен беріңіз
- жоғары жастағы балаларға кеседен ерітіндіні жиі жұтуға беріңіз
- егер бала құсса, 10 минут тоса тұрыңыз. Содан кейін балаға ерітіндіні інкізуге жалғастыру, бірақ ақырындап (мысалға 2-3 минут сайын 1 қасықтан)
- егер бүкіл ПРС ерітіндісі қолданылып, бірақ диарея көрсетілген сұйықтықтарды беріп, немесе қосымша ПРС ерітіндіге денсаулық сақтаудағы жұмыскерге қайтып келеу керек

## Цинк препаратын беру.

**Цинк препаратын қанша мөлшерде беру керектігін анасына түсіндіру.**

6 айға дейін

10-14 күн бойы S таблетка  
(10мг)

6 ай және ондан жоғары

10-14 күн бойы 1 таблетка (20  
мг)

# “Б” ЕМДЕУ ЖОСПАРЫ СУСЫЗДАНУДЫ ЕМДЕУ

## АЛҒАШҚЫ 4-6 САҒАТТА ПРС ЕРІТІНДІСІН ҚОЛДАНУ ҮШІН

<b>Жасы</b>	<b>4 айдан төмен</b>	<b>4-12 ай</b>	<b>12 айдан 2 жасқа дейін.</b>	<b>2-5 жас</b>
Салмағы	6 кг төмен	6-10 кг	10-12 кг	12-19 кг
ПРС (мл)	200-400	400-700	700-900	900-1400

Егер науқас салмағын білмесе, жасын қолданыңыз. Коэффициент 75 науқастың салмағына (кг) көбею жолымен ПРС көлемін (мл) есептеуге болады:

- егер науқас тағы ПРС сұраса, тағы беріңіз
- анасына омыраумен тамақтандыруды жалғастыруды айтыңыз.
- 6 айдан төмен балаларға және омырау сүтімен тамақтанбаса, бұл кезеңге 100-200 мл қарапайым суды қосыңыз.

**ЕГЕР АНАСЫНДА ”Б” ЖОСПАРЫ БОЙЫНША ЕМДЕУДІ АЯҚТАУ  
АЛДЫНДА АМБУЛАТОРИЯДАН КЕТУ КЕРЕК БОЛСА**

- Үйде ПРС-ті қалай дайындау керектігін түсіндіру.
- үйінде алғашқы 4 сағат бойы емдеу циклын аяқтау үшін балаға ПРС қаншадан беру керек екендігін анасына көрсету
- анасына 2 күнге жеткілікті ПРС пакеттерін беріңіз
- анасына ПРС қалай дайындауын көрсетіңіз

# Үйде емдеудің 4 ережесін анасына түсіндіру.

Қосымша  
сұйықтық беру.

Ішке цинк  
препаратын беру.

Тамақтандыруды  
жалғастыру.

Қашан жедел  
келу керектігін  
білу.



# “В” ЕМДЕУ ЖОСПАРЫ АУЫР СУСЫЗДАНУ ЕМІ

Бағыттарға көңіл бөліңіз. Егер жауабы – “иә” болса, - көлденең бағытпен жүресіз. Егер жауабы – “жоқ”, тік бағытпен жүресіз

**ВВ**  
терапияны  
тез арада  
өткізе аласыз  
ба?

ИӘ

**ВВ сұйықтықтарда тез арада бере бастаңыз. Егер науқас іше алса, ПРС бере бастаңыз, ВВ құю үшін жүстені дайындағанша, Лактат Рингер 100 мл/кг ерітіндісін беріңіз (егер ол жоқ болса, физиологиялық ерітінді бере аласыз), төменде көрсетілгендер**

ЖАСЫ	Алдымен 30 мл/кг беріңіз:	Содан кейін 70 мл/кг:
Нәрестелер (12 айға дейін)	1 сағат ішінде	5 сағат ішінде
Жоғарғы жастағы балалар	30 минут ішінде	2,5 сағат ішінде

Ж  
О  
Қ

Ж  
О  
Қ

Баланы тез  
ауруханаға  
жатқыза аласыз  
ба? (30 минут  
ішінде)

Ж  
О  
Қ

ИӨ

- науқасты тез арада ВВ терапияға жіберіңіз егер науқас іше алатын болса, анасына ПРС ерітіндісін беріп, тарнспортировка кезінде қалай беретінін көрсетіңіз.

Ж  
О  
Қ

Регидратация үшін  
интраназальді катетерді  
қолданыла аласыз ба?

Ж  
О  
Қ

Бала іше ала ма?

Ж  
О  
Қ


ИӘ

ПРС қолданып регидратация зонд арқылы бастаңыз. 6 сағат ішінде 20 мл/кг сағ беріңіз (барлығы 120 мл/кг)

1-2 сағат сайын баланың жағдайын бағалаңыз:

егер қайталамалы құсу немесе іштің қабынуы пайда болса, сұйықтықты ақырын беріңіз егер 3 сағаттан кейін жағдайы жақсармаса, науқасты ауруханаға жатқызыңыз

6 сағаттан кейін баланың жағдайын қайта бағалаңыз және келісетін емдеу жоспарын таңдаңыз



***Шұғыл түрде:***  
Баланы ВВ терапияға  
жіберіңіз

## **ЕСКЕРТУ:**

- егер мүмкіндік болса, 6 сағаттық регидратацияны емнен кейін науқасты қарау, анасы ПРС қолданып, емді жалғастыра алатындығына көз жеткізу.
- егер сіздің ауданыңызда холерамен жағдайлар кездессе және науқастың жасы 2-ден жоғары болса, бала белсенді болғанан кейін ғана, келісетін антибиотиктермен ем бастаңыз.