

АЛЬБОМ СОРНЯКОВ

Альбом сорняков

Составитель: Полин В.Д.

Размещено: <http://yadyra.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

Вьюнок полевой

Амброзия

полыннолистная

Бодяк полевой

Борадавник

обыкновенный

Будра плющевидная

Василек синий

Галинсога мелкоцветная

Горец вьющийся

Горец птичий

Горец шероховатый

Горчак ползучий

Горчица полевая

Донник лекарственный

Дымянка аптечная

Ежовник петушье просо

Желтушник левкойный

Живокость полевая

Заразиха подсолнечная

Клоповник мусорный

Костер ржаной

Куколь обыкновенный

Лапчатка гусинная

Лебеда раскидистая

Липучка ежевидная

Льнянка обыкновенная

Лютик едкий

Лютик ползучий

Марь белая

Мать-и-мачеха

Метлица обыкновенная

Звездчатка средняя, Мокрица

Мятлик однолетний

Овсяг

Одуванчик лекарственный

Осот полевой

Повилика клеверная

Пикульник обыкновенный

Плевел опьяняющий

Погремок весенний

Подмаренник цепкий

Подорожник большой

Полынь горькая

Пырей ползучий

Редька дикая

Ромашка непахучая

Свиной пальчатый

Сорго александрийское, Гумай

Сурепка обыкновенная

Сушеница топяная

Торица обыкновенная

Тысячелистник

обыкновенный

Фиалка полевая

Хвощ полевой

Цикорий обыкновенный

Чистец болотный

Ширица запрокинутая

Щавель курчавый

Щавелек малый

Щетинник сизый

Ярутка полевая



Вьюнок полевой

Лат. *Convolvulus arvensis* L.

Сем. Вьюнковые

**Биогруппа –
Корнеотпрысковые**

Распространен повсеместно, предпочитает плодородные почвы. В посевах зерновых, многолетних трав, овощных сорняк обвивает стебли культурных растений и вызывает их полегание. Меры борьбы - истощение, достигается глубоким под-резанием корневой системы. Хорошие результаты дает паровая обработка в сочетании с гербицидами.





Амброзия полыннолистная

Лат. *Ambrosia artemisiifolia* L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа – Яровые поздние

Карантинное сорное растение. Широко встречается в южных районах. Для уничтожения сорняка используют агротехнические способы и обработку гербицидами, включая мероприятия по борьбе с карантинными сорняками.





Бодяк полевой

Лат . *Cirsium arvense* L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа - Корнеотпрысковые

Распространен повсеместно, предпочитает плодородные и азрированные почвы. Засоряет зерновые, многолетние травы, пропашные, овощные, огороды и сады. Злостный и обременительный сорняк в Нечерноземной зоне. Меры борьбы - истощение, лучшие результаты дают комплексные меры борьбы.





Бородавник обыкновенный

Лат. *Lapsana communis* L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа - Зимующие

Распространен повсеместно. Засоряет поля, луга, сады и огороды, предпочитает плодородные увлажненные почвы в лесной зоне. В посевах встречается в небольших количествах поэтому борьба с ним не представляет больших трудностей. На лугах и пастбищах его подкашивают до обсеменения.





Будра плющевидная


Лат. *Glechoma hederacea* L.

Сем. Губоцветные

Биогруппа – Ползучие

Распространен повсеместно, предпочитает увлажненные места, засоряет луга, поля, сады и огороды. Сорняк уничтожается полностью при глубокой вспашке. Устойчивым сорняком в посевах при соблюдении агротехники не является.





Василек синий

Лат. *Centaurea cyanus* L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа – Зимующие

Распространен повсеместно. Сильно засоряет озимые, многолетние травы, яровые и пропашные культуры. Особенно вредоносен на озимых. Очищению полей способствует глубокая обработка почвы плугом с предплужником. Эффективны химические меры борьбы.





Галинсога мелкоцветная

Лат. *Galinsoga parviflora* C.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа – Яровые поздние

Распространен в средней части страны. Растет в огородах, садах. Предпочитает рыхлые гумусированные увлажненные почвы. В борьбе эффективны лущение стерни, вспашка, культивация и др. Сорняк чувствителен к большинству применяемых гербицидов.





Горец вьющийся

Лат. *Polygonum convolvulus* L.

Сем. Гречишные

**Биогруппа – Яровые
ранние**

Распространен повсеместно. Засоряет все культуры, но главным образом зерновые, пропашные и многолетние травы. Лучше развивается на увлажненных почвах. В посевах зерновых затрудняет уборку. Для борьбы используют – лущение, вспашку с предплужником. Эффективны химические меры борьбы.





Горец птичий

Лат. *Polygonum aviculare* L.

Сем. Гречишные

**Биогруппа – Яровые
ранние**

Распространен повсеместно. Засоряет все культуры, но чаще на плотных почвах многолетние травы, сады и огороды. Для борьбы используют – лущение после уборки предшественника, вспашку с предплужником, Эффективны также предпосевные обработки и гербициды.





Горец шероховатый

Лат. *Polygonum scabrum* M.

Сем. Гречишные

Биогруппа – Яровые ранние

Распространен повсеместно. Засоряет все культуры, особенно зерновые, пропашные и лен. Лучше развивается на увлажненных почвах. Для борьбы используют – лущение после уборки предшественника, вспашку с предплужником. Эффективны предпосевные обработки. Устойчив к гербицидам группы 2,4 Д.





Горчак ползучий

Лат. *Acrotilon repens*L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа – Корнеотпрысковые

Карантинный сорняк, распространен в южных районах европейской части страны. Засоряет посеы всех культур. Для уничтожения горчака ползучего необходим комплексный подход с использованием всех методов борьбы с корнеотпрысковыми сорняками. Возможны и химические методы борьбы.





Горчица полевая

Лат. *Sinapis arvensis*.L.

Сем. Капустные

Биогруппа – Яровые ранние

Относится к ядовитым растениям. Распространен повсеместно. Засоряет яровые культуры. Предпочитает рыхлые и плодородные почвы. Лушение стерни и глубокая вспашка в сочетании с предпосевной обработкой обеспечивают высокую гибель сорняка,





Донник лекарственный


Лат. *Melilotus officinalis* L.

Сем. Бобовые

Биогруппа – Двулетние

Встречается повсеместно, малотребователен к плодородию почв, засухоустойчив. Засоряет зерновые и особенно многолетние травы. Меры борьбы – заделка семян глубже 5 см, подрезание корневой системы вегетирующих растений, высоко чувствителен к гербицидам.





Дымянка аптечная

Лат. *Fumaria officinalis* L.

Сем. Маковые

**Биогруппа – Яровые
ранние**

Распространена повсеместно, предпочитает рыхлые, плодородные почвы. Засоряет зерновые и пропашные культуры. Сорняк вредоносен, относится к ядовитым растениям. Обладает высокой устойчивостью к мерам борьбы.





Ежовник петушье просо

Лат. *Echinochloa crus galli* L.

Сем. Мятликовые

**Биогруппа – Яровые
поздние**

Распространен повсеместно. Засоряет все культуры, очень вредоносный сорняк, особенно в орошаемом земледелии на пропашных культурах. К мерам борьбы устойчив, после скашивания отрастает, к большинству гербицидов устойчив, более эффективными являются почвенные гербициды.





Желтушник левкойный

Лат. *Erysimum cheiranthoides* L.

Сем. Капустные

Биогруппа – Яровые ранние

Распространен повсеместно. Засоряет полевые и овощные культуры. Лучше развивается на песчаных почвах. При соблюдении севооборотов и агротехники сорняк не является обременительным. Эффективны химические меры борьбы.





Живокость полевая


Лат. *Delphinium consolida* L.

Сем. Лютиковые

Биогруппа – Зимующие

Распространен повсеместно. Растет на полях в садах и огородах, засоряет зерновые и особенно озимые. Хорошо растет на рыхлых плодородных прогреваемых почвах. В борьбе с живокостью используют приемы основной и предпосевной обработок. Сорняк чувствителен к большинству гербицидов





Заразиха подсолнечная

Лат. *Orobanche cumana* W.

Сем. Заразиховые

Биогруппа - Паразитные

Сорняк распространен в южных районах страны. Паразитирует на корнях подсолнечника, табака, конопли и многих сорняков. Меры борьбы – предупредительные, использование устойчивых сортов, возврат на поле не ранее чем через 7 – 8 лет. Химические методы малоэффективны.





Клоповник мусорный

Лат. *Lepidium ruderale* L.

Сем. Гречишные

Биогруппа – Зимующие

Распространен повсеместно. Засоряет посевы зерновых, многолетних трав. Считается ядовитым сорняком. В северных районах не перезимовывает и является ранним яровым. Основной метод борьбы – провокация, соблюдение севооборота. К гербицидам группы 2,4Д устойчив, эффективны почвенные гербициды.





Костер ржаной

Лат. *Bromus secalinus* L.

Сем. Мятликовые

Биогруппа - озимые

Специализированный сорняк озимой ржи. Наиболее распространен в лесной и лесостепной зоне, малотребователен к почвенным условиям. Особенно сильно засоряет озимые хлеба во влажные годы. Меры борьбы – соблюдение севооборотов, тщательная обработка почвы. Эффективны почвенные гербициды.





Куколь обыкновенный

Лат. *Agrostemma gitago* L.

Сем.

Гвоздичные

**Биогруппа – Яровые
ранние**

Распространен по всей стране. Растет на полях, у дорог, в садах. Сорняк считается ядовитым. Для борьбы используют – лущение после уборки предшественника, вспашку с предплужником. Эффективны предпосевные обработки. Устойчив к гербицидам группы 2,4 Д.





Лапчатка гусинная

Лат. *Potentilla anserina* L.

Сем. Розоцветные

Биогруппа – Ползучие

Распространен повсеместно. Растет на полях, пойменных лугах и пастбищах, в садах и ого-родах. Предпочитает хорошо увлажненные почвы. В посевах многолетних трав, на лугах и пастбищах к мерам борьбы устойчива. В посевах культур радикальное средство уничтожения – вспашка. К гербицидам сорняк сравнительно устойчив.





Лебеда раскидистая

Лат. *Atriplex patula* L.

Сем. Маревые

Биогруппа – Яровые ранние

Распространен повсеместно. Засоряет все полевые культуры, сады и огороды. Основные меры борьбы – предупредительные, соблюдение агротехнических мероприятий с целью уничтожения сорняков в фазе всходов. Эффективны химические меры борьбы.





Липучка ежевидная

Лат. *Lappula echinata*

Сем. Бурачниковые

Биогруппа - Двулетние

Распространен повсеместно, засоряет посевы всех культур, но наиболее сильно озимые и пастбища. Предпочитает легкие плодородные почвы. К основным мерам борьбы следует отнести двукратное дискование тяжелой дисковой бороной с последующей запашкой.





Льянка обыкновенная

Лат. *Linaria vulgaris* M.

Сем. Норичниковые

**Биогруппа –
Корнеотпрысковые**

Распространена в лесной зоне страны. Засоряет многолетние травы, изреженные посевы зерновых, сады и огороды. Предпочитает освещенные места, считается ядовитым. Борьба не представляет особых трудностей, при соблюдении агротехники сорняк можно полностью устранить.





Лютик едкий


Лат. *Ranunculus acer* L.

Сем. Лютиковые

**Биогруппа –
Кистекорневые**

Распространен повсеместно, предпочитает сырые освещенные места. Засоряет посевы многолетних трав, овощные и кормовые культуры. Растение ядовитое. Меры борьбы – периодическое подкашивание на лугах и пастбищах. При подрезании корневой шейки сорняки не отрастают.





Лютик ползучий

Лат. *Ranunculus repens* L.

Сем. Лютиковые

Биогруппа – Ползучие

Распространен повсеместно, предпочитает сырые переувлажненные места на тяжелых глинистых почвах. Засоряет овощные, пойменные луга и пастбища. Растение ядовитое. К мерам борьбы относятся все мероприятия по улучшению лугов и пастбищ, подкашивание во время вегетации. В посевах культур легко уничтожается гербицидами.





Марь белая


Лат. *Chenopodium album* L.
Сем.

Маревые

Биогруппа – Яровые ранние

Распространен повсеместно. Растение является злостным сорняком и особенно пропашных культур. Основные меры борьбы – предупредительные, боронование для уничтожения сорняков в фазе всходов. Легко уничтожается как почвенными так и повсходовыми гербицидами





Мать-и- мачеха

Лат. *Tussilago farfara* L.

Сем. Сложноцветные

**Биогруппа -
Корневищные**

Распространен повсеместно. Растет в садах и огородах, предпочитает сырые и тяжелые почвы, к плодородию почвы не требователен. Наиболее обременителен в посевах овощных культур. Меры борьбы - уничтожение молодых розеток, а также глубокое подрезание корневищ. К гербицидам сорняк устойчив.





Метлица обыкновенная

Лат. *Apera spica-venti* L.

Сем. Мятликовые

Биогруппа - озимые

Наиболее сильно сорняк распространен в увлажненной зоне. Встречается во всех культурах, но особенно сильно засоряет озимые. Сорняк очень вредоносный. Меры борьбы – соблюдение севооборотов, тщательная обработка почвы, борьба с переувлажнением. Эффективны почвенные гербициды.





Звездчатка средняя, Мокрица

Лат. *Stellaria media* L.

Сем.

Гвоздичные

Биогруппа – Эфемер

Распространен в таежной и лесолуговой зонах России. Обильно развивается в овощных и пропашных культурах. Мокрица – злостный сорняк, части растений легко приживаются на влажной почве. Меры борьбы – провокация, заделка семян на большую глубину. Эффективны почвенные гербициды.





Мятлик однолетний

Лат. *Poa annua* L.

Сем. Мятликовые

Биогруппа – яровые ранние

Распространен повсеместно. Засоряет все культуры, наиболее обременителен в садах и огородах. Лучше развивается на увлажненных почвах. Для борьбы используют – лущение после уборки предшественника, вспашку с предплужником. Эффективны предпосевные обработки. Хорошо подавляется почвенными гербицидами.





Овсюг

Лат. *Avena fatua* L.

Сем. Мятликовые

Биогруппа – Яровые ранние

Как специальный сорняк, овсюг весьма обременителен. Особо опасен для яровой пшеницы, овса, ячменя. Ранневесеннее поверхностное рыхление способствует появлению всходов овсюга, которые уничтожаются последующими обработками. Эффективны химические меры борьбы.





Одуванчик лекарственный

Лат. *Taraxacum officinale* W.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа - Стержнекорневые

Злостный и повсеместно распространенный сорняк, сильно засоряет луга, пастбища, многолетние травы, сады и огороды и участки несельскохозяйственного использования. Меры борьбы – предупредительные, подрезание корневой системы на глубину 10-15 см. К большинству гербицидов устойчив.





Осот полевой


Лат. *Sonchus arvensis* L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа -
Корнеотпрысковые

Распространен повсеместно, предпочитает освещенные, увлажненные места на плодородных почвах. Наносит большой вред всем культурам. Меры борьбы – истощение корневой системы, эффективна глубокая обработка с культивацией и лемешным луцением. Это достигается в паровых полях. Эффективны также и химические методы.





Повилика клеверная

Лат. *Cuscuta trifolii* В.

Сем. Повиликовые

Биогруппа - Паразитные

Карантинное растение, паразитирует на клевере, люцерне, льне, картофеле, развивается на многих сорняках. Вредоносность повилики очень велика. Меры борьбы – предупредительные (очистка посевного материала), заделка семян на большую глубину. Возможно применение гербицидов.





Пикульник обыкновенный

Лат. *Galeopsis tetrahit* L.

Сем. Губоцветные

Биогруппа – Яровые ранние

Распространен в средних районах европейской части. Сорняк очень вредоносный, предпочитает хорошо удобренные почвы. Для борьбы используют метод провокации, предпосевные обработки. Устойчив к гербицидам группы 2,4Д, эффективны почвенные гербициды.





Плевел опьяняющий

Лат. *Lolium temulentum* L.

Сем. Мятликовые

Биогруппа – яровые ранние

Распространен в районах льносеяния. Очень обременителен и вредоносен. Предпочитает хорошо азрируемые и плодородные почвы. Кроме льна засоряет зерновые культуры. Меры борьбы комплексные (предупредительные и истребительные). К гербицидам устойчив.





Погремок весенний

Лат. *Rhinanthus vernalis*

Сем. Норичниковые

Биогруппа - Полупаразитные

Сорняк широко распространен по всей территории страны. Засоряет озимые, многолетние травы, пастбища и особенно озимую рожь. Меры борьбы – лущение с последующей вспашкой, очистка посевного материала. Чувствителен к гербицидам.





Подмаренник цепкий

Лат. *Galium aparine* L.

Сем. Мареновые

Биогруппа – Яровые ранние

Распространен повсеместно.
Предпочитает увлажненные
плодородные почвы. Особенно
большой вред наносит зерновым и
посевам льна. Своевременная
обработка почвы в севообороте
снижает засоренность. Сорняк
обладает устойчивостью к гербицидам
группы 2,4Д.





Подорожник большой

Лат. *Plantago major* L.

Сем. Подорожниковые

Биогруппа – Кистекорневые

Распространен повсеместно, засоряет все культуры, но наиболее обильно растет в садах и огородах, пастбищах, выносит сильное уплотнение. Предпочитает увлажненные почвы. Поверхностные и глубокие обработки ослабляют сорняк и приводят к его гибели. Чувствителен к гербицидам.






Полынь горькая

Лат. *Artemisia absinthium* L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа - Стержнекорневые

Повсеместно распространенный сорняк с широким экологическим ареалом. Растение имеет ароматный и вяжущий приторный горький вкус. Эффективные средства борьбы – глубокая подрезка и вспашка.





Пырей ползучий

Лат. *Agropyrum repens* L.

Сем. Злаковые

Биогруппа – Корневищные

Распространен повсеместно. Один из злостных и обременительных сорняков для всех культур. При сильном засорении вытесняет всю растительность. Меры борьбы – метод удушения. Используются также и химические методы борьбы.





Редька дикая

Лат. *Raphanus raphanistrum* L.

Сем. Капустные

Биогруппа – Яровые ранние

Распространен повсеместно. Засоряет яровые и пропашные культуры, предпочитает рыхлые почвы. Очень вредоносный сорняк. Хорошо подавляется посевами озимых. Молодые всходы в посевах зерновых уничтожаются боронованием. Эффективны химические меры борьбы.





Ромашка непахучая

Лат. *Matricaria inodora* L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа – Зимующие

Занимает широкий ареал, является очень обременительным и вредоносным сорняком. Засоряет все культуры и особенно изреженные озимые. Меры борьбы – соблюдение севооборота и своевременное выполнение агротехнических мероприятий. Устойчив к гербицидам группы 2,4Д





Свиной пальчатый


Лат. *Synodon dactylon* L.

Сем. Злаковые

Биогруппа – Корневищные

Распространен только в южных районах европейской части, на Кавказе, в Сибири. Это один из наиболее устойчивых и трудноискоренимых сорняков орошаемого земледелия. Меры борьбы – глубокая вспашка в сочетании с глубокой культивацией снижает численность свиной. Используют также химические меры борьбы.





Сорго алепское, Гумай

Лат. *Andropogon halepense* L.

Сем. Злаковые

Биогруппа – Корневищные

Распространен только в южных районах европейской части, на Кавказе, в Сибири. Злостный и трудноискоренимый сорняк орошаемого земледелия. Меры борьбы – предупредительные, высушивание, вымораживание. Возможны и химические меры борьбы.





Пастушья сумка обыкновенная

Лат. *Capsela bursa-pastoris* L.

Сем. Капустные

Биогруппа – Зимующие

Распространен повсеместно. Засоряет все культуры. В зависимости от условий развивается как эфемер, яровой, зимующий или озимый сорняк. Меры борьбы – своевременная уборка, лущение. Высокочувствительна к широко применяемым повсходовым и почвенным гербицидам.





Сурепка обыкновенная

Лат. *Barbarea vulgaris* R.

Сем. Капустные

**Биогруппа –
Корнеотпрысковые**

Распространен повсеместно, предпочитает увлажненные места, рыхлые плодородные почвы. Является обременительным сорняком и засоряет посевы озимых, многолетних трав, пастбища. Меры борьбы – подкашивание на лугах и пастбищах. Чувствителен к гербицидам.





Сушенница топяная

Лат. *Gnaphalium uliginosum* L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа – Яровые ранние

Распространен в северных, средних и юго-западных районах европейской части. Засоряет зерновые, многолетние травы, луга. Предпочитает сырые места на песчаных почвах. При соблюдении общепринятой агротехники сорняк не является обременительным и легко уничтожается.






Торица обыкновенная

Лат. *Spargula vulgaris*L.

Сем. Гвоздичные

Биогруппа – Яровые ранние

Распространен в средних и северных районах. Засоряет зерновые пропашные, однолетние и многолетние травы. Предпочитает увлажненные почвы. Агротехнические методы не всегда эффективны. К повсходовым гербицидам устойчив, лучше использовать почвенные.





**Тысячелистник
обыкновенный**

Лат. *Achillea millefolium* L.

Сем. Сложноцветные

Биогруппа. Корневищные

Распространен повсеместно, засоряет луга, сады, огороды и пастбища. Медленный рост и поверхностное расположение корневищ позволяют уничтожить сорняк обычными технологическими обработками. Считается устойчивым к гербицидам.





Фиалка полевая

Лат. *Viola arvensis* M.

Сем. Фиалковые

Биогруппа – Зимующие

Распространен повсеместно в лесной зоне. Засоряет посевы озимых и яровых зерновых, пропашных, льна, многолетних трав. Меры борьбы – провокация, предпосевная обработка. К гербицидам типа 2,4Д фиалка средне чувствительна, хорошо уничтожается почвенными гербицидами.





Хвощ полевой

Лат. *Equisetum arvense* L.

Сем. Хвощовые

**Биогруппа –
Корневищные**

Распространен повсеместно, предпочитает переувлажненные почвы. Засоряет все культуры, луга, пастбища. Меры борьбы – истощение, достигается подрезкой корневой системы безотвальными орудиями. Обработка гербицидами как правило уничтожает только надземную часть сорняка.





Цикорий обыкновенный

Лат. Cichorium intybus

Сем. Сложноцветные

Биогруппа Стержнекорневые

Распространен повсеместно на дренированных почвах, засоряет луга пастбища, многолетние травы, особенно в условиях орошения. Меры борьбы – подкашивание на лугах и пастбищах до обсеменения, глубокая подрезка и запашка при реконструкции и перезакладке пастбищ.





Чистец болотный

Лат. *Stachys palustris* L.

Сем. Губоцветные

Биогруппа – Клубневые

Распространен повсеместно, предпочитает плодородные увлажненные почвы. Сильно засоряет посевы и посадки овощных, картофеля на пойменных почвах и торфяниках. Меры борьбы – сочетание методов истощения и удушения. Гербициды мало эффективны.





Ширица запрокинутая


Лат. *Amaranthus retroflexus* L.

Сем. Амарантовые

**Биогруппа – Яровые
поздние**

Распространен повсеместно. Растет на полях в садах и огородах, обилен на плодородных почвах. Особенно вредоносен на пропашных. В борьбе хорошие результаты достигаются при послойной обработке почвы, проростки легко уничтожаются поверхностной обработкой, повсходовыми и почвенными гербицидами.





Щавель курчавый

Лат. *Rumex crispus* L.

Сем. Гречишные

**Биогруппа -
Стержнекорневые**

Распространен повсеместно, засоряет луга пастбища. Чаще встречается на умеренно увлажненных плодородных тяжелых по механическому составу почвах. Меры борьбы – глубокая подрезка корневой системы в начальные периоды роста сильно угнетают сорняк и вызывают его гибель.






Щавелек малый

Лат. *Rumex acetosella* L.

Сем. Гречишные

**Биогруппа –
Корнеотпрысковые**

Распространен повсеместно. Растет на полях, лугах, в садах и огородах. Предпочитает плодородные и увлажненные почвы. Специализированный сорняк многолетних трав. Меры борьбы – подкашивание до обсеменения, дискование в сочетании с глубокой вспашкой.





Щетинник сизый

Лат. *Setaria glauca* L.

Сем. Мятликовые

Биогруппа – Яровые поздние

Распространен повсеместно. Растет на полях в садах и огородах. Требователен к плодородию почвы, засухоустойчив. Засоряет посевы поздних культур, очень вредоносен на пропашных. Меры борьбы – заделка семян на большую глубину, тщательный уход за пропашными, применение противозлаковых гербицидов.





Ярутка полевая

Лат. *Thlaspi arvense* L.

Сем. Капустные

Биогруппа –
Зимующие

Широко распространен, засоряет все культуры, чаще встречается на увлажненных удобренных почвах. При соблюдении агротехнических приемов по уходу за растениями ярутка не является обременительным сорняком.

