СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ (1, 10, 16)

- №1. Переведите в восьмеричную систему счисления двоичное число 110110.
- №2. Переведите в шестнадцатеричную систему счисления двоичное число 101011.
- №3. Даны числа: 1, 3, 11 и 33. Укажите среди них число, двоичная запись которого содержит ровно 3 единицы.

Nº4. Укажите наименьшее четырёхзначное восьмеричное число, двоичная запись которого содержит 5 единиц. В ответе запишите только само восьмеричное число, основание системы счисления указывать не нужно. №5. Даны 4 целых числа, записанных в двоичной системе: 10001011; 10111000; 10011011; 10110100. Сколько среди них чисел, больших, чем $9A_{16}$?

№6. Дано A = $A7_{16}$, B = 251_8 . Найдите сумму A + B. Ответ укажите в двоичной системе.

№7. Сколько верных неравенств среди перечисленных:

$$10011010_{2} > 256_{10};$$

 $10011010_{2} > 9F_{16};$
 $10011010_{2} > 232_{8}.$

№1. Переведем число в десятичную систему счисления:

$$110110 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 =$$

 $32 + 16 + 4 + 2 = 54$.

№2. Переведем число в десятичную систему счисления:

$$101011 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 =$$

 $32 + 8 + 2 + 1 = 43$.

Десятичное число 43 в шестнадцатеричной системе счисления записывается как 2В.

Nº3. 11

№4. Наименьшее число из пяти единиц в двоичной системе счисления — 1111112. При переводе в восьмеричную систему счисления должно получаться четырёхзначное число. Для этого нужно, чтобы в двоичной системе счисления число состояло из четырёх триад то есть из двенадцати цифр. Наименьшее число, удовлетворяющее условию задачи: 001 $000\ 001\ 111_{2} = 1017_{8}$

```
№5. Запишем число 9A<sub>16</sub> в десятичной
системе счисления, а затем переведём
                                     двоичную:
его
9A_{16} = 9 \cdot 16 + 10 = 154_{10} = 10011010_2. Теперь сравним число 9A_{16} = 10011010_2 с
предложенными числами:
1000\ 1011 < 1001\ 1010,
1011\ 1000 > 1001\ 1010,
1001\ 1011 > 1001\ 1010,
1011\ 0100 > 1001\ 1010.
```

№6. Переведем числа в десятичную систему счисления, выполним сложение, и переведем сумму в двоичную систему счисления:

```
A7_{16} = 10 \cdot 16 + 7 = 167_{10}. 251_8^6 = 2 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8 + 1 = 169_{10}. 336_{10}^8 = 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^4 = 101010000_2. N^07. Переведем все числа в десятичную
систему счисления.
10011010_2 = 154_{10}, 9F_{16} = 9 \cdot 16 + 15 = 159_{10}, 232_8 = 2 \cdot 64 + 3 \cdot 8 + 2 = 154_{10}. Получившиеся неравенства: 154 > 256; 154 > 159; 154 > 154.
Ответ: 0.
```