

# Зоопарк

Підготував учень 5-Б класу

Гавришенко Дмитро

# Олень плямистий



# Олень плямистий

- Олень - досить великий звір. Довжина його тіла може становити від 100 до 150 сантиметрів, а маса - понад 100 кілограм. Плямистий олень відрізняється витонченим, граціозним статурою. Парнокопитна має яскраво-руде забарвлення у весняний період і сіро-буру взимку. Влітку на шерсті тварини (в області боків і спини) з'являються характерні світлі плями. У зимовий період вони менш помітні. Ця особливість є головною відмінною рисою плямистого оленя. Волосяний покрив тваринного грубий і досить ламкий. Шерсть на спині пофарбована в більш темний колір і нагадує смугу, яка потім переходить на хвіст. Шия парнокопитного - довга і граціозна, голова - пропорційна, вуха досить великі. Навколо хвоста також є біла плямочка, яке обмежене темною смугою.

# Сірий вовк



# Сірий вовк

- **Вовк, пес дикий** (*Canis lupus* L.) — хижий ссавець з роду пес (*Canis*) родини псових (Canidae), що добуває їжу самостійно активним пошуком та переслідуванням жертв. Повсюди основу харчування вовків складають копитні тварини: в тундрі — дикі та свійські північні олені; в лісовій зоні — лосі, сарни, дикі свині, свійські вівці, корови, коні; в степу та пустелі — антилопи різних видів та вівці; в горах — дикі та свійські кози. Також відомий як сірий вовк, сірко, або дикий собака або дикий пес.

# Ведмідь бурий



# Ведмідь бурий

- В історичні часи бурий ведмідь був звичайним звіром на всій території Європи, включаючи Великобританію та Ірландію, у північній Африці (Атлаські гори), в Азії його суцільний ареал покривав всю лісову зону (північ, Сибір), гірські масиви включно до Гімалаїв, північний Китай та Японію. В Північній Америці цей вид мешкав в західній частині континенту від Аляски до півночі Мексики.
- Зараз бурий ведмідь на частині історичного ареалу знищений, а в решті місць його чисельність дуже скоротилась. В Західній Європі ізолювані популяції існують у Піренеях, Кантабрійських горах, Альпах, Апеннінах. Є досить звичайним на Скандинавському півострові та в Фінляндії, в невеликій кількості зустрічається в Центральній Європі (переважно в гірських районах), на Балканському півострові та в азійській частині Туреччини. У Східній Європі та Сибіру ареал бурого ведмедя йде суцільною смугою від заходу Росії до Камчатки; окремі популяції існують в Центральній Азії, на Кавказі та Закавказзі, Близькому Сході, в Гімалаях та Тибеті, а також на островах Хокайдо та Хонсю в Японії.

# Лисиця





# Лисиця

- Звичайна лисиця розповсюджена вельми широко: в Європі на всій території, північній Африці (Єгипет та Алжир, Марокко, північній Туніс), більшій частині Азії (аж до північної Індії, південного Китаю та Індокитаю), в Північній Америці від арктичної зони до північного узбережжя Мексиканської затоки. В Австралії лисиця була акліматизована і розповсюдилась на всьому континенті, за винятком деяких північних районів з вологим субекваторіальним кліматом. В Україні лисиця руда зустрічається по всій території.
- Раніше вважалось, що в Америці живе окремий вид лисиць, але останнім часом його розглядають як підвид рудої лисиці.

Дякую за увагу

