

Заболевания, передающиеся половым путем

Выполнили ученицы 11 Б Суркова
Яна и Милена Гундорова

ИППП и ЗППП

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) — группа заболеваний, которые передаются от человека к человеку при сексуальном контакте.

Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), или инфекции, передаваемые половым путём (ИППП) — под этими терминами понимают инфекционные заболевания, наиболее частым путём заражения которых является половой контакт.

Они поражают не только половые органы, но и весь организм, и нередко приводят к серьезным последствиям.

Полный список ЗППП

- Сифилис.
- Гонорея.
- Трихомониаз.
- Хламидиоз.
- Микоплазмоз.
- Гарднереллез.
- Вирус папилломы человека.
- Генитальный герпес.
- Цитомегаловирус.
- ВИЧ.
- Гепатит.
- Кандидоз.

ВИЧ

Самое опасное заболевание, передающееся половым путем. ВИЧ дает о себе знать далеко не сразу — инкубационный период заболевания длится от 21 до 90 дней. Симптомы возникают только на стадии манифестации инфекционного процесса. Пациенты жалуются на воспаление лимфатических узлов, хроническую слабость, головные боли и потерю аппетита. Характерный признак ВИЧ — воспаление небных миндалин (ангина), которое не проходит длительное время. У больных повышается температура тела до 37-37,5 градусов, при этом нормализовать её с помощью жаропонижающих средств не удается. Отсутствие антиретровирусной терапии крайне негативно сказывается на состоянии больного. Организм атакуют всевозможные вирусные и бактериальные заболевания: пневмония, герпес, туберкулез, кандидоз. Как следствие развивается СПИД.

Передается при **передаче** биологических жидкостей, содержащих вирус иммунодефицита, от одного человека другому



Чтобы не заразиться ВИЧ

- Отказаться от половых контактов без презерватива, который нужно использовать постоянно, от начала и до конца полового акта.
- Для инъекции использовать только одноразовые шприцы, иглы.
- Отказаться от пирсинга, татуировок, маникюра, если в стерильности инструментов есть сомнения.
- Не пользоваться чужими лезвиями, бритвами, зубными щетками.



Вакцины, которая защитила бы от ВИЧ, - нет!

НО

Существует лечение, которое не дает вирусу развиваться и, таким образом, продлевает жизнь ВИЧ-позитивному человеку.



Чтобы сохранить свое здоровье на многие годы, необходимо вести разумный и здоровый образ жизни

При необходимости получить консультацию и пройти тест на ВИЧ, обращайтесь в учреждения здравоохранения по месту жительства, а также в Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом:
г.Донецк, ул. Олимпиаева, 1а.
т.(062)266-60-15
т. 071-416-09-14



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

**Все, что нужно
знать о ВИЧ**



Гепатиты В и С

К естественным путям передачи относятся следующие:

- половой – наиболее характерен для лиц с беспорядочными половыми связями
- контактно-бытовой – заражение происходит через загрязненные кровью бритвы, зубные щетки, маникюрные принадлежности, возможно при непосредственном соприкосновении раневых поверхностей.
- перинатальный (или «вертикальный») – при ВГС передача вируса от матери ребенку происходит редко (до 5%) и только при высокой концентрации вируса в крови матери. Передача вирусов обычно происходит во время родов и в послеродовом периоде.

Гепатит В ведет к желтухе и хроническим заболеваниям печени




Желтушная стадия гепатита В



Гонорея

Еще одна достаточно распространенная ИППП, особенно среди людей в возрасте от 15 до 24 лет. Как и хламидии, она может распространяться при оральном, вагинальном или анальном контакте. И так же, как и при хламидиозе, **большинство инфицированных женщин на первых стадиях не замечают никаких симптомов.** Однако **у мужчин гонорея проявляется практически сразу же.** Больных беспокоят **гнойные выделения из уретры, болезненное и частое мочеиспускание, дискомфорт в области анального отверстия.** При отсутствии своевременной терапии гонореи возникают осложнения. У женщин наблюдаются **кровянистые выделения после секса и режущая боль во время него, повышается температура тела и ухудшается общее состояние организма.** Гонорея на любой стадии требует быстрого и эффективного лечения.




Гонорея передается половым
путем или от матери к плоду



Сифилис


Вызывается бледной трепонемой, или спирохетой, имеет три стадии и может быть врожденным. Способен поражать **кожные покровы, слизистые, мягкие и костные ткани, ЦНС**. Легко передается не только при **половой связи**, но и **через кровь и бытовые контакты с личными вещами** инфицированного больного — носителя трепонемы. **Проявляется сыпью, язвами**, специфическими образованиями — шанкрами и гуммами. Вторичный и третичный сифилис может протекать в скрытой форме. При отсутствии лечения приводит к многочисленным проблемам **со здоровьем и психикой, а затем к смерти**.



Трихомониаз

В рассматриваемом заражение происходит при половом контакте. Однако трихомониаз передается и при бытовом контакте. К особенностям заболевания можно отнести: **инкубационный период может длиться до 28 дней. У мужчин происходит поражение уретры, у женщин: уретры и половых губ.** Довольно часто протекание болезней, развивающихся в рассматриваемом случае, проходит без проявления симптоматики. Однако у полового партнера могут они проявиться

Передается: половым путем, через кровь, у детей внутриутробно, редко бытовое инфицирование



Чесотка

Внедрение чесоточного клеща происходит при продолжительном контакте, в том числе во время, когда кожа больного соприкасается со здоровым эпидермисом. Основные проявления – **интенсивный зуд**, становящийся нестерпимым вечером и ночью, когда повышается активность возбудителя. Локализация **высыпаний** – **половые органы, поясничный отдел, ягодицы, грудь, стопы, внутренняя зона бёдер, подмышечные впадины**

Основным источником заражения, как правило, является больной человек и все связанные с ним контакты.

Чесотка передается путем прямого и непрямого заражения



Заподозрить ЗППП у мужчин можно по таким признакам:

- кровь в сперме;
- частые и болезненные позывы к мочеиспусканию;
- субфебрильное повышение температуры тела (не при всех болезнях);
- проблемы с нормальной эякуляцией;
- боль в мошонке;
- выделения из уретры (белые, гнойные, слизистые, с запахом);
- сыпь разного рода на головке члена, самом пенисе, вокруг него.

Симптомы венерических заболеваний у женщин

- боль и ощущение сухости во время секса;
- одиночное или групповое увеличение лимфатических узлов;
- дисменорея (нарушения нормального менструального цикла);
- боль и выделения из ануса;
- зуд в области промежности;
- раздражение ануса;
- сыпь на половых губах или вокруг ануса, рта, на теле;
- нетипичные выделения из влагалища (зеленые, пенистые, с запахом, с кровью);
- частые болезненные позывы к мочеиспусканию;

Самые распространенные осложнения заболеваний, спровоцированных ИППП:

- Уретрит.
- Цистит.
- Пиелонефрит.
- Простатит.
- Бартолинит.
- Эректильная дисфункция у мужчин.
- Импотенция.
- Нарушение менструального цикла у женщин.
- Вагинит.
- Эндометрит.
- Воспаление придатков матки.
- Обширная эрозия шейки матки.
- Рубцы, спайки в матке, трубах.
- Бесплодие.

Заболевание	Инкубационный период*	Симптомы	Лечение
Неспецифическая инфекция половых путей (включая вызываемые хламидобактериями)	14—21 день	Часто незначительные необычные выделения из влагалища или полное отсутствие каких-либо симптомов. Без лечения инфекция может распространиться на маточные трубы. Будьте особенно осторожны, если у вашего партнера неспецифический уретрит (вызываемый хламидобактериями)	Доктор возьмет тампоном содержимое влагалища на исследование (см. <i>Влагалищное исследование</i>). Лечение включает курс антибиотиков
Трихомонадный вагинит (кольпит)	Непостоянный	Зеленовато-желтые выделения из влагалища, обычно вызывающие вокруг него раздражение. Боль при половом сношении	Диагноз подтверждается исследованием выделений из влагалища (см. <i>Влагалищное исследование</i>). Лечение включает курс антибиотиков
Гонорея	2—10 дней	У женщин может протекать бессимптомно. Иногда вызывает необычные выделения из влагалища и уретры или болезненное мочеиспускание. Без лечения инфекция может распространиться на матку и маточные трубы, вызывая боль в низу живота.	Заболевание определяют по результатам анализа мазка выделений из влагалища (см. <i>Влагалищное исследование</i>). Лечение включает курс антибиотиков
Герпес половых органов	10 дней и меньше	Зуд в области половых органов с последующим возникновением мелких болезненных пузырьков. Иногда они появляются на бедрах и ягодицах. Пузырьки через сутки лопаются, оставляя после себя мелкие красные мокнувшие и болезненные язвочки, которые порой покрываются струпами. Обычно увеличиваются и становятся болезненными лимфатические паховые узлы. Это, как правило, сопровождается общим недомоганием и повышением температуры. Высыпания могут повторяться	Полноценного лечения этого заболевания пока нет, хотя каждое последующее высыпание становится все слабее. Доктор назначит вам противовирусный препарат в виде таблеток или мази для уменьшения боли и ускорения заживления язв. Старайтесь избегать половых контактов, пока есть пузырьки или язвочки, чтобы не заразить партнера
Сифилис	9—90 дней	На первой стадии этого очень заразного заболевания в области половых органов или внутри влагалища появляются безболезненные язвы (шанкры). Через несколько недель они сменяются сыпью без зуда по всему телу, включая ладони и стопы (вторая стадия болезни). Наблюдаются безболезненное увеличение лимфатических узлов и инфицированные, похожие на бородавки уплотнения вокруг анального отверстия и/или рта	Диагноз ставится по результатам анализов крови и отделяемого из язв. Обычно лечение включает двухнедельный курс инъекций антибиотиков. На протяжении двух лет после лечения вы должны регулярно сдавать кровь на анализ для исключения возможного рецидива заболевания
Лобковая вошь	0—17 дней	Сильный зуд в области лобка, особенно по ночам. Можно увидеть вошь: она коричневатая, длиной от 1 до 2 мм	Доктор назначит вам примочки или мазь, убивающую вошь и ее гниды. Параллельно доктор проверит, нет ли у вас другого венерического заболевания. Постельное и нижнее белье должно быть тщательно выстирано и проглажено

* Период между контактом с больным и появлением симптомов болезни

