

Жүктілікпен байланысты гипертензиясы Ерте токсикоздар

Лектор Сексенова А.Б.

Ерте токсикоздар

Ерте токсикоздар жүктіліктің алғашқы айларында пайда болады.

Патогенезі

- Қазіргі кезде көп теориялардың ішінде негізгілері:
- Нейрогенді теория.
- Иммунологиялық- аллергиялық теория.
- Адаптация (ортаға бейімделу) теориясы.

Нейрогенді теория.

жүктілік кезінде жатырдан орталық жүйке жүйесіне патологиялық толқындар келіп түседі, соның әсерінен жатыр мен орталық жүйке жүйесінің қарым – қатынасы бұзылып, мүшелер мен жүйкелердің қызметтері қалыптан тыс ауытқиды. Осындай өзгерістерден кейін токсикоз пайда болуы мүмкін.

• Иммунологиялық теория

Жүктілік кезінде ана- бала жолдасы-
ұрық жүйесі өзара қалыпты
иммунологиялық қарым – қатынаста
болады. Жүктіліктің дамуы
барысында осы қалыпты жағдай
көптеген сыртқы және ішкі
факторлардың әсерінен бұзылады.
Олар: сыртқы ортаның әсері, әйел
организміндегі өзгерістер, плацента
жүйесіндегі, ұрықтың өзіндегі
өзгерістер.

Иммунологиялық теория

Ана мен ұрықтың арасында иммунно-генетикалық сыйыспаушылық, яғни ана мен ұрықтың антигендердің құрылыштарының әртүрлі болуы. Ұлпалық антигендердің ана қанына өтіп, ана организмінің сезімталдығын күшейтеді, организмнің қарсы тұру қабылетін арттырып, токсикоздың пайда болуына себепкер болады.

Адаптация (бейімделу)

теориясы:

Жүктілік кезеңі әйел орагнізміне елеулі өзгерістер енгізеді, осыған байланысты бұл кезең организмге ең жоғарғы талаптар қояды.

Осы жаңа талаптарға сәйкес әйел организмінің бейімделуі физиологиялық не патологиялық салада болуы мүмкін.

Адаптация (бейімделу)

теориясы:

Жүктіліктің екінші жартысында гестоз кезінде, ана организмі жүктілік талаптарына бейімделу саласында үлкен патологиялық өзгерістерге ұшырайды. Бұл өзгеріске бірден – бір әсер ететін ана – ұрық және де плацента жүйесіндегі иммунологиялық өзгерістер мен нейрогуморалдық қарым – қатынастың бұзылуы алып келеді.

Адаптация (бейімделу) теориясы:

Жүктілік гипертензиясы кезінде бұқіл организмде қантамырларының түйілуі пайда болады. Бұқіл әйел организміндегі қантамырларының түйілуіне байланысты қан тамырларының барлық қасиеттері бұзылады, сөйтіп, оның физиологиялық күш – қуаты кеміп, қан айналымының өзгерісіне әкеліп соғады.

Адаптация (бейімделу) теориясы:

Аталған жоғарыдағы өзгерістер бүкіл организмдегі оттегінің азауына душар етеді, осының салдарынан мүшелерде, клеткаларда оттегі жетіспейді. Бұл жағдайлардың барлығы да әйелді жүктіліктің екінші жартысындағы жүктілікке байланысты гипертензиясына шалдығуына әсер етеді.

ЖҮКТІ ӘЙЕЛДІҢ ҚҰСУЫ.

Бұл науқас жүкті әйелдерде жиі кездеседі. Әйелдердің 80-85 % таңертеңгі мезгілде, жүректері айнитын, анда – санда құсатын болады, бірақ жалпы жағдайлары өзгермейді.

Женіл түрі

Женіл түрінде, құсық күніне 3-4 рет қана болады, көбіне тамақ ішкеннен кейін, тамақ ішу қабылеті сақталады, кейде ашы – тұщы тағамдарды сүйсеніп жейді, жалпы жағдайы өзгермейді.

Орташа түрінде

Әйелдің құсуы жиілене бастайды, тәулігіне 10-нан да астам болады, жүрегі айнып, тамақ ішүі нашарлайды, ал, ішсө жедел құсып тастайды, сөйтіп әлсіреп, жүдей бастайды. Сонымен бірге жүйке жүйесінде, зат алмасуында, көмірсугегінің алмасуында өзгеріс болып, кетоацидоз пайда болады. Дене қызуы көтеріліп, жүрек пен тамыр соғуы жиілейді. Уақытында дұрыс емделмесе, келесі ең ауыр түріне көшеді.

Күсудың ауыр түрі

Тоқтаусыз құсу деп аталады. Бұл түрінде құсудың жиілігі 20 реттен де асады, жүрегі айниды, бұған сілекей ағу қосылады. Ішкен тағаммен бірге сұйық затты да құсып тастайды, сонымен организм сузызданып, әлсізденіп, жүдейді. Кейде салмағы 8-10 кг-ға дейін кемитін болады.

Күсудың ауыр түрі

Организмде зат алмасуының ақырына дейін тотықтырылмаған қалдықтары көбейіп, қанның мочевинасы, қалдық азот және креатиннің мөлшері көбейеді, зәрде ацетон пайда болады, дене қызуы көтеріледі, тамыр соғысы жиілейді, 100-120 – ға дейін жетеді.

Күсудың ауыр түрі

Дем алғанда ауызынан ацетонның иісі келіп тұрады. Сонымен организм қатты уланып, әйел есінен танып-кома болуы мүмкін. Ауруды анықтау жолдары жоғарыдағы белгілерге байланысты.

Емдеу жолдары.

1. Жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіру.
2. Организмнің улануына қарсы- қажетті мөлшерде сұйық заттар құйылады.
3. Физиотерапиялық әдістерді де қолданады.

Сілекей ағу.

Бұл патология не жеке, не құсумен бірге кездеседі. Кейбір әйелден тәулігіне 1 литрден де көп сілекей ағады. Аузы, ерні көбірсіп, тілінеді, тәбеті төмендейді, әйел қатты жүдейді. Құсу кезінде қолданылатын емдерді бұл жағдайда да қолдану керек.

Жүкті әйел дерматоздары

Әйел денесінің әр жері, әсіресе сыртқы мүшелері, қолы, аяғы, кеудесінің терілері қышып, қасынғаннан қотырлар пайда болады. Кейде денеде эритема, не болмаса экземаға ұксас бөртулер шығады. Дене қышуы әйелдің мазасын алады, үйқысын бұзады.

Жүкті әйелдің сары ауруы.

Бұл патологияны, әсіресе басқа көп аурулардан (инфекциялық гепатит, өт аурулары, мerez, безгек және т.б.) ажыратып, анықтап алу қажет. Кейде бұл ауру жүктілікке байланысты құсумен, не болмаса жүктілікке байланысты гипертензиямен бірге кездеседі. Сондықтан жүкті әйелдің сарғаюы өте қауіпті белгі болып есептеледі, бұл жағдайда әйелді бірден перзентханаға жатқызу керек.

Остеомаляция -

Сүйектің жұмсаруы. Бұл патология фосфор – кальций алмасуының бұзылуы зардабынан пайда болады. Сүйектерде кальций, фосфор азайып, сүйек жұмсарады. Сүйектер тұлғасын өзгертіп, көк-еттер ариды. Әйелдің жүрісі өзгері, ақсандал, жүріс – тұрысы қынданайды, бірақ, бұл ауру сирек кездеседі. Қазіргі кезде оның жөнілдеу – остеопатия деген түрі жиі кездеседі.

ЖҮКТІЛІК ІСІНУІ

- Жүктілікке байланысты ісінудің үш дәрежесі бар:
- I дәрежесінде ісіну тек аяқтарда ғана болады;
- II дәрежесінде ісіну аяқпен қатар ішпердені қамтиды.
- III дәрежесінде ісіну бұкіл денені қамтиды.

ЖҮКТІЛІК ІСІНУІ

- Жүктілік ісінудегі зәрде белок болмайды, қан қысымы физиологиялық сынаптан аспайды.
- Жүктіліктің екінші жартысында жасырын ісінудің де болуы ықтимал. Оны анықтау жолдары: жұма сайын жүкті әйелдің салмағын өлшеу (аптасына 350-400 граммнан артық салмақ қосылуға тиіс емес), зәрдің тәуліктік мөлшерін білу, сақина, Мак-Клюр – Олдрич сынамаларын жүргізу.

Мак –Клюр – Олдрич сынамасы

– 0,2 мл физиологиялық ертіндіні шприцпен білезік сұйектің аймағында тері ішіне жібереді. Бұл жерде құлдіреу пайдалады. Егер қан тамырларының гидрофильділік қасиеті өзгермеген болса, «құлдіреу» 40-45 минут шамасына сорылышпен жоқ болады.

Жүктілік гипертензиясы.

Ол жүктілік кезінде дамитын көпмүшелі және көпжүйелі функционалды жетіспеушілік синдромы. Ана құрсағында дамып жатқан нәресте мен жүкті әйелдің организмде бейімделу мүмкіншілігінің сай келмеуі, ол айқындылығы әртүрлі дәрежедегі плацентаның перфузиялық – диффузиялық жетіспеушілігімен сипатталады.

Жүктілік гипертензиясы.

- Жүктілікке байланысты гипертензия жүктіліктің ең ауыр және де жиі кездесетін асқынуларының бірі.
- **Кездесу жиілігі:** БҰД мәліметі бойынша 0,51 % дан 38,4 % дейінгі аралықта кездеседі.
- ТМД елдерінің арасында 6,9 % -14 %.

Преэклампсияның жеңіл дәрежесі

- Артериалық қан қысымы 140/90 мм с.б.б. тең немесе одан жоғары, бірақ 160 /110 мм с.б.б. төмен, екі рет қатарынан өлшегендे (екінші рет 6 сағат дем алғаннан кейін). Немесе бастапқы қан қысымымен салыстырғанда систолалық қан қысымының 30 мм с.б.б., ал, диастолалық қан қысымы 15 мм с.б.б. аздал көтерілген (бастапқы қан қысымы деп жүктіліктің 16 аптасына дейін өлшенген қан қысымы), қол мен беттерінде ісінулер жоқ, тәуліктік протеинурия 0,3 граммнан аз.

Преэклампсияның орташа дәрежесі

- Артериялық қан қысымы 140/90 мм с.б.б. тең немесе одан жоғары, бірақ 160 /110 мм с.б.б. төмен, 6 сағат дем алғаннан кейіннен өлшенген. Бастапқы қан қысымымен салыстырғанда систолалық қан қысымы 30 мм с.б.б., ал, диастолалық қан қысымы 15 мм с.б.б. аздап көтерілген (бастапқы қан қысымы деп жүктіліктің 16 аптасына дейін өлшенген қан қысымы). Тәуліктіктік протеинурия 0,3 г.көп, 5 г. дейін. Беті мен қолында ісінулер болуы мүмкін.

Преэклампсияның ауыр дәрежесі

Артериялық қан қысымы 160/ 100 мм с.б.б. жоғары немесе тең, 6 сағат дем алғаннан кейін өлшенген. Немесе бастапқы қан қысымымен салыстырғанда систолалық қан қысымының 30 мм с.б.б., ал, диастолалық қан қысымы 15 мм с.б.б. аздал көтерілген (бастапқы қан қысымы деп жүктіліктің 16 аптасына дейін өлшенген қан қысымы). Протеинурия 5 г./тәулігіне көп. Беті мен қолында ісінулер болуы мүмкін.

Эклампсия

- Талма ұстамаларының болуы, тонико-клоникалық ұстамалар, преэклампсиямен ассоциацияланған.

Протеинурия

- **критерийлеріне жатады:**
- кездейсоқ зэр сынамасы кезінде белоктың концентрациясының 0,33 г/л көбірек болуы, ол кезде зәрі PH 8-ден кем және салыстырмалы тығыздығы 1030 кем екендігі анықталуы;
- катетер арқылы алынған екі порциялы зэрде белок деңгейі 1 г/л;
- 24 сағатты сынамада зәрдегі белок концентрациясы 0,3 г/л немесе жалпы қан анализінде 0,033 г/л жоғары.

Гипертензияның ерте белгілері

- Гипертензияның ерте белгілерін жүктіліктің ерте мерзімінде анықтау қажет:
- Эндогенді гепаринді анықтау;
- антитробин III анықтау;
- α₂макроглобулинді анықтау;
- простациклин/тромбаксан қарым – қатынасын анықтау.

Гипертензия

- Гипертензияның ерте белгілері:
- 6 сағаттан кейін қайтадан өлшенген кезде эпизодтық анықталмайтын және систолалық қан қысымы 140/ 150 мм с. б.б. дейін, диастолалық қан қысымы 90 мм с.б.б. дейін немесе бастапқыдан 30 % дейін көтерілуі.
- Фибриноген, тромботест жоғары көрсеткіштері.

Реологиялық қасиет

- Қанның реологиялық қасиетінің өзгеруі:
- Гемостаздың қантамыр – тромбоцитарлық звеносындағы өзгерістер.
 - – тромбоциттердің агрегациялық белсенділігі жоғарылайды;
 - тромбоциттердің қантамыр ішілік белсенді түрге көшуі;
 - шеткі қанда гемоглобиннің жүктіліктің II жартысында 140 г/л жоғарлауы.

Эклампсия

- Жиілігі
- Жүктілік кезінде-50%,
- Босануда-25%,
- Босанғаннан кейін-25%
- Ана өлімі-13,9%

Эклампсия

- Эйел өлімінің себептері:
- Миға қан құылу
- Ауыр тыныс, жүрек жетіспеушілігі
- Босанудан кейінгі қан ағулар
- Тамыр ішілік коагулопатия
- ЖБЖ
- ҚОПМБ

Патогенетикалық терапия

- Емдеу-қорғау кестесін сақтау;
- Гиповолемия және метаболикалық бұзылыстарды реттеу;
- Реологиялық, коагуляциялық бұзылыстарды реттеу;
- Шеткі вазоконстрикцияны жою

Патогенетикалық терапия

- Капилярлық өткізгіштікті реттеу;
- Гипоксиямен күрес;
- Құрсақ ішілік нәрестенің жағдайын жақсартатын шараларды пайдалану.

Базистік терапия

*Базистік
парентералдық терапия-
қанның реологиялық
қасиетін 400 мл реформтан
еңгізіп реттеу*

Базистік терапия

*Базистік
терапияның фонында,
магнезиялдық терапия АҚ
140/90 мм.с.б. жоғары
болғанда жүргізіледі.*

Магнезиялдық терапия

Старттық доза (қанығу дозасы)

30 мл.5%-R-L 20 мл 25 % MgSO₄
(4,5 г құрғақ зат)

50 мл- 1 минутта 44-50 тамшы- 20
минутта ішінде еңгізіледі.

Магнезиялдық терапия

Ұстап тұрушы дозасы

1г құрғақ затты 1 сағ- 3 сағ. дейін.

400 мл 5%-R-L 80 мл 25 % MgSO₄
(г құрғақ зат)

Акушерлік тактика

Ем нәтижелі болса жүктілік сақталады.
Магнезиялық терапиядан кейін, емнің
нәтижесі толық болмаса,
преэклампсияның симптомдары
сақталса, немесе ұлғайса онда жүктілік
үзіледі, мерзіміне байланыссыз.
36 аптадан кейін әйел босандырылады.

Акушерлік тактика

Егер жүргізілген терапия нәтижесіз болса, преэклампсияның симптомдары өршісе, жүктіліктің аптасына және нәрестенің өкпесінің жетілінуіне байланыссыз, жүктілік үзіледі. Нәрестенің өкпесінің жетілдіру мақсатында 34 аптаға дейін 24 мг дексаметазон беріледі 2 тәулік ішінде.

**Көңіл қойып
тыңдағандарыңызға рахмет!**

