

Основы здорового образа жизни

Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем.
Меры их профилактики.

1 учебный вопрос. Ранние половые связи и их последствия.



РАДИ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

- КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЛЮБВИ И БЛИЗОСТИ
- РАДИ ЛЮБОПЫТСТВА
- РАДИ ЧУВСТВА ВЛАСТИ И СИЛЫ
- РАДИ ПОПУЛЯРНОСТИ И ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ТЕБЯ ЛЮБЯТ
- ДЛЯ ОТДЫХА И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
- РАДИ ДЕНЕГ



2 учебный вопрос.

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики.



ИПП

Венерические заболевания —
заболевания, объединенные по принципу передачи через сексуальный контакт. Более правильным термином является **заболевания (варианты: инфекции, болезни), передающиеся половым путем** (сокращенно — ЗПП, БПП или ИПП).

Классификация ИПП

- Венерические заболевания, или классические – **сифилис, гонорея**
- «Новые» венерические болезни (инфекции мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов) – **генитальный герпес, трихомоноз, хламидиоз, уреаплазмоз**
- Болезни кожи, передающиеся половым путём – **чесотка, педикулёз, лобковые вши**
- Болезни, передаваемые половым путем, с преимущественным поражением других органов – **ВИЧ, вирусные гепатиты В и С**

Пути передачи ИППП

- 1. Половой путь передачи:** любые виды секса
- 2. Контактно – бытовой путь:** поцелуи, тесные объятия, общее пользование зубной щеткой, бритвой, полотенцем, купание в бассейне, нестерилизованный медицинский инструмент
- 3. Внутриутробный путь:** при родах, через плаценту во время беременности
- 4. Парентеральный путь:** попадание инфекции в кровь и на слизистые (внутривенное введение наркотиков, нестерильное переливание крови)
- 5. Другие пути:** через слону, мочу, выделения из половых органов, грудное молоко

Сифилис

(устар. ЛЮЭС) - хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum* (бледная трепонема) подвида *pallidum*, относящимся к роду трепонема (*Treponema*) семейства *Spirochaetaceae*

Бледная трепонема



pynet.su



Пути передачи сифилиса


Сифилис передаётся:

- половым путём;
- через кровь (шприц наркомана, переливание крови);
- в быту при использовании общим «кровавым» инструментом типа зубных щёток или бритв.

Симптомы

- появление в месте внедрения трепонемы твердого шанкра, безболезненной язвы на плотном основании;
- недомогание, схожее с признаками простуды, возникает характерная сыпь («ожерелье Венеры»);
- (через 2-3 месяца) возникают паралич, поражения головного мозга.



Проявления на теле человека



Гонорея

Гоноре́я — инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком — гонококком лат. *Neisseria gonorrhoeae*, передаваемая половым путём и характеризующаяся слизистых оболочек мочеполовых органов. Относится к венерическим заболеваниям.

Гонококк



Пути передачи гонореи

- половым путем;
- реже - внеполовым (у детей), через загрязненное белье, губки полотенца.

Стадии болезни и симптомы

Заболевание проявляется через 3-7 суток после заражения; протекает остро или хронически. Острая гонорея характеризуется выделением слизи, гноя, ощущением щекотания, жжения и боли в терминальном отделе уретрального канала, частыми позывами к мочеиспусканию, очень болезненному.

Проявления гонореи




Генитальный герпес

Возбудитель герпетической инфекции половых путей вирус простого герпеса (*Herpes simplex virus HSV*).

Различают два вида вируса простого герпеса:
HSV-1 обычно вызывает поражения полости рта
HSV-2 вызывает поражения половых органов
(генитальный герпес)

Вирус герпеса



Пути передачи генитального герпеса

- при половом контакте и при поцелуе;
- во время родов, когда заражение новорожденных происходит от инфицированной матери;
- во время прямого контакта с выделениями больных через различные предметы.


Симптомы генитального герпеса

- обнаруживаются через 3-7 дней после контакта;
- появляется воспаление, вслед за ним образуются пузырьки, затем формируется корочка;

У мужчин герпетические поражения половых органов обычно развиваются на половом члене и внутренней поверхности крайней плоти.

Процесс часто сопровождается местными болями, лихорадкой, уплотнением паховых лимфатических узлов. Обострению заболевания могут предшествовать покалывание или ощущение жжения.

Проявления генитального герпеса



Herpes lesion:
Found on shaft of penis (male),
vagina, vulva, cervix (female),
and around anus

Хламидиоз

Хламидиоз — инфекционное **заболевание,**
передающееся половым путём, вызываемое
хламидиями (*Chlamydia trachomatis*).

Хламидия



Пути передачи хламидиоза

- половым путём;
- при прохождении плода через родовые пути матери, больной хламидиозом;
- контактно-бытовой путь передачи (установлено сохранение инфекционности хламидий на бытовых предметах, в том числе на хлопчатобумажных тканях, до 2-х суток при температуре 18-19 градусов).

Симптомы и стадии болезни

- Инкубационный период — от 2-х недель до 1 месяца
- *Хламидиоз очень часто протекает бессимптомно, либо с минимальными проявлениями.* Абсолютно без симптомов хламидиоз протекает у 46 % мужчин и 67 % женщин. Если же симптомы присутствуют, то выражены они не ярко.

Проявления хламидиоза

balanitispictures.com



Профилактика ИПП

- Существует несколько **простых правил и советов**, как снизить риск и даже избежать риска заражения половыми инфекциями, о которых нужно подумать **ДО** полового акта:
- Воздержаться от «случайных» связей. Никто не даст гарантии, что даже самые «приличные» мужчины и женщины – здоровы. Ни внешний вид человека, ни уровень его образования, ни социальный статус и семейное положение – **НИЧТО** не может говорить о наличии или отсутствии у него венерических заболеваний. При этом сам человек может быть полностью уверен, что здоров, и абсолютно не подозревать о том, что болен. Большинство же венерических болезней часто протекают бессимптомно.
- Самые опасные виды секса – это вагинальный или анальный половой контакт без презерватива.
- Использовать презерватив. Презерватив – классическое средство профилактики ЗПП. Однако эффективность презерватива как средства профилактики венерических инфекций – не 100%. Совсем не редкость случаи соскальзывания презерватива. Поэтому перед использованием обязательно прочтите инструкцию.

Меры профилактики ИПП

- 1. Выбор постоянного, здорового полового партнера.
- 2. Правильное использование презерватива.



Задание: Заполнить таблицу

	Сифилис	Генитальный герпес	Гонорея	Хламидиоз
Возбудитель				
Пути передачи				
Симптомы				