

Болезни передаваемые ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



БППП

- Известно более 20 возбудителей болезни, передающихся половым путем : бактерии вирусы простейшие дрожжевые грибы членистоногие
- К ЗППП относятся 22 болезни трех групп : классические венерические заболевания (сифилис, гонорея) болезни мочеполовой системы (мочеполовой хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, генитальный герпес, лобковый педикулез (вшивость, чесотка) болезни передающиеся преимущественно половым путем (СПИД, гепатит, лямблиоз, сепсис новорожденных)

Сифилис

Гонорея

Хламидиоз

**Основные заболевания,
передаваемые половым путём**

Генитальный герпес

Трихомоноз и др.

Пути передачи болезней передаваемых половым путем

- Половой путь
- Контактно-бытовой путь
- Внутриутробный путь
- Парентеральный путь
- Другие пути



Сифилис


- Сифилис (устар. ЛЮЭС) - хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum* (бледная трепонема) подвида *pallidum* , относящимся к роду трепонема (*Treponema*) семейства *Spirochaetaceae*

Сифилис

- Сифилис передаётся в основном половым путём. Однако возможна передача сифилиса и через кровь.
- Сифилис - это тяжелое заболевание с поражением почти всех внутренних органов, центральной нервной системы, костей и специфическими изменениями кожи и слизистых оболочек.
- Микроорганизм чувствителен в различным воздействиям и быстро погибает от тепла, холода, мыла, дезинфекции и при высушивании.

Сифилис

- поражается: нервная ткань спинного мозга, теряется чувствительность ног, поражаются зубы, проваливается нос. Хронический сифилис, поздние стадии его развития имеют тяжелейшие осложнения и последствия, вплоть до летального исхода



Сифилис


- В случае подозрения на заболевание немедленно обратиться в лечебное учреждение.
- Иммунитет после сифилиса не вырабатывается.
- Сифилис передается по наследству.
- На ранней стадии сифилис лечится , но процедура эта очень болезненна и стоит достаточно дорого.
- Предотвратить заболевание сифилисом невозможно, вакцины против него не существует.
- Сифилис родителей опасен для потомства – дети имеют специфическое поражение

Гонорея

- Гонорéя— инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком — гонококком лат. *Neisseria gonorrhoeae*, передаваемая половым путём и характеризующаяся поражением слизистых оболочек мочеполовых органов. Относится к венерическим заболеваниям


Гонорея

- При данной болезни поражаются органы мочеполовой системы, прямая кишка, глаза. При длительном течении гонореи инфекция распространяется на дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную системы. В тяжелых случаях возможно поражение суставов и заражение крови (сепсис).



ВИЧ и СПИД

- ВИЧ- Вирус иммунодефицита человека
- СПИД- Синдром приобретенного иммуно дефицита
- СПИД – это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)



Пути передачи ВИЧ и СПИД

- Половым путем
- Внутриутробный путь
- Парентеральный путь
- ВИЧ поражает разные клетки тела человека, но в первую очередь – клетки иммунной системы – Т-лимфоциты
- выявить болезнь очень сложно. Она долгое время может себя не проявлять, а обнаружить ее можно только в лабораторных.
- Лекарства от СПИДа НЕТ!

Стадии заражения ВИЧ и СПИД

- 1. Инкубационный период
- 2. Продромальный период — стадия первичного инфицирования, до 1 месяца.
- 3. Латентный период — 5-10 лет, единственное проявление — стойкое увеличение лимфатических узлов
- 4. ПреСПИД — продолжительность 1-2 года — начало угнетения клеточного иммунитета.
- 5. Терминальная стадия — СПИД — 1-2 года.
- Единственный способ борьбы со СПИДом — профилактика

Профилактика болезней передаваемых половым путем

- Профилактика ЗППП – это комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья, предотвращение развития возможного заболевания и восстановление здоровья.
- Самый надежный способ уберечься от БППП - это полное воздержание от беспорядочных половых связей. Чтобы предотвратить заражение при контакте сексуальных партнеров необходимо пользоваться средствами контрацепции и соблюдать правила личной гигиены.

Лечение БППП

- Лечение БППП может включать следующие виды терапии:
- витаминотерапию;
- антибактериальную;
- противовирусную;
- иммуностимулирующую;
- физиотерапию.
- Схема лечения ЗППП подбирается индивидуально. Сегодня существует свыше трех десятков возбудителей ЗППП. С каждым годом они вырабатывают иммунитет к определенным видам антибиотиков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТ.122 УК РФ.)

- Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекции наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо арестом на срок от 3 до 6 мес, либо лишением свободы до 1 года
- Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок 5 лет.

Спасибо за внимание
