
**Болезни,
передаваемые
половым путём.**



Венерические болезни (от *Венера* – богиня любви и красоты в римской мифологии) – это группа инфекционных болезней, возбудители которых передаются преимущественно половым путём.



В настоящее время насчитывается более 20 БППП. За последние годы количество заболеваний, передаваемых половым путём, увеличилось в несколько раз.

Одна из главных причин – это более свободный взгляд на секс и сексуальные отношения молодых людей.



Чем опасны БППП?

- поражением внутренних органов
- параличом и нарушением психики
- бесплодием
- рождением больных детей
- распадом семьи

Статистика за последние годы:



- Заболеваемость сифилисом возросла в 40 раз.
- Число случаев врождённого сифилиса возросло в 20 раз.
- БППП помолодели и ими начинают болеть с 14-16 лет.
- Наиболее часты эти заболевания у лиц в возрасте 20-21 года, на втором месте – 15-19-летние.



Сифилис считается самой страшной венерической болезнью. Возбудитель – бледная трепонема попадает в кровь не только половым путём, но и через порезы, ссадины, даже поцелуи, курение с больным одной сигареты, пользование предметами домашнего обихода (зубная щётка, ложка). Признаки заболевания проявляются через 3-4 недели после контакта.

Гонорея венерическое заболевание, вызываемое ***гонококком***.

Инкубационный период в среднем составляет 3-6 дней.

Признаки заболевания: боль и резь во время мочеиспускания, обильные гнойные выделения из мочеиспускательного канала, воспаление, частые позывы к мочеиспусканию.

Если заболевание не лечить, то возбудителем поражаются суставы, сердце, мозг.





Генитальный герпес – язвенное поражение половых органов, возбудителем которого является вирус простого герпеса (заболевание, характерное пузырьковыми высыпаниями на коже). Передаётся половым путём и вызывает болячки и язвы на половых органах и вокруг них.

Хламидиоз – болезнь, возбудителем которой является микроорганизм, называемый *хламидией* (паразитирует в половых и мочевыделительных органах). Симптомы проявляются через 1-4 недели. У мужчин они такие, как и при гонорее. У женщин часто протекает незаметно.

СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита. Это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и передающаяся при половом контакте и с кровью.



Пути передачи:

- При половом сношении
- При переливании крови и её компонентов
- При использовании медицинского инструмента, загрязненного кровью с возбудителем
- При внутривенных инъекциях нестерильными
- Шприцами среди наркоманов



В настоящее время ВИЧ лечится при помощи антиретровирусной терапии, которая не дает развиваться СПИДу, продлевает жизнь инфицированных. Но вирус способен вырабатывать устойчивость к препаратам, особенно если пациент нарушает режим приема лекарств и не находится под регулярным наблюдением врачей.



Общие правила профилактики:

- Воздержание от случайных половых контактов
- Взаимная верность молодых людей
- Использование средств предохранения
- В случае подозрения на заражение
- Обращаться в лечебное учреждение

**Спасибо за
внимание!**

