

Тақырыбы: Ұшқыш ингалянттарға тәуелділік.

Орындаған: Ертай Динара

Қабылдаған: Маденбай Камшат.

Тобы: ЖМ-302Т

Түркістан 2018



ЖОСПАРЫ

- ❑ Кіріспе
- ❑ Негізгі бөлім
 - ❑ Ұшқыш ароматты заттар. Түрлері.
 - ❑ Клиникалық көріністері.
 - ❑ Диагностика және емі
- ❑ Қорытынды
- ❑ Пайдаланылған әдебиеттер



ЗЕРТТЕУ СҰРАҒЫ:

Ұшқыш ингаляттардың ең жиі тудыратын ағзаға кері әсерлері қандай

Зерттеу мақсаты :

Ұшқыш ингаляттардың адам ағзасына кері әсерлерін терең зерттеп мәлімет қалыптастыру.



Мастану мақсатында дем алу үшін қолданылатын ингалянттар, яғни ұшқыш заттар деп аталады. Балалар мен жасөспірімдер арасында кең таралған. 12-15 жас аралығында.

ХАЖ бойынша коды:

F 18 ұшқыш заттарды қолданғаннан дамидын санасезім және қимыл әрекет бұзылысы

F 18.0 жедел интоксикация

F 18.1 шектен тыс қолдану

F 18.2 тәуелділік синдромы

F 18.3 абстинентті жағдай

F 18.4 абстинентті жағдай делириямен

F 18.5 психикалық бұзылыс

F 18.6 амнестикалық синдром



Ингаляционные наркотические вещества



Конопля, также называют «марихуана», «анаша», «план», «гашиш» «хэш».



Летучие ингалянты

Ұшқыш ароматты заттар арзан, әртүрлі формада шығарылады, арнайы тіркеу жоқ, қолданылуы оңай, тез мастану дамиды, қысқа уақытты, қолдану белгілері тез жойылады

Түрлері: бензин маркалары, лак, бояу еріткіштері, ксилол, толуол, ацетол, дақкетіргіштер, синтетикалық желімдер (момент, суперклей), ауа тазартқыштар, дезодоранттар, лак өшіргіштер, газдар.

- ◎ Қауіпті қолдану әдісі «метод мешка» басына целлофан пакет киіп иіскеу





ҰШҚЫШ ЕРІТКІШТЕРМЕН УЛАНУ КЕЗІНДЕГІ КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ

- 1. Масаю сезімі пайда болады; бас ішіндегі жанға жайлы шуыл, алда болатын әсерлерге дәмеленумен көңіл-күйдің көтерілуі, денедегі жағымды жылу сезімі, аяқ-қолдардың босаңсуы. Бұл фазада наркоманды ояту қиынға соқпайды. Сана тарылған, бар ой-санасы күйзелістеріне жинақталған.
- 2. Қайталап дем алу кезінде дамиды. Кеңпейілділік, көңілділік, бейғамдылық сезімімен бірге жүреді. Көпшілігі күле бастайды, ән салады. Сана ашықтығы жоғалады, шынайы қоршаған орта иллюзорлы қабылданады. Заттар өздерінің қалыбын, кеңістіктегі арақашықтығын өзгертеді, түстер ашық, қаныққан болып көрінеді. Дыбыстар бұрмаланып, ерекшеленеді. Проприорецепция бұзылады – дене жеңіл тәрізденіп, оның бөлшектері ұлғайғандай немесе қысқарғандай болады.

Қозғалысқа қажеттілік сақталады, бірақ координация бұзылған, мастанғандар құлайды, тепе-теңдікті жоғалтады, бірін-бірі кекетеді, олар үшін барлығы өте қызықты болып көрінеді. Алаңғасарлық пайда болады. Агрессия жағдайлары сирек. Қимылдары әлсіз координирленген, сөздері түсініксіз.

3. Бірнеше рет қолданған адамдарда ҰЕ дозасын көтерген кезде пайда болады. Галлюцинаторлы көру бейнелерінің ағыны пайда болады. Галлюцинациялар ашық, қозғалмалы, жиі майда өлшемді, сырттан, экрандағы тәрізді көрінеді. Оларды ең басында күшейтуге немесе тоқтатуға болады. Ары қарай олар "мультиктер көрсеткен" тәрізді өздігімен қозғалады. Алдамшы естулер жиі акоазмдар түрінде пайда болады; шуыл, қоңыраулар үні, гуілдеу.




Дыбыстардың табиғи қабылдануының өзгерісі, олардың түсініксіз сипаты бақыланады. Өзін және өз денесін қабылдау бұзылады. Мастану жағдайындағылар "ішкі көзқарасымен" ішкі жақтан өз денелерін көреді. Психосенсорлы бұзылыстар әрқилы. Қабырғалар қозғалғандай, бөлменің төбесі құлап бара жатқандай, еден түсіп кеткендей езім пайда болады, кейде тек ұшу емес, құлап бара жатқандай сезім де басынан өтеді. Сананың онейроидты бұзылуы кезіндегідей ғарышта, фантастикалық әлемдерде орын алмастырғандай сезім пайда болуы мүмкін.



Наркомания и токсикомания:

Наркомания и токсикомания



Летучие наркотически действующие вещества



Бензин

Клей
«Момент»



Ацетон



Ұшқыш ингаляттардың жедел берілетін әсері:	Ұшқыш ингаляттрдың ұзартылған әсері :
Эйфория	Ұзақ уақыт және үнемі қабылдағанда мұрыннан қан кетуге соқтырады
Релакцация	Бауыр қызметін бұзады
Координация бұзылыстары	Буйрек функциясын төмендетеді
Сөйлеу бұзылысары	Журе қызметіне кері әсер етеді
ұйқышылдық	Кейбір басқа турлері ОЖЖ-нің функциясын басендетеді.
Жалпы әлсіздік	

ҰШҚЫШ ЕРІТКІШТЕРДІ ШЕКТЕН ТЫС ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕГІ АБСТИНЕНТТІ СИНДРОМНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ.

- Абстинентті синдром ҰЕ жүйелі қолданудың 3-6 айларында түзіледі.
- **Бірінші фазада** Ажыраудың бірінші тәулігінің соңына қарай ызалы тітіркену, жабырқаулы көңіл күй фонында, қатты бас ауыруы, қарашықтардың кеңеюі, нистагм, гипергидроз, қол саусақтарының, қабақтың, тілдің треморы, сіңірлік рефлексстердің жоғарылауы, жеке бұлшықеттерінің тырысулы жыбырлаулары пайда болады. Психомоторлы қозу үдейді.



- **Екінші фазада** Екінші тәулікте үрейлік, тұйықтық, күдікшілдік, дисфория дамиды. Тахикардия, артериялық гипертензия, ірі бұлшықеттердегі ауру сезімі мен дененің әр жеріндегі жағымсыз сезімдер. Психомоторлы қозу мұңды аффектпен және қозғалыстық белсенділіктің құлдырауымен ауысады.




- **Үшінші фаза.** ҰЕ-ң жоғары улылығы деменцияға дейін жететін интеллектуальды-мнестикалық сфераның айқын бұзылыстары және диэнцефальды және пирамидалық симптоматикамен ОЖЖ-нің диффузды зақымдалуымен көрінетін токсикалық энцефалопатияның жедел дамуына алып келеді. Жиі токсикалық гепатит, нефрит, иммунитеттің айқын төмендеуі байқалады.



КАМЕЛЕТ ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҰШҚЫШ НАРКОТИКАЛЫҚ ӘСЕРІ БАР ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУЫНЫҢ ПСИХОПАТОЛОГИЯЛЫҚ САЛДАРЫ

- Ұшқыш наркотикалық әсері бар заттарды қлдану (ҰНӘЗ) 12 жаста шырқау шынына жететін белгілі бір жас кезеңіне тән және 14 жастан кейін басталады.
- ҰНӘЗ қолдану нәтижесіндегі токсикоманиялық клиникалық көріністерінің психопатологиялық белгілерінің динамикаы барлық наркологиялық ауруларға тән заңдылықтарға сәйкес — өзгерген реактивтілік синдромның, психо ж/е физ тәуелділіктің түзілуі





Емі

1. Дезинтоксикація
Антидот (натрий тиосульфат 10мл т\і),
2. Седативті препарат,
3. Нейролептик, антидепрессант (амитриптилин),
Ноотроптар (пирацетам)
4. Вітаміндер



ҚОРЫТЫНДЫ

Салауатты өмір салтын ұстану дені сау ұрпақ, қоғам, мемлекет негізі. Ал никотинге тәуелділік, ұшқыш заттармен әуестену ол дұрыс қоғам мемлекеттің әлсіз жері. Бұл аурулардан айығу, болдырмау, алдын алуға үлес қосу әр азаматтың міндеті. Ең болмағанда өз ортаңыз, өз отбасыңыз, өз жақындарыңызды қорғау толық отбасында өмір сүруіңіздің кепілі!!!!!!!!!!!!



ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

- ◎ Субханбердина А.С “Наркология” Алматы 2014
- ◎ Иванца Н.Н, Анохиной И.П “Национальное руководство” 2008
- ◎ Интернет желісі:

https://www.google.kz/search?biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=YI6EWtiJCcOtswHf47LgDg&q=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9&oq=rktq&gs_l=psy-ab.1.3.0i13k1110.121482.124319.0.126583.9.6.1.0.0.0.254.940.2-4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.5.950...0j0i10i1i42k1j0i10i30k1j0i10i1i24k1j0i10i1k1j0i10k1.0._vfouQgVZTU#imgsrc=5KDADgTrPHwdOM:



КЕРІ БАЙЛАНЫС СҰРАҒЫ

- **Ұшқыш еріткіштермен улану кезіндегі клиникалық көріністері қандай болады**
- **Ұшқыш еріткіштерді шектен тыс қолдану кезіндегі абстинентті синдромның 2 фазасында қандай клиникалық көріністер болады**

