

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»
(ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)
Алатырский филиал
Факультет управления и экономики
Кафедра гуманитарных и экономических дисциплин

Презентация

на тему «Наркомания и ее вред»

Выполнил студент 1 курса

заочной формы обучения

группы АФТ 05-16

Ершова Олеся Михайловна

ОЧНО-

ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ?

Наркомания – тяжелое хроническое заболевание, при котором наблюдается стойкая психологическая и физическая зависимость от наркотических веществ.



ВИДЫ

ОПИАТЫ

КОКАИН

КОНОПЛЯ

АМФЕТОМИН

ЭКСТАЗИ

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ

СНОТВОРНЫЕ

ИНГАЛЯНТЫ

ЭФФЕКТЫ

```
graph TD; A[ЭФФЕКТЫ] --> B[Стимуляторы]; A --> C[Психодизлептики]; A --> D[Седатики]; B --> E["Это возбуждающие нервную систему средства, к ним относятся: перветин («винт»), кофеин, никотин, кокаин, амфетамин"]; C --> F["Это препараты вызывающие галлюцинации и ощущения, к ним относятся: ЛСД, гашиш"]; D --> G["Это успокаивающие препараты, к которым относятся: транквилизаторы и вещества из группы опиатов — морфий, героин"];
```

Стимуляторы

Это возбуждающие нервную систему средства, к ним относятся: перветин («винт»), кофеин, никотин, кокаин, амфетамин

Психодизлептики

Это препараты вызывающие галлюцинации и ощущения, к ним относятся: ЛСД, гашиш

Седатики

Это успокаивающие препараты, к которым относятся: транквилизаторы и вещества из группы опиатов — морфий, героин

```
graph TD; A[ПРИЧИНЫ] --> B[ФИЗИЧЕСКИЕ]; A --> C[СОЦИАЛЬНЫЕ]; A --> D[ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ];
```

ПРИЧИНЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Физическая причина принимать наркотик появляется уже после употребления самого вещества. Некоторые виды наркотиков вызывают зависимость после всего 1 раза приема, другие — после 2-3. Попадая в организм, наркотик моментально входит в процесс обмена веществ и когда вещество перестает поступать, начинается физическая потребность в повторном принятии. Человек переживает крайне тяжелое состояние – абстиненцию или ломку. Человек не может контролировать или облегчить это состояние, это от него не зависит.



СОЦИАЛЬНАЯ ПРИЧИНА

К социальной причине употребления наркотиков относится среда человека, в которой он растет и живет. Оказанное авторитетное влияние может стать причиной начала приема наркотиков. Причиной может стать то, что употребление наркотиков традиционно и легально, имеется зависимость в семье, доступность вещества, это просто модно. Среди прочих нужно указать такие факторы как: отсутствие четких жизненных ориентиров, целей, стремлений; отсутствие позитивного примера (здоровой модели поведения); изменение круга общения.



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Ломку можно снять с помощью различных медикаментозных препаратов — сегодня медицина умеет это делать очень эффективно. Но переживший ломку наркоман не перестает желать принять наркотик из-за психологического аспекта. У него есть потребность употреблять наркотик, возвращаться в состояние наркотического опьянения, так как он уже не может без этого испытывать положительные эмоции, справляться с непростыми ситуациями, вести нормальный образ жизни, общаться, дружить, любить. Психическую зависимость преодолеть гораздо труднее, чем физическую.



ПРИЗНАКИ

- бессонница и бледность;
- лишенное мимики лицо либо напротив повышенная мимика в период ломки;
- сухость слизистых оболочек;
- заложенный нос;
- дрожащие руки и исколотые, воспаленные вены; частая зевота и чихание;
- ненормально широкие или узкие зрачки, которые не реагируют на изменение освещения;
- суетливость, нервность, агрессия, вялость.

ЛЕЧЕНИЕ



Дезинтоксикационная терапия- проводится с помощью введения агониста, для того чтобы свести к минимуму абстинентный симптом наркотической зависимости. Поскольку этап дезинтоксикационной терапии сопровождается проведением общеукрепляющей и стимулирующей терапии, то в этот период назначают общеукрепляющие микстуры и транквилизаторы, которые воздействуя успокаивающе на центральную нервную систему больного.

Активное лечение болезни- заключающейся в использовании психотерапии. Чаще всего больному с помощью гипноза внушается отвращение к наркотикам. При эффективном проведении сеанса гипноза у больного вырабатывается отрицательный рефлекс на наркотические средства, появляются установки на выздоровление.

Терапия, направленная против рецидивов- которая, по сути, относится к третьему этапу лечения больного, длится на протяжении двух-трех месяцев, а иногда и до полугода. Она направлена на обязательное восстановление у больного положительных жизненных установок.

ПОСЛЕДСТВИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ

преждевременное старение, что отражается как во внешнем виде, так и на работе его внутренних органов

проблемы с сердцем и пищеварением по причине большого количества токсических веществ в организме

разрушается печень, так как не справляется с переработкой такого большого количества наркотика, который попадает в организм, в результате возникает цирроз или рак печени

нарушение гормонального фона

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

нарушение сна, памяти, внимания, мышления, координации движений

эмоции становятся неустойчивыми, появляется тревога, страхи, раздражительность

возникает слабоумие

СОЦИАЛЬНЫЕ

нарушаются все социальные связи

нормы и правила поведения в обществе забываются

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

ПРОФИЛАКТИКА

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. ИМЕННО В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, КОГДА ПРОИСХОДИТ ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ, МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ НЕОБХОДИМО ВОСПОЛНИТЬ НАСЫЩЕННОСТЬ ПЕРЕЖИВАНИЙ. НЕБЕЗЫЗВЕСТНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ МАКСИМАЛИЗМ ТОЛКАЕТ ПОДРОСТКА В РАЗЛИЧНЫЕ АВАНТЮРЫ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННЫМ И ДЕЙСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ОГРАЖДАЮЩИМ ПОДРОСТКА ОТ БЕДЫ.

НАРКОТИКАМ

НЕТ!

Спасибо за внимание!