



***Оказание
первой помощи
при укусах змей
и насекомых***

Оказание первой помощи при укусе ядовитой змеи

При укусе ядовитой змеи на коже человека остаются две небольшие красные точки от проникновения ядовитых зубов.

На месте укуса возникает:

- слабая боль
- чувство жжения
- кожа краснеет
- нарастает отёк

Появляется:

- слабость
- головокружение
- тошнота
- снижается артериальное давление.

Эти явления достигают максимума через 8—36 ч после укуса.



Порядок оказания первой помощи при укусе ядовитой змеи

- Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему покой и горизонтальное положение: это обеспечит минимальную скорость переноса яда кровью. Успокойте пострадавшего.
- Транспортируйте его в безопасное, защищённое от непогоды место.
- Для уменьшения циркуляции крови на место укуса можно наложить холод (целлофановый пакет с холодной водой).
- Продезинфицируйте ранку йодом или зелёной и наложите стерильную повязку, которую следует ослаблять по мере нарастания отёка.
- Дайте пострадавшему обильное питьё. Употребление кофе противопоказано.
- Организуйте доставку пострадавшего в лечебное заведение.



При укусе ядовитой змеи запрещается:

- делать надрезы на месте укуса;
- прижигать место укуса;
- накладывать жгут выше места укуса;
- разрешать выполнять пострадавшему любые физические нагрузки.

Первая помощь при укусах насекомых

При укусах пчёл, ос, шершней и шмелей в месте укуса развивается:

- боль
- жжение
- возникает отёк
- местное повышение температуры



При множественных укусах появляется:

- слабость
- головокружение
- головная боль
- озноб
- тошнота
- рвота
- повышается температура тела.



У людей с повышенной чувствительностью к пчелиному яду могут появиться:

- боли в пояснице и суставах
- возможны судороги и потеря сознания

Порядок оказания первой помощи при укусах насекомых

- В первую очередь нужно удалить из кожи жало насекомого
- Ужаленное место смочить спиртом
- Приложить к ужаленному месту холод (полиэтиленовый пакет с холодной водой).
- Давать пострадавшему обильное питьё

Наиболее опасны укусы пчёл, ос, шершней в полость рта, куда насекомое может попасть, когда человек ест фрукты. В таких случаях необходима срочная помощь, так как возникающие отёк гортани и удушье смертельно опасны.

- Из-за специфических свойств слюны комара в месте его укуса образуются небольшие пузырьки, возникает зуд, чувство жжения.
- Зуд можно устранить, если смочить кожу нашатырным спиртом или раствором питьевой соды (половину чайной ложки соды на стакан воды).



Защита от комаров


- В местах большого скопления комаров пользуются накомарниками, которые шьют из марли.
- Для отпугивания комаров применяют различные средства (репелленты).



Малярийный комар

- Особую опасность представляют малярийные комары, которые являются переносчиками малярии и других заболеваний.
- Отличить их можно по посадке. Обыкновенные комары сидят, держа брюшко параллельно поверхности, а малярийные приподнимают брюшко кверху.

Сравнение двух видов комаров



Малярийный комар



Комар-пискун