

# *Приоритеты в медикаментах в 2016 г.*

# Креон.



**Фармакологическая группа :** Ферментный препарат.

**Состав :** панкреатин

**Показания :** для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании; заместительная терапия при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы: хронический панкреатит, панкреатоэктомия, рак поджелудочной железы, синдром Швахмана-Даймонда, старческий возраст; симптоматическая терапия нарушений пищеварения: состояние после холецистэктомии, частичная резекция желудка, тотальная гастрэктомия, дуодено- и гастростаз, холестатический гепатит, цирроз печени, болезнь Крона, дисбактериоз.

# Креон.



**Возраст :** препарат назначают взрослым и детям .

При необходимости препарат можно применять при беременности и кормлении грудью. Категория «С».

## Преимущества :

- Назначение креона оправдано у лиц старческого возраста, в связи со слабостью у них ферментного аппарата.
- Форма выпуска препарата обеспечивает полное высвобождение резистентных к действию желудочного сока микрокапсул в желудке с последующим быстрым выделением ферментов.
- Препарат разрешен для использования в детской практике.
- При затрудненном глотании микрокапсулы можно высыпать в пищу.

# Фестал.

**Фармакологическая группа :** ферментный препарат.

**Состав :** гемицеллюлаза , компоненты желчи ,панкреатин .  
(Hemicellulasum+Chole+ Pancreatinum)



**Показания :** недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы при хроническом панкреатите ,проявляющиеся нарушением переваривания пищи, метеоризмом, склонностью к запорам, в составе комбинированной терапии при: диффузных заболеваниях печени — алкогольных и токсических поражениях печени, циррозе печени; больших потерях желчных кислот (у пациентов после холецистэктомии); нарушении циркуляции желчных кислот, наблюдающемся при дискинезиях желчевыводящих путей, дисбактериозах; малоподвижном образе жизни; подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию; нарушении нейрогуморальной регуляции процессов желчеобразования и желчеотделения при хронических заболеваниях ЖКТ — хроническом гастрите, хроническом дуодените, хроническом холецистите;

# Фестал.



- для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании, а также при нарушении жевательной функции.

**Возраст** : препарат противопоказан детям до 3 лет, с осторожностью назначают беременным и кормящим.

## **Преимущества :**

- Панкреатин облегчает переваривание углеводов, жиров и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике.
- Экстракт желчи действует желчегонно, облегчает всасывание жиров и жирорастворимых витаминов А, Е и К.
- Фермент гемицеллюлаза способствует расщеплению растительной клетчатки, что также улучшает пищеварительные процессы, уменьшает образование газов в кишечнике.
- Препарат проверенный временем, безопасный и доступный для основной категории пациентов.

# Эссенциале.



**Фармакологическая группа** : гепатопротекторы.

**Состав** : Эссенциальные фосфолипиды.

**Показания** : хронические гепатиты; цирроз печени; жировая дистрофия печени различной этиологии; токсические поражения печени; алкогольный гепатит; нарушения функции печени при других соматических заболеваниях; токсикоз беременности; профилактика рецидивов образования желчных камней;

**Возраст** : препарат противопоказан детям до 12 лет.

Возможно применение препарата при беременности по показаниям.

# Эссенциале.



## Преимущества :

- Эссенциале – оригинальный препарат.
- Удобная большая упаковка позволяет провести лечение в течении месяца.
- Препарат может быть рекомендован для лечения токсикоза беременных и для профилактики образования желчных камней.
- Эссенциале оказывают нормализующее действие на метаболизм липидов, белков и на дезинтоксикационную функцию печени; восстанавливают и сохраняют клеточную структуру печени и фосфолипидзависимые ферментные системы, тормозят формирование соединительной ткани в печени.

# Нормобакт

**Фармакологическая группа :** симбиотик

**Состав :** Lactobacillus acidophilus LA-5  
+ Bifidobacterium BB-12Y



**Показания :** дисбактериоз (в составе комплексной терапии); понос или диарея (вызванные, в том числе приемом антибиотиков или другими агентами); тошнота; боль в животе; запор; потеря аппетита; снижение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.

**Возраст :** препарат в саше пакетах применяется у детей (в том числе грудничков) с 6 месяцев. Таблетки - детям старше 3 лет  
Возможно использование препарата во время беременности и лактации по показаниям и после консультации со специалистом.



# Нормобакт

## Преимущества :



- Использование для лечения дисбактериоза, запоров и поноса у взрослых, детей (в том числе грудничков), а также при беременности и кормлении грудью.
- Состав препарата синбиотика : живые бактерии и фруктоолигосахариды – среда для развития бактерий.
- Сочетание пробиотика с пребиотиком продлевает период жизни полезных бактерий, значительно увеличивает количество собственных полезных бактерий, позволяя сократить срок коррекции дисбактериоза до 10 дней.
- Возможен одновременной прием с антибиотиками в периода лечения и 3-4 дня после окончания приема антибиотиков.
- Нормобакт позволяет снизить побочные явления, возникающие при приеме антибиотиков. Кроме того, препарат усиливает всасывание стенками кишечника витаминов группы В, калия, а также ионов кальция и железа.

# Аципол

**Фармакологическая группа :** пребиотик

**Состав :** Лактобактерии ацидофильные (*Lactobacillus acidophilus*) + Грибки кефирные (*Saccharomyces*) (*Lactobacillus acidophilus* + *Saccharomyces*)

**Показания :** дисбактериоз и острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, ротавирусный гастроэнтерит); хронические колиты; энтероколиты инфекционного и неинфекционного генеза; длительная антибактериальная терапия.

Дисбактериоз и дефицит массы тела, связанные с :  
активной антибиотикотерапией гнойно-септических заболеваний у грудных детей; хроническими, затяжными, рецидивирующими заболеваниями органов дыхания ;атопическим дерматитом и другими аллергическими проявлениями.

**Возраст :** Детям в возрасте от 3 мес до 3 лет назначают по 1 капсуле 2-3 раза/сут (вместе с приемом пищи), растворив ее содержимое в молоке или кипяченой воде. Детям старше 3 лет назначают по 1 капсуле 3-4 раза/сут за 30 мин до приема пищи.



# Аципол

Данные о применении Аципола при беременности и в период лактации не предоставлены.



## Преимущества :

- Препарат для всей семьи регулирующий равновесие кишечной микрофлоры.
- Оказывает корригирующее действие на микрофлору кишечника, повышает иммунологическую реактивность организма.
- Назначают детям старше 3 месяцев и взрослым в сочетании с традиционным лечением.
- Препарат не взаимодействует с лекарственными препаратами.
- При применении Аципола в рекомендуемых дозах побочных эффектов не выявлено.

# Максилак



**Фармакологическая группа :** симбиотик

**Состав :** Бактерии *Lactobacillus helveticus* + *Lactococcus lactis* + *iongum* + *Bifidobacterium breve* + *Streptococcus thermophilus* + *Lactobacillus rhamnosus* + *Lactobacillus casei* + *Lactobacillus plantarum* + *Bifidobacterium bifidum* + олигофруктоза - питательная среда.

**Показания :** в качестве вспомогательного средства в процессе или после антибиотикотерапии; в качестве вспомогательного средства при функциональных расстройствах кишечника: диарее (поносе), диспепсии (нарушении пищеварения), запоре, метеоризме (вздутии живота), тошноте, отрыжке, рвоте, боли в животе и в период повышенной склонности к инфекциям.

**Возраст :** Взрослым и детям старше 3-х лет применять по 1 капсуле 1 раз в сутки во время еды. Детям до 2 лет по 1 пакетик саше в сутки. Детям старше 2 лет - по 1-2 пакетика саше в сутки

# Максилак

Возможно использование препарата Максилак при беременности и во время кормления грудью.



## Преимущества :

- Максилак разработан с использованием инновационной технологии MURE ,которая оберегает капсулу с полезными бактериями от разъедающего воздействия кислого содержимого желудочного сока, солей желчи и пищеварительных ферментов.
- Максилак не содержит казеина и консервантов, поэтому он безопасен для людей с аллергией на продукты, содержащие данные вещества. Может применяться лицами с непереносимостью лактозы.
- Препарат не взаимодействует с лекарственными препаратами.
- Выпускается в капсулах и в виде специальной лекарственной формы для детей – Максилак Бэби в саше пакетах .
- Препарат эффективен и безопасен.

# Неосмектин.

**Фармакологическая группа :** адсорбенты

**Состав :** смектит

**Показания :** Диарея (аллергического, лекарственного генеза; при нарушении режима питания и качественного состава пищи), инфекционного генеза. Лечение симптомов, связанных с заболеваниями желудка и кишечника : изжоги, ощущения тяжести, вздутия и дискомфорта в животе.

**Возраст :** Взрослым и детям с 12 : 1 /3 раза в день;

Дети старше 2х лет: 2-3/сутки

Дети 1-2 года: 2/сутки

Дети до 1 года: 1/сутки



# Неосмектин.

## Преимущества :



- Препарат высокого уровня безопасности, поэтому его можно применять детям с рождения и беременным женщинам с проблемами ЖКТ!
- Препарат комплексного действия. Он не только избавит Вас от диареи, но и устранил вздутие, дискомфорт в животе и защитит слизистую желудка и кишечника!
- Представлен тремя вкусами! Суспензия со вкусом малинового, ванильного и апельсинового мороженого так нравится детям!
- Экономичная упаковка удобна для всей семьи и выгодна для семейного бюджета.



# Ингавирин



**Фармакологическая группа :** Противовирусные средства

**Состав :** витаглутам.

**Показания :** лечение гриппа А (H1N1, H3N2, H5N1, и др.); гриппа В; парагриппа; респираторно-синцитиальной инфекции; аденовируса.

**Возраст :** Взрослые и подростки старше 18 лет . Препарат принимают по 90 мг ( 3 капсулы) один раз в день в течении 5-7-дней. Детям с 13 лет по 60 мг (2 капсулы ) один раз в сутки в течении 5-7 дней.

**Противопоказания :** беременность ; лактация ; дети до 13 лет; индивидуальная непереносимость и повышенная чувствительность к компонентам препарата.



# Ингавирин

## Преимущества :



- Противовоспалительное действие обусловлено подавлением продукции ключевых провоспалительных цитокинов .
- Терапевтическая эффективность при гриппе и других острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) проявляется в укорочении периода лихорадки, уменьшении интоксикации : головная боль, слабость, головокружение , катаральных явлений, снижении числа осложнений и продолжительности заболевания.
- Препарат обладает низким уровнем токсичности и высоким профилем безопасности.
- Ингавирин не оказывает седативного действия, не влияет на скорость психомоторной реакции, препарат можно применять у лиц различных профессий, в т.ч. требующих повышенного внимания и координации движений.

# Лавомакс

**Фармакологическая группа :** Противовирусные средства

**Состав :** тилорон 125 мг.



**Показания :** лечение вирусных гепатитов А, В и С; герпетической инфекции; цитомегаловирусной инфекции; инфекционно-аллергических и вирусных энцефаломиелитов; урогенитального и респираторного хламидиоза; негонококковых уретритов; туберкулеза легких. Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ.

**Возраст :** Взрослые и подростки старше 18 лет . Взрослые принимают в первые 2 дня болезни назначают в дозе 125 мг/сут, затем 125 мг через 48 ч. Курсовая доза - 750 мг (6 таб.).

**Противопоказания :** беременность ; лактация ; подростки до 18 лет;  
индивидуальная непереносимость и повышенная чувствительность к компонентам препарата.

# Лавомакс

## Преимущества :

- Лавомакс -противовирусный и иммуномодулирующий препарат, стимулирует образование в организме  $\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ -интерферонов.
- Стимулирует стволовые клетки костного мозга, в зависимости от дозы усиливает антителообразование .
- Совместим с антибиотиками и средствами стандартной терапии вирусных и бактериальных заболеваний.
- Лавомакс не оказывает седативного действия, не влияет на скорость психомоторной реакции, препарат можно применять у лиц различных профессий, в т.ч. требующих повышенного внимания и координации движений.
- Препарат следует принимать внутрь, после приема пищи.



# Биопарокс

**Фармакологическая группа :** Антибактериальный препарат для местного применения в ЛОР-практике.



**Состав :** фузафунгин 50 мг

**Показания :** лечение инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей : ринит, ринофарингит, фарингит, ларингит, трахеит, тонзиллит, состояния после тонзиллэктомии, синусит.

**Возраст :** Взрослым назначают по 4 ингаляции через рот и/или по 2 ингаляции в каждый носовой ход 4 раза/сут.

Детям старше 2,5 лет назначают по 2-4 ингаляции через рот и/или по 1-2 ингаляции в каждый носовой ход 4 раза/сут.

**Противопоказания :** детский возраст до 2.5 лет (опасность развития ларингоспазма); повышенная чувствительность к активному веществу или к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. С осторожностью следует применять Биопарокс у беременных и кормящих женщин, у пациентов, предрасположенных к аллергическим реакциям и бронхоспазму.

# Биопарокс



## Преимущества :

- Препарат применяют в виде ингаляций (через рот и/или нос).
- Разработан специально для местного применения, не проникает в системный кровоток.
- Усовершенствованы насадки для горла и носа , дополнительная насадка для детей раннего возраста.
- Возможно проведение лечения препаратом Биопарокс в комбинации с системными антибиотиками.
- Препарат обладает высокой безопасностью,- разрешен для применения у детей в возрасте с 2,5 лет.
- Структурных аналогов по действующему веществу лекарство Биопарокс не имеет.

# Сумамед.



**Фармакологическая группа :** Антибиотик группы макролидов.

**Состав :** азитромицина 125 мг, 250 мг , 500 мг.

**Показания :** инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит/тонзиллит, синусит, средний отит); инфекции нижних дыхательных путей (острый бронхит, обострен хронического бронхита, пневмония, в т.ч. вызванные атипичными возбудителями); инфекции кожи и мягких тканей (рожа, импетиго, вторично инфицированные дерматозы); акне вульгарис средней степени тяжести (для таблеток); начальная стадия болезни Лайма (боррелиоз) ; инфекции мочеполовых путей.

**Возраст :** взрослым и детям с 12 лет назначают табл. и капс. 250 мг-500 мг.

Детям в возрасте от 3 до 12 лет таблетки 125 мг, детям с 6 месяцев до 3 лет – суспензия для приема внутрь.

**Противопоказания :** детский возраст до 6 месяцев; повышенная чувствительность к активному веществу или к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. С осторожностью следует применять у беременных и кормящих женщин. Категория С.

# Сумамед.



## *Преимущества :*

- Высокая эффективность препарата - самые высокие концентрации антибиотика внутри клетки .
- Направленность действия – высвобождение сумамеда в очаге инфекции.
- Наибольшая безопасность : бережное отношение к кишечной флоре и наименьший риск аллергических реакций.
- Короткий курс терапии -уверенность в приеме полного курса антибиотикотерапии.
- Минимальный риск взаимодействия с лекарственными препаратами.
- Гарантированное качество препарата.



# Хемомицин.



**Фармакологическая группа :** Антибиотик группы макролидов .

**Состав :** азитромицин капсулы 250 мг, таблетки 500 мг, суспензия 100 мг и 200 мг.

**Показания :** инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов; инфекции нижних дыхательных путей (острый бронхит, обострен хронического бронхита, пневмония, в т.ч. вызванные атипичными возбудителями); инфекции кожи и мягких тканей (рожа, импетиго, вторично инфицированные дерматозы); акне вульгарис средней степени тяжести ; начальная стадия болезни Лайма (боррелиоз) ; инфекции мочеполовых путей.

**Возраст :** взрослым и детям с 12 лет назначают табл. и капс. 250 мг-500 мг.

Детям в возрасте от 3 до 12 лет таблетки 125 мг, детям с 6 месяцев до 3 лет – суспензия для приема внутрь.

**Противопоказания :** детский возраст до 6 месяцев; повышенная чувствительность к активному веществу или к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. С осторожностью следует применять у беременных и кормящих женщин. Категория С.



# Хемомицин.



## Преимущества :

- Направленность действия – высвобождение хемомицина в очаге инфекции.
- Наибольшая безопасность : бережное отношение к кишечной флоре и наименьший риск аллергических реакций.
- Короткий курс терапии -уверенность в приеме полного курса антибиотикотерапии.
- Минимальный риск взаимодействия с лекарственными препаратами.
- Хемомицин не влияет на способность к вождению автотранспорта и скорость психомоторных реакций.
- Препарат сочетает высокое Европейское качество и относительно доступную стоимость.

# Панклав.

**Фармакологическая группа :** Антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия с ингибитором бета-лактамаз .

**Состав :** амоксициллин 250 мг или 500 мг  
клавулановая кислота 125 мг

**Показания :** инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов ; инфекции нижних отделов дыхательных путей; инфекции мочевыводящих путей ; инфекции в гинекологии; инфекции костей и суставов; инфекции кожи и мягких тканей; инфекции желчных путей ; гонорея; шанкроид; одонтогенные инфекции.

**Возраст :** взрослым и детям с 12 лет назначают табл. и капс. 250 мг-500 мг.

**Противопоказания :** детский возраст до 12 лет; повышенная чувствительность к активному веществу или к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата, инфекционный мононуклеоз.

С осторожностью следует применять у беременных и кормящих женщин.

Категория «С.»



# Панклав.

## Преимущества :

- Антибиотик широкого спектра действия; содержит полусинтетический пенициллин амоксициллин и ингибитор  $\beta$ -лактамаз клавулановую кислоту.
- Одновременный прием пищи не влияет на степень всасывания. Максимальная концентрация в плазме крови достигаются приблизительно через 1 ч после приема.
- Панклав не влияет на способность к вождению автотранспорта и скорость психомоторных реакций.
- Препарат сочетает высокое Европейское качество и относительно доступную стоимость.



# Максиган



**Фармакологическая группа :** спазмоанальгетик

**Состав :** метамизол натрий 500 мг+ питофенона гидрохлорид 5 мг+  
фенпивериния бромид 100 мкг

**Показания :** умеренно выраженный болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов (в т.ч. почечная колика, печеночная колика, желчная колика, кишечная колика, альгодисменорея, дискинезия желчевыводящих путей);

- для кратковременного симптоматического лечения при невралгии, артралгии, ишиалгии, миалгии;
- в качестве вспомогательного препарата для уменьшения болей после хирургических вмешательств и диагностических процедур;
- для снижения повышенной температуры тела при простудных и инфекционно-воспалительных заболеваниях .

**Возраст :** Взрослые и дети старше 15 лет - по 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки.

Препарат противопоказан беременности и в период лактации.

# Максиган



## Преимущества :

- Сочетание трех компонентов препарата приводит к облегчению боли, расслаблению гладких мышц, снижению повышенной температуры тела.
- Эффективный и безопасный препарат для лечения спастической боли и болей после хирургических и диагностических вмешательств, купирования умеренной боли любого происхождения.
- Слабо или умеренно выраженный болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов: почечная, печеночная, желчная и кишечная колики, дискинезия желчевыводящих путей, альгодисменорея.
- Для кратковременного симптоматического лечения: артралгия, невралгия, миалгия, ишиалгия.
- Оптимальное соотношение цена-качество при высокой эффективности и безопасности .

**ВИКС АКТИВ СИМПТОМАКС - ПОРОШОК  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО НАПИТКА  
ОТ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И ГРИППА .**



**Фармакологическая группа :** *Препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний.*

**Состав :** парацетамол 1,0 г  
фенилэфрина гидрохлорид 12,2 мг  
аскорбиновая кислота 100 мг

**Показания :** Симптомы простудных заболеваний и гриппа:

боли различной локализации, в т.ч. головная боль; боль в горле; заложенность носа; повышенная температура тела.

**Возраст :** взрослым и детям с 18 лет.

**Противопоказания :** детский возраст до 18 лет; беременность и кормление грудью, артериальная гипертензия, диабет, ИБС, нарушение функции почек и печени.

# **ВИКС АКТИВ СИМПТОМАКС ПЛЮС - ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО НАПИТКА ОТ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И ГРИППА .**



**Фармакологическая группа :** *Препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний*

**Состав :** парацетамол 500 мг  
фенилэфрина гидрохлорид 10 мг  
гвайфенезина 200 мг

**Показания :** Симптоматическое лечение простудных заболеваний и гриппа, сопровождающихся продуктивным кашлем с затрудненным отхождением мокроты, головной болью, болью и ломотой в теле, болью в горле, заложенностью носа и повышенной температурой тела.

**Возраст :** взрослым и детям с 18 лет.

**Противопоказания :** детский возраст до 18 лет; беременность и кормление грудью, артериальная гипертензия, диабет, ИБС, нарушение функции почек и печени, гиперплазия предстательной железы.



# **ВИКС АКТИВ СИНЕКС** **спрей от насморка .**



**Фармакологическая группа :** *Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике.*

**Состав :** оксиметазолина гидрохлорид 50 мг  
левоментол, алоэ вера и эвкалиптол

**Показания :** Для облегчения носового дыхания: при простудных заболеваниях или вирусных инфекциях верхних дыхательных путей; при синусите, рините любой этиологии.

**Возраст :** взрослым и детям с 6 лет.

**Противопоказания :** детский возраст до 6 лет; беременность и кормление грудью, артериальная гипертензия, атрофический ринит , повышенная чувствительность к компонентам препарата.



## ***ВИКС АКТИВ БАЛЬЗАМ С МЕНТОЛОМ И ЭВКАЛИПТОМ.***



**Фармакологическая группа :** Препарат с местнораздражающим действием, применяемый наружно при простудных заболеваниях и кашле.

**Состав :** левоментол 2.75 г  
камфора 5 г  
масло эвкалиптовое 1.5 г  
масло терпентинное 5 г

**Показания :** В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся: насморком; чувством заложенности носа; кашлем и болью в горле.

**Возраст :** препарат разрешен взрослым и детям с 2-х лет.

**Противопоказания :** склонность к бронхоспазму; бронхиальная астма; коклюш; ложный круп ; кашель, вызванный скоплением мокроты (слизи); продолжительный или хронический кашель, вызванный курением или эмфиземой; повреждения кожных покровов и кожные заболевания в области предполагаемого нанесения препарата; детский возраст до 2 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата. Препарат не рекомендуется использовать при беременности и в период лактации.

# **ВИКС АКТИВ АМБРОМЕД СИРОП ОТ КАШЛЯ.**



**Фармакологическая группа :** Муколитический и отхаркивающий препарат.

**Состав :** Амброксола гидрохлорид 30 мг/5мл

**Показания :** Заболевания дыхательных путей с затруднением отхождения мокроты: Острый и хронический бронхит; хроническая обструктивная болезнь легких; бронхиальная астма; бронхоэктатическая болезнь; муковисцидоз.

**Возраст :** взрослые и дети с первых дней жизни.

**Противопоказания :** Гиперчувствительность к амброксолу, бромгексину или другим компонентам препарата, непереносимость фруктозы .

С осторожностью препарат назначают беременным и кормящим женщинам, пациентам с печеночной недостаточностью, с почечной недостаточностью, с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

# **ВИКС АКТИВ ЭКСПЕКТОМЕД**

**таблетки шипучие от влажного кашля.**



**Фармакологическая группа :** Муколитический препарат.

**Состав :** ацетилцистеин 200 мг и 600 мг

**Показания :** Заболевания органов дыхания и состояния, сопровождающиеся образованием вязкой трудноотделяемой слизисто-гнойной мокроты: острый и хронический бронхиты; трахеиты ; бронхиолит; пневмония; бронхиальная астма; бронхоэктатическая болезнь; ателектазы вследствие закупорки бронхов слизистой пробкой; удаление вязкого секрета из дыхательных путей при посттравматических и послеоперационных состояниях; катаральный и гнойный отит, гайморит, синусит .

**Возраст :** взрослые и дети с 2-лет.

**Противопоказания :** детский возраст до 2 лет; беременность и кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;

# Викс.

## Преимущества :



- Викс Актив — это линейка безрецептурных препаратов, разработанных специалистами Викс после четырех лет исследований специально для России, чтобы лечить кашель, облегчать симптомы простуды и гриппа.
- Сочетая в себе клинически проверенные лекарственные компоненты и подсказанные природой средства, препараты Викс Актив предлагают эффективное облегчение симптомов простуды и кашля.
- Выпускаемые в различных лекарственных формах, включая порошки для приготовления горячего напитка с различными вкусами, назальный спрей и сироп, препараты Викс Актив помогают быстро и действенно устранять симптомы простудных заболеваний у всей семьи.
- Викс Актив — это серия безрецептурных препаратов, которая применима в отношении практически всех симптомов простуды и гриппа, чтобы Вы не потеряли ни минуты из-за простуды.

# Амбробене.



**Фармакологическая группа :** Муколитический и отхаркивающий препарат.

**Состав :** Амброксола гидрохлорид 75 мг капс.,табл, ингаляционный р-р.  
15 мг- сироп для детей.

**Показания :** Заболевания дыхательных путей с затруднением отхождения мокроты.

**Возраст :** взрослые и дети с 12 лет.

**Противопоказания :** I триместр беременности; детский возраст до 12 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата; эпилепсия.

С осторожностью следует применять препарат у пациентов с нарушением моторной функции бронхов и повышенным образованием мокроты ; при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, во II и III триместрах беременности, в период лактации.

Пациентам с нарушениями функции почек или тяжелыми заболеваниями печени Амбробене следует назначать с особой осторожностью.

# Амбробене.

## Преимущества :



- Одновременное применение Амбробене с антибиотиками (в т.ч. амоксициллин, цефуроксим, эритромицин, доксициклин) улучшает поступление антибиотиков в легочные пути, сокращает время лечения.
- Многообразие лекарственных форм и дозировок позволяет выбрать удобную для любого возраста.
- Наибольшая безопасность : препарат можно назначать детям с рождения.
- Минимальный риск взаимодействия с лекарственными препаратами.
- Амбробене не влияет на способность к вождению автотранспорта и скорость психомоторных реакций.
- Препарат сочетает высокое Европейское качество и относительно доступную стоимость.



# Аквалор.



**Фармакологическая группа :** Препараты для лечения заболеваний носа.

**Состав :** активные ингредиенты и минералы природной морской воды .

**Показания :** для профилактики возникновения ОРЗ и ОРВИ в осенне-зимний период; при ринитах (насморке) разнообразного происхождения, в том числе аллергическом, атрофическом и катаральном; после хирургических манипуляций и оперативных вмешательств в полость носа и околоносовых пазух при комплексном лечении гриппа и разнообразных простудных заболеваний; для ежедневной гигиены носовой полости.

**Возраст :** взрослым и детям с момента новорожденности .

**Противопоказания :** спреи и капли не имеют противопоказаний и могут применяться без каких-либо ограничений.

# Аквалор.

## Преимущества :



- Аквалор – это линейка лекарственных средств для промывания носовой полости при насморке (рините) и заложенности носа.
- Никаких ограничений по использованию Аквалора у новорожденных, а также у беременных женщин и кормящих грудью не существует.
- Линейка лекарственных средств Аквалора невероятно длинная, позволяющая выбрать необходимую лекарственную форму для снятия симптомов.
- Оказывает увлажняющее и противовоспалительное действие.
- После промывания Аквалором<sup>®</sup> повышается терапевтическая эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку носа, и сокращается продолжительность респираторных заболеваний.



# Снуп.



**Фармакологическая группа :** *Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике.*

**Состав :** ксилометазолина гидрохлорид 500 мкг и 1 мг.  
морская вода.

**Показания :** острые респираторные заболевания с явлениями ринита; острый аллергический ринит; поллиноз; синусит; евстахиит; средний отит ;  
облегчение проведения риноскопии и других диагностических манипуляций в носовых ходах.

**Возраст :** взрослым и детям с 6 лет -0,1 % спрей, детям с 2 до 6 лет - 0,05 % спрей.

**Противопоказания :** артериальная гипертензия, тахикардия; выраженный атеросклероз; глаукома; атрофический ринит; тиреотоксикоз; беременность; хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе); детский возраст до 2-х лет.

# Снуп.

## Преимущества :



- Препарат имеет удобную лекарственную форму в виде спрея.
- Может применяться у детей с 2-х лет.
- Снуп действует мягко, содержит морскую воду,- хорошо увлажняет и не пересушивает слизистую носа.
- Снуп не влияет на способность к вождению автотранспорта и скорость психомоторных реакций.

# Санорин.



**Фармакологическая группа :** *Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике.*

**Состав :** Нафазолина нитрат 500 мкг и 1 мг

Нафазолина нитрат + Антазолина мезилат (Санорин Аналергин).

Нафазолина нитрат + Масло эвкалиптовое масло. (Санорин с маслом эвкалипта).

**Показания :** острый и аллергический ринит; синусит; евстахиит; ларингит; для облегчения проведения риноскопии; необходимость остановки носовых кровотечений; в качестве дополнительного средства при лечении конъюнктивитов бактериального и аллергического происхождения .

**Возраст :** взрослым и детям с 15 лет -0,1 % капли или спрей, детям с 2 лет - 0,05 % капли и суспензия.

**Противопоказания :** артериальная гипертензия, тахикардия; выраженный атеросклероз; глаукома; атрофический ринит; тиреотоксикоз; беременность; хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе); детский возраст до 2-х лет, сахарный диабет.

# Санорин.



## Преимущества :

- Разнообразие лекарственных форм препарата : спрей, капли и эмульсия дает возможность выбрать удобную.
- Может применяться у детей с 2-х лет.
- Санорин действует мягко, содержит масло эвкалипта,- хорошо смягчает и не высушивает слизистую , быстро облегчает носовое дыхание.
- Санорин Аналергин оказывает противоаллергическое, противоотечное действие.
- Эффективный, проверенный временем бренд по доступной цене.

# Венарус.



**Фармакологическая группа :** Венотонизирующий препарат.

**Состав :** диосмин 450 мг + гесперидин 50 мг

**Показания :** венозная недостаточность нижних конечностей функциональной и органической природы, ощущение тяжести в ногах, боль, судороги, трофические нарушения ; острый и хронический геморрой.

**Возраст :** препарат показан только взрослым .

**Противопоказания :** повышенная чувствительность к компонентам препарата.  
Применение препарата при беременности возможно, применение в период лактации противопоказано.

# *Венарус.*



## *Преимущества :*

- Эффективно подавляет воспалительные процессы в венах, предотвращает повреждение венозной стенки, препятствует развитию трофических язв.
- Повышает тонус венозных сосудов,- улучшает лимфоотток.
- Быстро снимает тяжесть в ногах, боль, отёки, судороги.
- Улучшает качество жизни пациентов
- Фармакоэкономически выгоден.

# Детралекс



**Фармакологическая группа :** Венотонизирующий препарат.

**Состав :** диосмин 450 мг + гесперидин 50 мг

**Показания :** Симптоматическая терапия венозно-лимфатической недостаточности:  
ощущение тяжести в ногах; боль; утренняя усталость ног.  
Симптоматическая терапия острого геморроя.

**Возраст :** препарат показан только взрослым .

**Противопоказания :** повышенная чувствительность к компонентам препарата.  
Применение препарата при беременности возможно, применение в период лактации противопоказано.



# Детралекс



## Преимущества :

- Оригинальный препарат, качественный и безопасный, содержащий комплекс пяти флавоноидов каждый из которых обладает собственной активностью и взаимно усиливают действие друг друга.
- Детралекс - микронизированная очищенная флавоноидная фракция, которая в 2 раза быстрее всасывается в ЖКТ и способствует более быстрому наступлению эффекта : быстро снимает тяжесть в ногах, боль, отёки, судороги, повышает тонус венозных сосудов,- улучшает лимфоотток.
- Меньшее время нахождения в ЖКТ повышает переносимость препарата.
- Препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работы, требующей высокой скорости психомоторных реакций.

# Артра форте MSM



**Фармакологическая группа :** Стимулятор регенерации тканей.

**Состав :** Хондроитина сульфат 400 мг  
Глюкозамина гидрохлорид 500 мг  
Метилсульфонилметан 300 мг  
Гиалуронат натрия 10 мг

**Показания :** Остеоартроз периферических суставов. Остеохондроз позвоночника.

**Возраст :** препарат показан взрослым и детям с 15 лет.

**Противопоказания :** беременность и период лактации; детский возраст до 15 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата.

# Артра форте МСМ



## Преимущества :

- Препарат является лекарством, что гарантирует качество препарата .
- Эффективно и быстро уменьшает боль и улучшают функции суставов.
- Имеют высокий уровень безопасности, сочетаются с другими препаратами, можно принимать долгое время.
- Курсовая терапия позволяет отказаться от потенциально опасных НПВС или существенно снизить их дозу.
- Терапия препаратом «АРТРА мсм ФОРТЕ » тормозит процессы разрушения хряща, а не просто маскирует симптомы.
- Стоимость курсового лечения является экономически привлекательным.

# Виагра



**Фармакологическая группа :** *Препарат для лечения эректильной дисфункции.  
Ингибитор ФДЭ-5*

**Состав :** силденафил 25 мг, 50 мг, 100 мг.

**Показания :** лечение нарушений эрекции, характеризующихся неспособностью к достижению или сохранению эрекции, достаточной для удовлетворительного полового акта. Силденафил эффективен только при сексуальной стимуляции.

**Возраст :** Препарат не предназначен для применения у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

**Противопоказания :** применение у пациентов, получающих нитриты в любых формах; одновременное применение препарата с другими средствами для лечения нарушений эрекции ; повышенная чувствительность к силденафилу или к любому компоненту препарата;

# Виагра

## Преимущества :



- Виагра является безопасным лекарственным препаратом, у пациентов пожилого возраста не требуется коррекции дозы.
- Таблетки улучшают работу полового аппарата при недомогании, волнении и усталости.
- Средство не провоцирует неконтролируемую эрекцию и повышает ее в тех случаях, когда мужчина возбужден. Если же возбуждение отсутствует, то препарат не оказывает никакого эффекта.
- На фоне приема препарата Виагра какого-либо отрицательного влияния на способность управлять автомобилем или другими техническими средствами не наблюдалось.
- Случаи возникновения физической зависимости от препарата не установлены.

# Сеалекс



**Фармакологическая группа :** БАД

**Состав :** Экстракты лекарственных растений: коры йохимбе, зеленого чая, корня женьшеня, чеснока посевного, карликовой пальмы, корня лакрицы, порошок из пантов марала.

**Показания :** Комплексное лечение эректильной дисфункции .  
В качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства .

**Возраст :** не применяют у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

**Противопоказания :** Выраженный атеросклероз, нарушения сердечного ритма, повышенное артериальное давление, повышенная нервная возбудимость, бессонница, гиперчувствительность к компонентам препарата.

# Сеалекс

## Преимущества :

- Сеалекс является биологически активным препаратом нового поколения.
- Оказывает общеукрепляющее действие, улучшает микроциркуляцию, усиливает выносливость и работоспособность. Повышает иммунитет, оказывает антистрессовое действие.
- Действие развивается постепенно, максимальный эффект наблюдается со второго дня приема препарата.
- При длительном применении отмечается увеличение содержания тестостерона в крови, повышение либидо.
- Препарат уникален по комбинации входящих в его состав действующих веществ.





# Афобазол.



**Фармакологическая группа :** Анксиолитическое средство .

**Состав :** Фабомотизол

**Показания :** облегчение синдрома отмены при отказе от курения, генерализованные тревожные расстройства; неврастения; расстройства адаптации; различные соматические заболевания , дерматологические и онкологические заболевания, лечение нарушений сна, связанных с тревогой; Тревожные состояния у взрослых при заболеваниях : нейроциркуляторная дистония; предменструальный синдром; алкогольный абстинентный синдром.

**Возраст :** взрослым и детям с 18 лет.

**Противопоказания :** беременность и период лактации, дети до 18 лет.

# Афобазол.



## Преимущества :

- Афобазол улучшает качество жизни пациентов.
- Препарат обладает успокаивающим действием с активирующим компонентом, не сопровождающимся гипноседативными эффектами.
- Афобазол не нарушает способности управлять механизмами и выполнять любые виды деятельности, связанные с необходимостью обладать высокой скоростью реакций и отличной концентрацией внимания.
- При применении препарата не формируется лекарственная зависимость и не развивается синдром отмены.

# *Витрум Кидс Гамми витамины №30 жевательный мармелад*



**Фармакологическая группа :** *Витамины .*

**Состав :** Витамин А, Е, Д3, С, пантотенат кальция, В6, фолиевая кислота, В12, биотин, калия йодид, цинка цитрат, холина битартрат, инозит.

**Показания :** Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище , как дополнительный источник витаминов.

**Возраст :** детям с 3-х лет.

**Противопоказания :** Индивидуальная непереносимость компонентов, ожирение, нарушение углеводного обмена.

# *Витрум Кидс Гамми витамины №30 жевательный мармелад*



## *Преимущества :*

- Витамины выпускаются в виде конфет – жевательного мармелада с приятным ароматом и вкусом в виде фигурок медвежат разного цвета.
- Витрум Кидс Гамми способствуют улучшению аппетита, повышают сопротивляемость детского организма к простудным заболеваниям, улучшают память и концентрацию внимания.
- С витаминами Витрум Кидс ребенок получит оптимальное комплексное сочетание веществ, необходимых для поддержания здоровья и хорошего развития.
- Банка, в которой содержатся витамины, оснащена специальным механизмом закрывания крышки «защита от детей».

*Успешных продаж !*



СЕТЬ АПТЕК  
КЛАССИКА

59<sup>TM</sup>